This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

4/4 P
51196811

PRESS 699
SHELF b.
No 17.



600016805Q

C

1896175 d. 7/4

ORNITHOLOGIE

DU PÉROU

RADCLIFFE LIBRARY
UNIVERSITY
2 OCT 86
MUSEUM
OXFORD

ORNITHOLOGIE

DU PÉROU

PAR LADISLAS TACZANOWSKI

TABLES

RADCLIFFE LIBRARY
UNIVERSITY
2 OCT 86
MUSEUM
OXFORD

TYPOGRAPHIE OBERTHUR, A RENNES

1886

106

TABLES SYNOPTIQUES

POUR DÉTERMINER LES GENRES ET LES ESPÈCES PÉRUVIENS

FAMILLE VULTURIDÆ

A Tête et cou dénués, sommet de la tête surmonté d'une crête charnue; ailes plus longues que la queue, rémiges secondaires presque égales aux primaires.
- *A'* Doigts externe et interne presque d'égale longueur. — SARCORHAMPHUS
- *A''* Doigt externe plus long que l'interne. — CATHARTES

B Tête dénuée sans crête verticale; queue égalant la moitié de la longueur de l'aile, rémiges primaires dépassant les secondaires.
- *B'* Queue coupée carrément. — CATHARISTES
- *B''* Queue arrondie. — ŒNOPS

GENRE ŒNOPS

- *a* Tête toute rouge. — Œ. AURA
- *b* Tête d'un rouge violâtre, à tache occipitale blanc verdâtre. — Œ. PERNIGRA
- *c* Tête d'un jaune orangé. — Œ. URUBITINGA

FAMILLE FALCONIDÆ

A Doigts externe et interne réunis au médian par une membrane basale; visage en partie dénué.
- *A'* Narines oblongues. — POLYBORUS
- *A''* Narines rondes.
  - *AA* Coloration uniforme dans les deux sexes. — IBYCTER
  - *AB* Coloration différente dans les sexes. — MILVAGO

B Doigt interne non réuni au médian par la membrane basale.

B' Tarse presque aussi long que les tibias; quatrième ou cinquième rémige la plus longue, queue dépassant beaucoup le bout des ailes.

BA Bec à bords de la mâchoire découpés en deux dents fort prononcées. HARPAGUS

BB Bec à bords de la mâchoire découpés en un feston arqué.

Ba Une collerette de plumes distinctes des environnantes autour du visage. CIRCUS

Bb Point de collerette.

Bα Face antérieure du tarse réticulée; bec élevé à narines rondes. MICRASTUR

Bβ Face antérieure du tarse couverte de scutelles.

B1 Doigt externe beaucoup plus court que l'interne. GERANOSPIZA

B2 Doigt externe beaucoup plus long que l'interne. ACCIPITER

B'' Tarse beaucoup plus long que les tibias; troisième, quatrième ou cinquième rémiges les plus longues.

BA Distance entre l'extrémité des rémiges primaires et des secondaires égale ou plus longue que le tarse.

Ba Queue égalant le double de la longueur du tarse.

Bα Ailes dépassant le bout de la queue.

B1 Doigt médian avec l'ongle plus long que la partie non emplumée du tarse.

Bx Narines ovalaires.

1 Quatrième rémige la plus longue. BUTEO

2 Troisième et quatrième rémiges égales, doigt médian avec l'ongle plus longs que la partie du tarse couverte de scutelles. GERANOAËTOS

3 Troisième, quatrième et cinquième rémiges égales et les plus longues. LEUCOPTERNIS

Bxx Narines rondes. BUTEOLA

B2 Doigt médian avec l'ongle plus court que la partie non emplumée du tarse. HETEROSPIZIAS

Bβ Ailes n'atteignant pas l'extrémité de la queue. ASTURINA

BB Distance entre l'extrémité des rémiges primaires et des secondaires moins longue que le tarse.

Ba Tête sans huppe.

Bα Distance entre l'extrémité de l'aile et de la queue plus longue que le pouce. BUTEOGALLUS

Bβ Distance entre l'extrémité des ailes et de la queue plus courte que le pouce. URUBITINGA

Bb Tête huppée.

Bα Narines moins longues que leur distance du sommet du bec. HARPYIA

Bβ Narines plus longues que leur distance du sommet du bec.

B1 Queue deux fois aussi longue que le tarse. HARPYHALIAËTUS

B2 Queue quatre fois aussi longue que le tarse. MORPHNUS

B3 Tarse emplumé jusqu'aux doigts. SPIZAËTUS

BC Tarse réticulé jusqu'aux doigts.

Ba Ongles pleins, non creux en dessous.

Bα Doigts armés d'épines, ailes dépassant le bout de la queue. PANDION

Bβ Doigts sans épines, queue dépassant les ailes. GAMPSONYX

Bb Ongles creux en dessous.

Bα Queue très longue profondément fourchue. NAUCLERUS

Bβ Ailes dépassant l'extrémité de la queue, troisième rémige la plus longue. ICTINIA

Bγ Queue dépassant l'aile.

B1 Bec élevé, court; tête grosse couverte au sommet de plumes fines et raides. HERPETOTHERES

B2 Bec terminé par un crochet plus ou moins long; pattes courtes. REGERRHINUS

B''' Ailes aiguës, à deuxième rémige la plus longue, bords de la mâchoire armés d'une dent proéminente.

BA Coloration semblable dans les deux sexes.

Ba Taille forte. FALCO

Bb Taille petite. HYPOTRIORCHIS

BB Coloration dissemblable dans les deux sexes. CERCHNEIS

Genre IBYCTER

a Plumage noir, à base blanche dans la queue. I. ATER
b Plumage noir, à ventre, les tibias et les sous-caudales blancs. I. AMERICANUS

Genre MILVAGO

a Queue du mâle noire terminée de blanc. M. MEGALOPTERUS
b Queue fauve rayée et terminée longuement de noir. M. CHIMACHIMA
c Queue fauve grisâtre, vermiculée finement de brun, à extrémité longuement brun noirâtre. M. CHIMANGO

Genre CIRCUS

a Sous-alaires noires. C. MACULOSUS
b Sous-alaires blanches, chez la ♀ variées de roux. C. CINEREUS

Genre MICRASTUR

a Taille forte.
  a' Dessus du corps et des ailes schistacé uniforme. M. MIRANDOLLEI
  a'' Dessus brun, à collier nucal ocreux. M. SEMITORQUATUS
b Taille petite.
  b' Quatre raies blanches en travers de la queue. M. GILVICOLLIS
  b'' Deux raies blanches en travers de la queue. M. PELZELNI

Genre ACCIPITER

a Tout le dessous cendré.
  a' Sous-alaires rousses. A. PILEATUS
  a'' Sous-alaires blanches. A. BICOLOR
b Dessous blanchâtre, à flancs et poitrine roussâtres; pantalons roux. A. ERYTHROCNEMIS

Genre BUTEO

a Blanc pur en dessous, dos cendré chez le ♂, roux chez la ♀. B. ERYTHRONOTUS
b Tout le dessous isabelle blanchâtre maculé de brun. B. PENNSYLVANICUS

Genre **ASTURINA**

a Cendré foncé en dessus.
  a' Poitrine cendrée, abdomen blanc rayé de roussâtre ou de cendré. — A. MAGNIROSTRIS
  a'' Poitrine roussâtre, abdomen rayé de roux et de fauve. — A. NATTERERI
b Tout le plumage noir, à base de la queue, les sus et sous-caudales blanches. — A. LEUCORRHOA

Genre **URUBITINGA**

a Noir, à queue traversée d'une bande blanche très large, voisine de la base; sus-caudales blanches. — U. ZONURA
b Brun ardoisé, à queue traversée d'une bande blanche, peu large, plus proche de l'extrémité; sus-caudales schistacées, à bordures blanches. — U. SCHISTACEA
c Brun noirâtre, à tibias et le devant de l'aile roux; bas de la queue, sus et sous-caudales blancs. — U. UNICINCTA

Genre **SPIZAETOS**

a Huppe étroite. — S. ORNATUS
b Huppe large. — S. TYRANNUS

Genre **REGERRHINUS**

a Crochet du bec long. — R. MEGARYNCHUS
b Crochet du bec faible. — R. CAYENNENSIS

Genre **FALCO**

a Tête et dessus du corps noir presque uniforme; cire foncée. — F. DEIROLEUCUS
b Dessus du corps noirâtre rayé en travers de cendré; cire jaune. — F. CASSINI

Genre **HYPOTRIORCHIS**

a Tête et dessus du corps noir presque uniforme; cire noire. — H. RUFIGULARIS
b Dessus du corps cendré plombé; sourcil roux très large; cire jaune. — H. FEMORALIS

Famille STRIGIDÆ

A Tête à deux huppes latérales.
- *A'* Fente auriculaire courte, moins large que l'œil.
  - *AA* Aile courte, tarse et doigts plus ou moins emplumés. — Bubo
  - *AB* Doigts dénués.
    - *Aa* Ailes dépassant l'extrémité de la queue. — Scops
    - *Ab* Ailes n'atteignant pas l'extrémité de la queue. — Lophostrix
- *A''* Fente auriculaire très longue, plus longue que le diamètre de l'œil; ailes atteignant ou dépassant l'extrémité de la queue. — Otus

B Tête sans huppes.
- *B'* Fente auriculaire petite, moins longue que le diamètre de l'œil.
  - *BA* Doigt médian avec l'ongle plus long que le tarse. — Glaucidium
  - *BB* Doigt médian avec l'ongle plus court que le tarse. — Pholeoptynx
- *B''* Fente auriculaire plus longue que le diamètre de l'œil.
  - *BA* Plumes rayonnées courtes au-dessus de l'œil.
    - *Ba* Doigts emplumés dans leur plus grande moitié basale. — Pulsatrix
    - *Bb* Doigts nus presque en entier. — Ciccaba
  - *BB* Plumes rayonnées longues autour des yeux. — Strix

Genre OTUS

- *a* Huppes longues. — O. mexicanus
- *b* Huppes très courtes. — O. brachyotus

Genre CICCABA

- *a* Dos brun uniforme. — C. melanonota
- *b* Dos brun rayé en travers de blanc. — C. virgata

Famille CAPRIMULGIDÆ

A Ongle du doigt médian non dentelé; doigt externe à cinq phalanges.
- *A'* Bec élevé, à arête fort arquée, les narines éloignées des plumes frontales; tarse court dénué. STEATORNIS
- *A''* Bec fort, aplati, couvert de plumes jusqu'aux narines; tarse court emplumé. NYCTIBIUS

B Ongle du doigt médian dentelé; doigt externe à quatre phalanges.
- *B'* Base du bec non armée de soies raides.
  - *BA* Tarse élevé non emplumé, queue médiocre terminée carrément. PODAGER
  - *BB* Tarse court emplumé au-devant et à l'extérieur.
    - *Ba* Queue courte coupée carrément. LUROCALIS
    - *Bb* Queue médiocre, échancrée. CHORDEILES
- *B''* Base du bec armée de soies raides.
  - *BA* Queue normale.
    - *Ba* Tarse court emplumé dans sa partie supérieure.
      - *Bα* Queue arrondie à l'extrémité. ANTROSTOMUS
      - *Bβ* Queue échancrée ou coupée carrément. STENOPSIS
    - *Bb* Tarse élevé non emplumé. NYCTIDROMUS
  - *BC* Queue anormale très longue et profondément fourchue. HYDROPSALIS

Genre NYCTIBIUS

- *a* Blanchâtre vermiculé de brun, à bande pectorale noire incomplète, taille forte. N. GRANDIS
- *b* Macules noires sur la poitrine.
  - *b'* Brun grisâtre en dessus strié de noir, taille médiocre. N. JAMAÏCENSIS
  - *b''* Roux strié et vermiculé de noir, taille médiocre. N. LONGICAUDATUS
- *c* Marron foncé vermiculé de noir; poitrine, ventre et scapulaires à taches blanches bordées de noir, taille petite. N. BRACTEATUS

Genre CHORDEILES

- *a* Quatre premières rémiges. traversées par une large bande blanche.

a' Sommet de la tête noir maculé de roussâtre, dos noir varié de taches et ocelles gris. C. ACUTIPENNIS

a'' Sommet de la tête gris roussâtre varié de grosses stries noires, dos gris clair strié de noir. C. PERUVIANUS

b Quatre premières rémiges sans bande blanche, les autres primaires à base blanche formant un grand miroir. C. RUPESTRIS

GENRE ANTROSTOMUS

a Rémiges sans raie blanche.

a' Trois rectrices latérales de chaque côté de la queue terminées longuement de roussâtre; demi-anneau collaire roussâtre. A. RUFUS

a'' Trois rectrices latérales terminées courtement de blanc; plumage roux brunâtre, demi-anneau collaire blanc, ocelles noirs sur les scapulaires, macules blanches sur l'abdomen. A. OCELLATUS

a''' Rectrices traversées d'une douzaine de raies roussâtres tachetées de noirâtre. A. MACULICAUDUS

b Les deuxième, troisième et quatrième rémiges traversées d'une raie blanche.

b' Deuxième et troisième rectrices terminées de blanc. A. NIGRESCENS

b'' Première rectrice terminée de blanc. A. PARVULUS

GENRE STENOPSIS

a Trois rectrices latérales de chaque côté de la queue blanches dans le tiers terminal, une bande blanche dans leur moitié, dessin du dessus du corps subtil. S. BIFASCIATA

b Deux rectrices latérales de chaque côté de la queue terminées de blanc, dessin du dessus du corps gros. S. ÆQUICAUDATA

GENRE HYDROPSALIS

a Rectrices externes fort prolongées, atténuées à l'extrémité, à baguette et barbe externe toutes blanches. H. SEGMENTATA

b Rectrice externe fort prolongée noire, terminée de blanc, bordée intérieurement de roux à la base, collier roux. H. LYRA

c Queue profondément bifurquée, deuxième et troisième rectrices blanches terminées de noirâtre. H. BIFURCATA

Famille CYPSELIDÆ

A Tarses emplumés; doigts externe et médian à trois phalanges; pouce dirigé en avant ou sur le côté; rectrices normales.
- *a* Tarse emplumé, doigts dénués, pouce antérieur. Cypselus
- *a'* Tarse et doigts emplumés, pouce latéral. Panyptila

B Rectrices terminées en pointe.
- *b* Baguettes à épines proéminentes. Chætura
- *b'* Baguettes à épines non proéminentes. Cypseloïdes

Genre CYPSELUS

- *a* D'un noir fuligineux mat.
  - *a'* Croupion et un demi-collier blancs. C. andecolus
  - *a''* Plaque jugulaire et une bande le long du dessous blanches. C. montivagus
- *b* Dessus noir lustré de verdâtre, à plumes bordées finement de blanchâtre. C. squamatus

Genre CHÆTURA

- *a* Queue courte, à rectrices ne dépassant les tectrices que par leurs épines. Ch. poliura
- *b* Queue dépassant plus ou moins les tectrices.
  - *b'* Noir fuligineux, avec un collier roux très large. Ch. rutila
  - *b''* Noir luisant en dessus, cendré foncé au croupion et en dessous. Ch. Sclateri

Famille HIRUNDINIDÆ

A Bec robuste, non aplati à la base, à narines rondes. Progne

B Bec aplati à la base, à narines oblongues.
- *B'* Narines voisines des plumes frontales; couleur des parties supérieures du corps à reflet métallique plus ou moins fort.
  - *BA* Queue plus ou moins profondément fourchue.
    - *Ba* Sous-caudales concolores à l'abdomen. Hirundo
    - *Bb* Sous-caudales noires. Atticora
  - *BB* Queue coupée carrément ou à peine entaillée. Petrochelidon

B'' Narines éloignées des plumes frontales; couleur sans reflet métallique sur les parties supérieures du corps.
- *BA* Barbe externe de la première rémige normale. — COTYLE
- *BB* Barbe externe de la première rémige à barbules raides recourbées à l'extrémité en crochet. — STELGIDOPTERYX

GENRE PROGNE

a Couleur générale noire lustrée de bleu. — P. PURPUREA
b Bicolore.
- *b'* Noir lustré de bleu en dessus, blanc en dessous, nébulé de gris au cou et à la poitrine. — P. CHALYBÆA
- *b''* Gris fuligineux en dessus, dessous blanc, à poitrine grise. — P. TAPERA

GENRE HIRUNDO

a Rectrices externes prolongées en un appendice atténué.
- *a'* Front gris blanchâtre; dessous roux. — H. ERYTHROGASTRA
- *a''* Front et dessous du corps roux. — H. TYTLERI

b Rectrices latérales normales.
- *b'* Dessous et croupion blancs.
  - *ba* Dessous blanc pur, une grosse tache alaire blanche. — H. ALBIVENTRIS
  - *bb* Flancs et dessous grisâtres, devant du front blanchâtre. — H. LEUCORRHOA
  - *bc* Poitrine et côtés de l'abdomen enduits de grisâtre, point de tache blanche alaire. — H. LEUCOPYGIA
- *b''* Tout le dessous grisâtre, à gorge d'un gris plus foncé; croupion concolore au dos. — H. ANDICOLA

GENRE ATTICORA

a Dessous du corps blanc, sous-caudales noires. — A. CYANOLEUCA
b Dessous du corps noir ou gris.
- *b'* Dessous noir, à bande pectorale blanche. — A. FASCIATA
- *b''* Dessous et croupion gris, tibias blancs. — A. TIBIALIS
- *b'''* Dessous gris uniforme, à sous-caudales noirâtres, croupion concolore au dos. — A. CINEREA

GENRE STELGIDOPTERYX

a Plumes du croupion concolores au dos. — S. RUFICOLLIS
b Plumes du croupion blanchâtres. — S. UROPYGIALIS

FAMILLE TROCHILIDÆ

A Queue normale.
A' Oiseaux sans huppe et sans collerette sur les côtés du cou.
AA Bec à arête dorsale dénudée entre les scutelles nasales, dépassant le bord antérieur des narines, ces dernières découvertes.
Aa Bec plus long que la tête, non cylindrique, rectrices médianes presque égales aux submédianes.
Aα Bec arqué presque en tiers de cercle, à mâchoire comprimée et creusée sur les côtés jusqu'aux $^2/_3$ de sa longueur. EUTOXERES
Aβ Bec légèrement arqué, à mâchoire non comprimée, à sillon creux n'atteignant pas la moitié du bec. GLAUCIS
Ab Rectrices médianes notablement plus longues que les submédianes, ordinairement allongées et brusquement atténuées après les submédianes, cette partie allongée souvent blanche. PHAËTHORNIS
Ac Baguette des rémiges primaires dilatée et aplatie dans sa partie basale.
Aα Queue longue et fourchue profondément. EUPETOMENA
Aβ Ailes presque coudées, chez le ♂ la baguette de la première rémige très dilatée à la base et non barbée à l'extérieur de cette partie, queue non fourchue arrondie. CAMPYLOPTERUS
Aγ Ailes falciformes chez le ♂, à baguette de la première rémige peu dilatée et peu aplatie, barbée à l'extérieur. APHANTOCHROA
Ad Baguette des rémiges primaires normale, queue légèrement arrondie. LAMPORNIS
Ae Bec droit aussi long que les deux tiers du corps; des plumes squamiformes au front. FLORICOLA
Af Bec droit ou peu arqué, moins long que les deux tiers du corps.
Aα Queue tronquée ou presque tronquée.

*A*1 Dessous du corps revêtu de plumes blanches soyeuses, sous-caudales blanches ou cendrées, quelquefois vertes.
1 Rectrices en partie blanches à la base, ou d'un blanc cendré au bout, ou d'un vert uniforme. LEUCIPPUS
2 Rectrices sans blanc à la base et à l'extrémité, le blanc du dessous parfois très rétréci. URANOMITRA
3 Dessous du corps blanc, à gorge et cou antérieur parsemés de points brillants. THAUMATIAS
*A*2 Dessous du corps revêtu de plumes vertes souvent frangées de blanc, offrant quelquefois une raie longitudinale médiane blanche ne couvrant pas la moitié de la largeur du corps. AGYRTRIA
*A*3 Dessous du corps squamiforme vert; queue subarrondie. POLYTMUS
Ag Bec élargi à la base graduellement atténué vers l'extrémité.
Aα Dessous du corps en partie roux, souvent d'un vert tendre, rectrices en partie rousses. AMAZILIA
Aβ Queue dorée, bronzée ou vert dorée, plus brillante en dessous qu'en dessus. CHRYSURONIA
Aγ Queue non dorée.
*A*1 Bec élargi et aplati à la base, menton roux ou tacheté de blanc, cou et poitrine bleus. HYLOCHARIS
*A*2 Bec assez large à la base, menton non roux ni blanc, cou et poitrine verts ou d'un vert bleuâtre. EUCEPHALA
Ah Bec aussi long que la tête.
Droit, terminé en pointe aiguë; ailes atteignant l'extrémité de la queue, doigts courts. CHLOROSTILBON
AB Base de la mâchoire couverte de plumes entre les scutelles cachant plus ou moins l'arête dorsale.
Aa Bec plus ou moins arqué, ordinairement fort, tête triangulaire.
Aα Bec denticulé à l'extrémité des bords des deux mandibules, région auri-

culaire parée d'une touffe de plumes se détachant du corps, queue à rectrices larges peu inégales. PETASOPHORA

Aβ Queue entaillée, à rectrices terminées en angle émoussé. JOLÆMA

Aγ Queue à rectrices rigides, peu inégales, atténuées vers l'extrémité et aiguës au bout, barbe externe de la rectrice latérale étroite; gorge et devant du cou parés d'une plaque squamiforme verte ou d'un bleu violet. OREOTROCHILUS

Aδ Bec peu arqué et peu dilaté, queue presque tronquée, à rectrices larges subarrondies, gorge et devant du cou métallique non squamiforme. FLORISUGA

Aε Rémige externe atténuée, queue échancrée, à rectrices larges terminées en angle obtus, gorge et poitrine écailleuses. LAFRESNYA

Ab Bec droit, à base plus ou moins emplumée couvrant les narines; tête triangulaire; queue plus ou moins entaillée.

Aα Bec plus long que la tête et le corps. DOCIMASTES

Aβ Bec moins long que le corps.

Ax Bec beaucoup plus long que la tête.

*A*1 Taille très forte, plumage non métallique, queue longue et large. PATAGONA

*A*2 Extrémité du bec courbée légèrement en haut; queue ample et longue, ailes en grande partie bleu métallique. PTEROPHANES

*A*3 Sommet de la tête métallique fort luisant, corps en partie; queue et ailes rousses, une gemme violette au cou du mâle. DIPHLOGÆNA

*A*4 Queue ample faiblement entaillée; plumage métallique, une gemme jugulaire et prase frontale brillants. HELIANTHEA

*A*5 Queue longue, fourchue; plumage métallique, tête ornée d'une bande médiane fort brillante. CLYTOLÆMA

*A*6 Queue ample fort entaillée; plumage brillant, une large bande pectorale blanche ou rousse, ou plumage général sombre prenant sous certain jour un éclat étincelant au croupion. BOURCIERIA

*A*7 Queue médiocre entaillée; plumage métallique, bande médiane du sommet de la tête et gorge fort brillants; rémiges secondaires en partie rousses. LAMPRASTER

*A*8 Queue longue profondément fourchue; plumage métallique, celui du centre du sommet de la tête, gorge et poitrine fort brillants. HELIODOXA

Axx Bec presque aussi long que la tête.

*A*1 Queue large médiocrement entaillée; tarse emplumé; plumage métallique fort étincelant sous certain jour, en partie non métallique. PANOPLITES

*A*2 Queue longue fourchue; plumage métallique, prase frontale et gorge fort brillants. HELIOTRYPHA

*A*3 Bec légèrement fléchi; queue large peu entaillée, à baguettes roussâtres dans les rectrices; dessous du corps fauve, une gemme rouge fort brillante au cou. PHÆOLÆMA

Ac Bec droit, la tête subarrondie.

Aα Bec moins long que la moitié du corps.

*A*1 Pattes garnies d'une manchette duveteuse, dessous du corps fort étincelant. ERIOCNEMIS

*A*2 Pattes non pattues, plumage général terne, excepté le croupion qui est largement fort étincelant, une touffe de plumes blanches ou fauves se détachant du corps sur le milieu de l'abdomen. AGLÆACTIS

Aβ Bec égalant les $^2/_3$ du corps, front paré d'une plaque métallique fort luisante. DORYFERA

Ad Bec légèrement arqué égal à la moitié du corps, queue échancrée, gorge et cou antérieur parés de plumes squamiformes vertes étendues jusqu'au bord antérieur des yeux, le reste du dessous ordinairement bleu. THALURANIA

Ae Bec droit plus long que la tête.

Aα Gorge et cou antérieur parés d'une plaque rouge ou violette très polie. HELIANGELUS

Aβ Gorge et cou antérieur parés de plumes squamiformes vertes. UROSTICTE

Af Bec droit égal ou un peu plus long que la tête, fort comprimé à l'extrémité même.

Aα Queue échancrée métallique sur les deux pages, changeant en bleu ou lilas sur la supérieure. METALLURA

Aβ Queue tronquée, à rectrices peu métalliques terminées d'une tache blanchâtre, gorge blanchâtre parsemée de points submétalliques. ADELOMYIA

Aγ Queue tronquée médiocrement métallique, à rectrices terminées par une bordure blanche, sommet de la tête et gorge d'un bleu violet. KLAÏS

Ag Oiseaux ornés d'un rabat jugulaire métallique très splendide, plus ou moins atténué, ordinairement bicolore.

Aα Bec plus court que la tête, queue échancrée, à rectrices larges, poitrine à plumes colorées. RHAMPHOMICRON

Aβ Bec aussi long que la moitié du corps, queue fort échancrée, à rectrices larges, blanches à la base, poitrine blanche. OREONYMPHA

Ah Bec assez large, fort comprimé dans le quart de sa longueur en une lame très mince, une touffe bleue violette se détachant de chaque côté du cou.

Aα Queue médiocre, arrondie. SCHISTES

Aβ Queue longue, à rectrices externes courtes. HELIOTHRIX

B Oiseaux ornés d'une huppe, d'une collerette, ou à queue singulière, à narines couvertes de plumes frontales, à base de l'arête du bec non visible.

Ba Une bande blanche ou roussâtre en travers du dos inférieur.

BA Tête surmontée d'une huppe plus ou moins haute et large, une collerette de plumes allongées, queue normale arrondie. LOPHORNIS

Bb Rectrices externes atténuées et prolongées, tarse garni d'une manchette. GOULDIA

BB Oiseaux sans bande au dos.

Ba Queue à rectrices externes prolongées, dénuées, terminées par une palette.

Bα Rectrices externes réduites à la baguette seule ou à peu près et terminées par une palette plus ou moins dilatée, pattes à manchettes. STEGANURA

Bβ Rectrices externes prolongées fort courbées, réduites à la baguette seule et terminées par une palette fort dilatée, les autres rudimentaires ou nulles, les deux sous-caudales postérieures fort prolongées et linéaires. LODDIGESIA

Bb Queue longue profondément fourchue divisée en deux branches, à rectrices parallèles fort étagées.

Bα Tête couverte au sommet d'une plaque squamiforme fort luisante, rectrices bleues ou vertes. CYNANTHUS

Bβ Sommet de la tête non squamiforme.

B1 Rectrices rouges ou dorées. SAPPHO

B2 Rectrices externes à barbe externe cendrée ou grise dans sa partie basale, assez étroites et faiblement métalliques. LESBIA

C Queue ordinairement irrégulière, gorge et devant du cou parés d'une cravate formée de plumes squamiformes rouges ou violettes fort splendides.

C' Rectrices médianes très courtes, submédianes linéaires et prolongées. THAUMASTURA

C'' Bec arqué plus long que la moitié du corps, queue fort fourchue, à rectrices assez fines, l'externe presque parallèle dans toute sa longueur. RHODOPIS

C''' Rectrices médianes courtes, les autres allongées, égales, parallèles, arrondies à l'extrémité et rigides. MYRTIS

C'''' Bec droit, ordinairement plus court que la moitié du corps, queue profondément fourchue, à rectrices assez larges, l'externe aiguë au bout. CALLIPHLOX

C''''' Bec droit ou presque droit, moins long que la moitié du corps, quelques-unes des rectrices linéaires très fines ou fort atténuées.

CA Queue très courte ne dépassant pas les tectrices, à trois rectrices latérales de chaque côté fort atténuées, rigides et plus courtes que les suivantes. MYRMIA

CB Queue dépassant les tectrices.

Ca Deux rectrices latérales fines en lame de poignard, troisième large, graduellement atténuée vers l'extrémité, qui est aiguë, deuxième et troisième égales et les plus longues. ACESTRURA

Cb Rectrice externe très mince, les deux suivantes fines subparallèles, la troisième plus longue. CHÆTOCERCUS

GENRE **GLAUCIS**

a Dessous roussâtre; queue roux cannelle traversée par une bande noire devant l'extrémité blanchâtre, rectrices médianes bronzées. G. HIRSUTUS

b Gorge noire; queue ocreuse, à rectrices médianes d'un vert noirâtre. G. CERVINICAUDA

GENRE **PHAETHORNIS**

a Rectrices médianes prolongées en un appendice atténué, aussi long environ que leur partie large et ordinairement blanc.

a' Bec presque droit, dessous fauve pâle. PH. BOURCIERI

a'' Bec courbé.

aa Dessous cendré plus ou moins foncé, lustré en partie de vert, dos et base des rectrices vert bleuâtre. PH. EMILIÆ

ab Dessous fauve roussâtre.

aα Gorge grise traversée d'une ligne médiane fauve, plumes du croupion frangées de roux. PH. SUPERCILIOSUS

aβ Gorge blanche bordée des deux côtés d'une moustache grise, sous-caudales rousses. PH. SYRMATOPHORUS

ac Dessous gris, plumes du croupion bordées de gris. PH. HISPIDUS

b Rectrices médianes peu prolongées en un appendice atténué graduellement, à extrémité blanche ou rousse, queue du ♂ arrondie.

a' Dessous roux.

ba Rectrices médianes noirâtres devant l'extrémité. . PH. GRISEIGULARIS
bb Gorge grise striée de noirâtre. PH. STRIIGULARIS
b'' Bande pectorale distincte chez le ♂, mandibule orangée en grande partie. PH. NIGRICINCTUS

GENRE APHANTOCHROA

Dessus du corps vert.
a Dessous blanc tacheté de vert. A. HYPOSTICTA
b Plaque gulaire squamiforme d'un rouge lilas. A. GULARIS

GENRE OREOTROCHILUS

Plaque gulaire verte, squamiforme chez le ♂.
a Dessous du corps blanc avec une bande médiane noire. O. LEUCOPLEURUS
b Dessous du corps blanc avec une large bande médiane brun châtain. O. ESTELLÆ
c Dessous du corps noir velouté lustré de bleu. O. MELANOGASTER

GENRE DORYFERA

a Dessous du corps noir chez le ♂, gris verdâtre chez la ♀, plaque frontale violette chez le ♂, vert bleuâtre chez la ♀. D. JOHANNÆ
b Dessous du corps olive grisâtre, plaque frontale verte. D. RECTIROSTRIS

GENRE JOLÆMA

a Front sans éclat métallique, une tache violet améthyste squamiforme sur le devant du cou. J. SCHREIBERSI
b Plumes frontales fort étincelantes, poitrine verte. J. WHITELYANA

GENRE THALURANIA

Gorge et devant du cou largement vert brillant.
a Dessous du corps bleu de Prusse, taille plus forte. T. NIGROFASCIATA
b Dessous du corps bleu de Prusse, sommet de la tête cuivreux, taille plus faible. T. JELSKII

Genre **LOPHORNIS**

a Gorge d'un vert métallique, huppe rousse ponctuée de noir. L. Delattrii
b Gorge non métallique, huppe verte ponctuée de blanc, dessous brun foncé, à lustre bronzé. L. Verreauxi

Genre **GOULDIA**

a Huppée, à poitrine noire non métallique. G. Popelairi
b Sans huppe, poitrine vert métallique bordée de rouge. G. Langsdorffi

Genre **MYRTIS**

a Gorge d'un vert métallique bordée de violet, quatre rectrices latérales également larges dans toute leur longueur. M. fanny
b Gorge d'un rouge violet métallique passant au bleu, trois rectrices latérales atténuées et pointues. M. Yarrelli

Genre **STEGANURA**

Plumage du tarse roux.
a Rectrice externe courbée en dedans, à palette subpentagonale à peine plus longue que large. S. peruana
b Rectrice externe droite, à barbe non barbée jusqu'à la palette.
b' Palette ovale allongé, dessous du corps vert. S. solstitialis
b'' Palette subpentagonale, dessous blanc tacheté de vert. S. addæ
c Rectrice externe droite toute barbée, palette oblongue subarrondie au bout. S. cissiura

Genre **LESBIA**

a Rectrice externe noire lustrée très légèrement de vert, à tache terminale verte, le gris blanchâtre de la barbe externe dépassant longuement la rectrice submédiane. L. gracilis
b Rectrice externe noire dans la moitié basale, puis verte terminée par une tache brillante vert olive tirant au rouge, le gris de la barbe externe n'atteignant pas l'extrémité de la rectrice submédiane. L. nuna

Genre CYNANTHUS

a Rectrice externe noir bleuâtre jusqu'à l'extrémité des subexternes, puis d'un vert très brillant, dessous d'un vert bronzé. C. MOCOA
b Rectrice externe noir indigo, plus bleue après avoir dépassé la submédiane, extrémité (?), dessous gris cendré, à plumes bordées de blanchâtre. C. GRISEIVENTRIS

Genre SAPPHO

a Gorge vert métallique, queue très brillante d'un rouge vineux ou cramoisi, à extrémité des rectrices noire. S. PHAON
b Gorge rouge, rectrices sans noir terminal. S. CAROLI

Genre AGLÆACTIS

Dessous roux.
a Touffe pectorale fauve.
a' Tout le dessous roux. A. CUPREIPENNIS
a'' Poitrine et abdomen d'un brun bronzé. A. CAUMATONOTA
b Touffe pectorale blanche, croupion lilas pourpré. A. CASTELNAUDI

Genre RHAMPHOMICRON

a Dessus du corps d'un bleu violâtre, rabat gulaire vert doré large et unicolore. R. MICRORHYNCHUS
b Rabat gulaire étroit bicolore.
b' Sommet de la tête concolore au dos.
b^a Couleur générale olive, rabat vert en haut et d'un violet rougeâtre en bas; queue olive bronzée. R. OLIVACEUS
b^b Couleur du dessus bleue, rabat vert en haut, violet en bas; queue bleue verdâtre. R. STANLEYI
b'' Sommet de la tête roux marron rougeâtre, queue bronzée. R. RUFICEPS

Genre METALLURA

a Rabat gulaire rouge, couleur générale bronzée, queue bronzée changeant au bleu. M. EUPOGON
b Rabat gulaire vert.

b' Plumage général noir avec un faible lustre rougeâtre.
- *b^a* Queue rouge vineux changeant au bleu. M. JELSKII
- *b^b* Queue cuivreuse. M. OPACA

b'' Vert en dessus.
- *b^c* Queue d'un pourpré bronzé, dessus du corps vert. M. TYRIANTHINA
- *b^d* Queue violet changeant au bleu, dessus du corps vert. M. SMARAGDINICOLLIS
- *b^e* Queue bronzée changeant en bleu. M. ÆNEICAUDA

GENRE **ADELOMYIA**

Dessous du corps isabelle sale à flancs verts.

a Gorge maculée de bleu. A. INORNATA
b Gorge maculée de vert. A. CHLOROSPILA
c Gorge maculée d'olive brunâtre. A. MELANOGENYS

GENRE **PETASOPHORA**

a Plumage général vert métallique.
- *a'* Touffe auriculaire rouge violâtre, sous-caudales blanches. P. SERRIROSTRIS
- *a''* Touffe auriculaire d'un bleu foncé. P. ANAÏS
- *a'''* Touffe auriculaire d'un bleu violâtre. P. CYANOTIS

b Plumage général non métallique, touffe auriculaire d'un bleu violet. P. DELPHINÆ

GENRE **HELIANTHEA**

Dessous du corps revêtu de plumes roussâtres à la base.

a Queue roux pâle, à extrémité vert bronzé, prase jugulaire violette, tectrices alaires d'un vert cuivreux. H. OSCULANS
b Queue fauve roussâtre terminée de vert bronzé, prase jugulaire bleu saphir passant au violet, tectrices alaires d'un rouge cuivreux. H. DICHROURA

GENRE **HELIOTRYPHA**

a Gorge d'un violet très brillant. H. VIOLA
b Gorge d'un rouge feu très brillant. H. MICRASTER

Genre **DIPHLOGÆNA**

a Plaque céphalique d'un vert très brillant passant au bleu, avec une tache saphirée sur le milieu du cervix, dos cannelle. D. Warszewiczi
b Plaque céphalique rouge feu très brillant passant au vert, avec une tache cervicale saphirée, dos bronzé noirâtre. D. iris

Genre **BOURCIERIA**

a Anneau collaire roux vif, interrompu au milieu du dos. B. inca
b Bande pectorale blanc pur très large, front vert métallique très luisant. B. insectivora
c Dessus cuivreux rougeâtre, dessous fuligineux, à gorge et devant du cou blancs maculés de fuligineux. B. cœligena

Genre **FLORICOLA**

a Sommet de la tête et cou vert métallique, sous-caudales brunes bordées de blanc. F. longirostris
b Sommet de la tête et cou d'un vert métallique pâle, sous-caudales blanc grisâtre. F. albicrissa

Genre **ERIOCNEMIS**

a Touffe tarsale noire. E. derbiana
b Touffe tarsale d'un brun pâle. E. affinis
c Touffe tarsale blanche.
c' Sous-caudales d'un saphir brillant, tout le dessus vert cuivreux, queue noire bleuâtre. E. sapphiropygia
c'' Sous-caudales vertes, à base fauve blanchâtre, dessous vert bleuâtre, à plumes du milieu de la poitrine blanches à la base, queue d'un vert bronzé. E. Dybowskii

Genre **LEUCIPPUS**

a Queue à rectrices externes blanches sur la barbe interne, gorge blanc pur.

a' Vert doré du dessus du corps et des flancs brillant. L. CHIONOGASTER
a'' Vert doré du dessus du corps et des flancs peu brillant. L. PALLIDUS
b Queue verte, à extrémité des rectrices gris pâle, gorge maculée. L. CHLOROCERCUS
c Queue verte en entier, de petites macules d'un vert très brillant sur les côtés de la gorge et du cou. L. VIRIDICAUDA

GENRE **AGYRTRIA**

a La gorge et le haut de la poitrine vert bleuâtre, queue bleu d'acier. A. BARTLETTI
b Gorge et poitrine vert métallique, front et nuque vert sombre, queue noire. A. FLUVIATILIS

GENRE **AMAZILIA**

Poitrine blanche, abdomen et flancs roux, queue marron pâle.
a Gorge d'un vert émeraude métallique. A. PRISTINA
b Gorge d'un vert doré métallique. A. LEUCOPHÆA

GENRE **HYLOCHARIS**

a Menton roux, poitrine bleu saphiré pâle, tête verte. H. SAPPHIRINA
b Menton blanchâtre, poitrine bleu violâtre, tête bleue. H. CYANEA

GENRE **CHLOROSTILBON**

Bec noir en entier.
a Queue courte subarrondie. CH. PRASINUS
b Queue médiocrement longue, échancrée. CH. MELANORHYNCHUS

Famille CŒREBIDÆ

A Bec droit.
- *A'* Bec plus long que la moitié de la tête.
  - *AA* Comprimé beaucoup plus élevé que large.
    - *Aa* Mâchoire terminée d'un crochet plus ou moins courbé; extrémité de la mandibule arquée. — Diglossa
    - *Ab* Crochet maxillaire peu courbé, mandibule droite. — Diglossopis
  - *AB* Bec non comprimé.
    - *Aa* Conique, à extrémité aiguë. — Conirostrum
    - *Ab* Élargi à la base, à dos de la mâchoire légèrement courbé à l'extrémité; deuxième rémige la plus longue. — Dacnis / Hemidacnis
    - *Ac* Bec un peu plus long que la tête, à dos arqué depuis les narines; troisième et quatrième rémiges les plus longues. — Chlorophanes
- *A''* Bec plus court que la moitié de la tête. — Xenodacnis

B Bec plus ou moins arqué.
- *B'* Coloration différente dans les deux sexes, couleur bleue prédominante dans les mâles. — Cœreba
- *B''* Coloration semblable dans les deux sexes. — Certhiola

Genre DIGLOSSA

- *a* Plumage général noir.
  - *a'* D'un noir intense luisant en entier. — D. aterrima
  - *a''* Moustaches blanches, bande pectorale rousse et blanche, sous-caudales rousses. — D. pectoralis
  - *a'''* Ardoisé foncé, à flancs de l'abdomen blancs. — D. albilateralis
  - *a''''* Dessus noir, dessous roux, à flancs, scapulaires et croupion cendrés. — D. brunneiventris
- *b* Dessus cendré bleuâtre, dessous roux. — D. sittoïdes
- *c* Plumage général bleu, à front, côtés de la tête et menton noirs. — D. personata

Genre CONIROSTRUM

- *a* Plumage général noir, sommet de la tête, épaules et croupion bleus. — C. atrocyaneum
- *b* Dessous du corps roux.
  - *b'* Dos bleu.

*b*ª Toute la tête et le devant du cou noirs. C. SITTICOLOR
*b*ᵇ Sommet de la tête noir, côtés de la tête et devant du cou schistacés. C. CYANEUM
b'' Dos schistacé, sommet de la tête noir, sourcils roussâtres. C. FERRUGINEIVENTRE
c Dessus cendré grisâtre, dessous isabelle grisâtre, sourcils et miroir alaire blancs. C. CINEREUM

Genre DACNIS

a Plumage général bleu.
a' Dos, gorge et lores noirs. D. CAYANA
a'' Dos, front, côtés de la tête noirs, milieu du ventre et sous-caudales blancs. D. ANGELICA
b Tête et dos noirs, à demi-anneau nucal jaune, dessous straminé verdâtre, ailes bleues. D. PULCHERRIMA
c Corps jaune, à sommet de la tête olive verdâtre, gorge, milieu du dos, côtés de la tête, ailes et queue noirs. D. FLAVIVENTER
d Dessus cendré bleuâtre.
d' Dessous grisâtre pâle. D. PLUMBEA
d'' Dessous cendré bleuâtre, grosse raie postoculaire blanche, sous-caudales rousses. D. ANALIS

Genre CŒREBA

a Tout le corps bleu, à gorge et lores noirs.
a' Le noir de la gorge non prolongé sur la région jugulaire. C. CÆRULEA
a'' Le noir prolongé jusqu'au milieu de la poitrine. C. NITIDA
b Bleu à dos et lores noirs, milieu de l'occiput bleu céladon. C. CYANEA

Genre CERTHIOLA

a Noir en dessus, à sommet de la tête à peine plus foncé que le dos, croupion jaune. C. LUTEOLA
b Dos schistacé, à sommet de la tête noir.
b' Miroir alaire blanc plus ou moins développé.
*b*ª Bec plus court que la tête. C. PERUVIANA
*b*ᵇ Bec plus long que la tête. C. MAGNIROSTRIS
b'' Miroir alaire nul. C. CHLOROPYGA

Famille VIREONIDÆ

A Bec faible sylviforme.
A' Ailes aiguës, à deuxième rémige la plus longue. VIREOSYLVIA
A'' Ailes émoussées, à troisième et quatrième rémiges les plus longues. HYLOPHILUS
B Bec robuste laniiforme.
B' Bec presque aussi long depuis la commissure que la tête, peu élevé. VIREOLANIUS
B'' Bec court, élevé et fort comprimé. CYCLORHIS

Genre VIREOSYLVIA

a Sommet de la tête cendré.
a' Sourcil blanc bordé en dessus de noir; flancs du corps grisâtres très peu lavés de verdâtre. V. OLIVACEA
a'' Sourcil blanchâtre sans bordure noire; côtés du cou et de tout le corps largement jaunes. V. FLAVO-VIRIDIS
b Sommet de la tête brun, sourcil blanc, abdomen jaune. V. JOSEPHÆ

Genre HYLOPHILUS

a Front roussâtre, dessous du corps gris lavé d'olive. H. FERRUGINEIFRONS
b Sommet de la tête gris brunâtre, gorge et cou antérieur gris blanchâtre, le reste du dessous jaune sale. H. FLAVIVENTRIS
c Olive verdâtre en dessus, jaune verdâtre en dessous. H. OLIVACEUS

Genre CYCLORHIS

a Sommet et côtés de la tête cendrés, à sourcils marron. C. GUIANENSIS
b Sommet de la tête vert jaunâtre concolore au dos, sourcils marron foncé. C. VIRENTICEPS
c Tout le sommet de la tête marron foncé. C. CONTRERASI

Famille SYLVIDÆ

A Bec faible, sylviforme; taille petite. — Polioptila
B Bec court, déprimé; taille médiocre. — Myiadestes

Genre POLIOPTILA

a Sommet de la tête noir.
- *a'* Lores blancs. — P. bilineata
- *a''* Lores noirs.
  - *aa* Noir basal des rectrices externes non couvert par les tectrices; taille plus forte. — P. nigriceps
  - *ab* Noir basal des rectrices externes couvert par les tectrices; taille plus faible. — P. parvirostris

Genre MYIADESTES

a Roux olivâtre en dessus, le front et tout le dessous cendré. — M. ralloïdes
b Dos cannelle rougeâtre, dessous noir, grosse bande faciale blanche. — M. leucotis

Famille MOTACILLIDÆ

Genre ANTHUS

a Rectrice externe toute blanche; ongle plus long que le pouce. — A. correndera
b Rectrice externe blanc sale presque en entier; ongle plus long que le pouce. — A. peruvianus
c Rectrice externe roussâtre dans sa moitié externe; ongle un peu plus long que le pouce. — A. bogotensis
d Rectrice externe blanche en grande partie; ongle égal au pouce. — A. furcatus

Famille MNIOTILTIDÆ

A Cils maxillaires petits.
- *A'* Du blanc ou du jaune à la queue.
  - *AA* Première rémige plus courte que la deuxième; coloration semblable dans les deux sexes. — Parula
  - *AB* Première rémige égale à la deuxième et les plus longues; coloration différente dans les sexes. — Dendrœca
- *A''* Queue unicolore.
  - *AA* Bec large à la base, non comprimé dans sa moitié terminale. — Myiodioctes
  - *AB* Bec peu large à la base, comprimé dans sa moitié terminale. — Geothlypis

B Cils maxillaires fort développés.
- *B'* Queue unicolore. — Basileuterus
- *B''* Queue à rectrices externes blanches en grande partie. — Setophaga

Genre DENDRŒCA

- *a* Barbe interne des rectrices blanche en grande partie.
  - *a'* Dessus du corps noir, dessous jaune varié de noir sur les côtés. — D. Blackburniæ
  - *a''* Bleuâtre en dessus, blanche en dessous. — D. cærulea
- *b* Barbe interne des rectrices jaune, dessous jaune tacheté de roux.
  - *b'* Sommet de la tête roux. — D. aureola
  - *b''* Sommet de la tête concolore au dos. — D. æstiva

Genre GEOTHLYPIS

- *a* Sommet de la tête cendré, front et lores noirs.
  - *a'* Le cendré occupant la région postoculaire, le noir couvrant presque en entier les tectrices auriculaires. — G. velata
  - *a''* Toute la région postoculaire et auriculaire verte, le noir fin au front et ne dépassant pas le bord postérieur de l'œil. — G. auricularis
  - *a'''* Région postoculaire et auriculaire verte, le noir dépassant largement, mais très peu le bord postérieur de l'œil. — G. æquinoctialis, peruviana

Genre **BASILEUTERUS**

a Queue bicolore, olive sombre en dessus, ocreux en dessous. B. UROPYGIALIS
b Queue unicolore.
b' Olive brunâtre en dessus, blanc et cendré en dessous, milieu du sommet de la tête d'un roux vif bordé des deux côtés d'une ligne noire. B. CASTANEICEPS
b'' Olive verdâtre en dessus, jaune en dessous.
b[a] Milieu du sommet de la tête roux bordé des deux côtés d'une ligne blanche, gorge et côtés de la tête cendrés. B. CORONATUS
b[b] Milieu du sommet de la tête roussâtre bordé des deux côtés d'une large raie olive noirâtre, gorge jaune, sourcils jaunâtres longs. B. BIVITTATUS
b[c] Milieu du sommet de la tête gris bordé des deux côtés d'une large raie noirâtre, sourcils gris pâle, gorge blanchâtre. B. TRIFASCIATUS
b[d] Sommet de la tête noir, traversé de trois raies gris blanchâtre, gorge blanchâtre. B. TRISTRIATUS
b[e] Sommet de la tête concolore au dos, à sourcils jaunes assez larges. B. LUTEOVIRIDIS
b[f] Milieu du sommet de la tête noir. B. NIGRICRISTATUS

Genre **SETOPHAGA**

a Ardoisé en dessus, jaune en dessous.
a' Gorge jaune.
a[a] Sommet de la tête tout noir. S. MELANOCEPHALA
a[b] Sommet de la tête noir avec une grosse tache occipitale fauve roussâtre. S. BAIRDI
a'' Gorge noire, une grande tache occipitale marron rougeâtre. S. VERTICALIS
b Noir en dessus; queue roux orangé à la base. S. RUTICILLA

Famille TURDIDÆ

A Queue plus courte que l'aile.
- *A'* Coloration semblable dans les deux sexes.
  - *AA* Tarse long et grêle, d'une couleur claire. Catharus
  - *AB* Tarse plus ou moins épais, à couleur foncée. Turdus
- *A''* Coloration plus ou moins différente dans les sexes, les mâles noirs ou noirâtres. Merula

B Queue plus longue que l'aile, fort arrondie; corps svelte. Mimus

Genre CATHARUS

- *a* Dessous du corps blanc au milieu, immaculé. C. fuscater
- *b* Dessous du corps roussâtre maculé de noirâtre. C. dryas

Genre TURDUS

- *a* Maculé en dessous.
  - *a'* De noirâtre jusqu'à la région anale. T. maranonicus
  - *a''* De brun foncé jusqu'au haut de l'abdomen; tour de l'œil roussâtre. T. Swainsoni
  - *a'''* De brun foncé jusqu'au haut de l'abdomen; rien de roussâtre autour de l'œil. T. Aliciæ
- *b* Dessous du corps immaculé, excepté la gorge striée de noir ou de brun sur un fond blanc.
  - *b'* Dessus du corps cendré bleuâtre, dessous blanc, à flancs et sous-alaires ocreux. T. Reevii
  - *b''* Dessus du corps brun roussâtre, dessous cendré pâle, sous-alaires grises. T. saturatus
  - *b'''* Dessus gris terreux foncé, dessous plus pâle, à milieu du ventre blanc, sous-alaires grises; stries gulaires fines. T. ignobilis
  - *b''''* Dessus brun tirant légèrement au cannelle, dessous gris soyeux, à milieu du ventre blanc; stries gulaires très grosses, sous-alaires gris roussâtre. T. crotopezus
  - *b'''''* Dessus brun marron, dessous brun, à milieu du ventre blanchâtre, sous-alaires roux orangé vif. T. Hauxwelli
  - *b''''''* Schistacé très foncé, à tête noire, dessous moins foncé, à milieu du ventre blanc, stries gulaires grosses, sous-alaires ardoisées. T. nigriceps

Genre **MERULA**

a Plumage général noir.
  a' Queue fort arrondie à l'extrémité. M. SERRANA
  a'' Queue coupée carrément à l'extrémité. M. LEUCOPS
b Plumage général fuligineux.
  b' Gorge immaculée. M. GIGANTODES
  b'' Gorge striée de foncé. M. CHIGUANCO

Famille **TROGLODYTIDÆ**

A Queue distinctement plus longue que l'aile, non rayée en travers. DONACOBIUS
B Différence entre la longueur de la queue et de l'aile petite ou nulle.
  B' Queue à peu près égale à l'aile.
    BA Bec faible, aussi long ou plus long depuis la commissure que la tête; plumage fort tacheté et rayé. CAMPYLORHYNCHUS
  B'' Queue un peu plus longue ou un peu plus courte que l'aile; bec plus court que la tête; plumage du corps non rayé ni tacheté, des lignes transversales sur les rémiges et la queue. CINNICERTHIA
  B''' Queue un peu plus courte que l'aile.
    BA Bec à échancrure subterminale.
      Ba Narines ovalaires, ouvertes, situées près du bord antérieur de la fosse nasale. THRYOPHILUS
      Bb Narines longues et étroites, couvertes en dessus d'une membrane. TRYOTHORUS
    BB Bec sans échancrure subterminale.
      Ba Bec depuis la commissure égal ou plus long que la tête; dos unicolore ou rayé en travers de foncé d'une manière peu distincte. TROGLODYTES
      Bb Bec moins long que la tête, une grosse tache noire striée de blanchâtre au dos. CISTOTHORUS
C Queue beaucoup plus courte que l'aile.
  C' Bec beaucoup plus court que le tarse.
    CA Bec faible, peu élevé à la base, à narines situées dans la partie antérieure de la fosse nasale. HENICORHINA
    CB Bec fort, élevé à la base et fort comprimé

entre les narines; ces dernières ouvertes dans le milieu de la fosse nasale. CYPHORHINUS

C'' Bec un peu plus court que le tarse, à peu près aussi haut que large vis-à-vis les narines; les narines ouvertes au milieu de la fosse nasale sont couvertes en dessus par une membrane en les atténuant sur le devant. MICROCERCULUS

GENRE CAMPYLORHYNCHUS

a Bande sourcilière large, dessous blanchâtre varié de brun.
- *a'* Taches de la poitrine subarrondies et isolées. C. BALTEATUS
- *a''* Taches de la poitrine transversales, réunies en bandes continues. C. FASCIATUS

b Bande sourcilière fine, dessous du corps fauve varié de brun. C. HYPOSTICTUS

GENRE CYPHORHINUS

a Tout le sommet de la tête schistacé olivâtre, devant et côtés du cou largement et la poitrine roux. C. THORACICUS

b Sommet de la tête roux.
- *b'* Taille plus petite. C. MODULATOR
- *b''* Taille plus forte, couleur du dessus un peu plus roussâtre. C. SALVINI

GENRE MICROCERCULUS

a Dessous du corps blanc pur. M. BICOLOR

b Dessous du corps blanc squamulé de brun. M. MARGINATUS

GENRE HENICORHINA

a Poitrine et devant de l'abdomen cendré passant un peu au blanchâtre sur le milieu même de ce dernier. H. LEUCOPHRYS

b Gorge, devant du cou, poitrine et milieu de l'abdomen blancs. H. LEUCOSTICTA

GENRE THRYOPHILUS

a Roux en dessus, à sourcils et le dessous du corps blancs soyeux, région anale ocreux roussâtre. TH. SUPERCILIARIS

b Brun roussâtre en dessus; sourcils, gorge et haut de la poitrine blancs, abdomen roux. TH. LEUCOTIS
c Brun roussâtre en dessus; sourcils fauve grisâtre, dessous brun terreux pâle. TH. FULVUS

GENRE THRYOTHORUS

a Dessous du corps maculé.
a' Des raies noirâtres irrégulières sur un fond blanc sur tout le dessous du corps. TH. SCLATERI
b Dessous du corps immaculé, région auriculaire noire.
b' Région auriculaire striée de blanc.
b[a] Poitrine et milieu de l'abdomen cendrés, queue rayée de noir et de gris ou roussâtre. TH. GRISEIPECTUS
b[b] Gorge, milieu de la poitrine et plus largement le milieu de l'abdomen blancs, queue rayée de gris et de noir. TH. ALBIVENTRIS
b'' Région auriculaire sans stries, poitrine et abdomen gris au milieu, queue rayée de roux et de noir. TH. CANTATOR

GENRE TROGLODYTES

a Sourcil large et nettement prononcé roussâtre pâle. T. SOLSTITIALIS
b Sourcil nul ou à peine indiqué.
b' Brun grisâtre en dessus, à dos rayé de noirâtre d'une manière plus ou moins prononcée, gorge isabelle. T. TESSELLATUS
b'' Brun en dessus, rayé au dos de noirâtre, gorge blanche. T. RUFULUS
b''' Brun terreux en dessus sans raies foncées, tout le dessous fauve. T. AUDAX

Famille PTEROPTOCHIDÆ

Genre SCYTALOPUS

a D'un schistacé noirâtre unicolore. — S. MAGELLANICUS
b Région anale et flancs du bas-ventre roux rayé de noir, la tête et tout le dessous schistacé soyeux, croupion roussâtre rayé de noir. — S. ACUTIROSTRIS
c Semblable au précédent, d'une taille plus forte, derrière même du croupion légèrement roussâtre avec quelques raies noirâtres. — S. FEMORALIS
d Milieu du ventre blanc, derrière du croupion peu roux rayé de noirâtre. — S. SYLVESTRIS

Famille FORMICARIIDÆ

Tribu THAMNOPHILINÆ

A Bec épais, non comprimé, plus large que haut à la base. — CYMBILANIUS
B Bec comprimé.
B' Région postoculaire largement dénuée. — MYRMELASTES
B'' Toute la tête emplumée ou peu dénuée derrière l'œil.
BA Cils mandibulaires peu développés.
Ba Bec élevé à la base, narines ovalaires. — THAMNOPHILUS
Bb Bec non élevé à la base, narines presque rondes. — THAMNISTES
Bc Bec plus ou moins plus faible, que chez le *Thamnophilus*. — DYSITHAMNUS
Bd Bec élargi à la base, narines rondes plus voisines du sommet, ongles courts. — PYGOPTILA
BB Cils mandibulaires fort développés, bec élargi à la base; narines rondes. — THAMNOMANES

Tribu FORMICIVORINÆ

A Bec mince, plus long que la tête. — Rhamphocænus
B Bec plus court ou aussi long que la tête.
- *B'* Tecture du devant du tarse divisée en scutelles.
  - *BA* Queue courte, taille petite. — Myrmotherula
  - *BB* Queue presque aussi longue ou plus longue que l'aile.
    - *Ba* Queue fort étagée.
      - *Bα* Bec graduellement atténué sans être comprimé.
        - *B1* Queue à douze rectrices. — Herpsilochmus
        - *B2* Queue à dix rectrices. — Cercomacra
      - *Bβ* Bec comprimé dans sa moitié terminale.
        - *B1* Queue en partie blanche, taille faible. — Formicivora
        - *B2* Queue sans blanc, taille médiocre, mâle tout noir. — Pyriglena
    - *Bb* Queue médiocrement étagée.
      - *Bα* Bec fort, faiblement comprimé dans sa partie terminale, taille médiocre. — Percnostola
      - *Bβ* Bec faible, comprimé dans sa moitié terminale, taille petite. — Terenura
- *B''* Tecture du tarse glabre non divisée en scutelles, ou à scutelles à peine distinctes.
  - *BA* Rémiges quatrième, cinquième et sixième égales et les plus longues.
    - *Ba* Bec grêle, queue étagée. — Myrmeciza
    - *Bb* Bec large à la base et peu comprimé, plus court que la tête, queue coupée carrément ou arrondie. — Hypocnemis
  - *BB* Rémiges quatrième et cinquième les plus longues, bec un peu plus long que la tête. — Heterocnemis

Tribu FORMICARIINÆ

A Tour de l'œil dénué; plumules nasales érigées. — Phlogopsis
B Tête tout emplumée.
- *B'* Tarse très élevé, queue courte, quatrième et cinquième rémiges les plus longues.
  - *BA* Narines rondes, bec comprimé à l'extrémité. — Grallaria
  - *BB* Narines oblongues, bec non comprimé à l'extrémité. — Chamæza
- *B''* Tarse médiocre, queue assez courte.

BA Quatrième et cinquième rémiges les plus longues, scutelles du devant du tarse fort prononcées. FORMICARIUS
BB Quatrième rémige la plus longue, devant du tarse glabre ou à scutelles peu distinctes. PITHYS

TRIBU CONOPOPHAGINÆ

A Bec court, assez large, non comprimé; narines rondes; rémiges quatrième, cinquième et sixième les plus longues. CONOPOPHAGA
B Bec assez fin, presque aussi long que la tête; narines ovoïdes; quatrième rémige la plus longue. CORYTHOPIS

GENRE THAMNOPHILUS

a Noir, à ailes brunâtres, partout finement ondulé de blanc. TH. UNDULATUS
b Noir unicolore en dessus, blanc pur en dessous.
b' Queue noire sans taches blanches, sous-caudales blanches. TH. MELANURUS
b'' Queue noire, à rectrices externes maculées de blanc le long du bord externe, sous-caudales noires bordées à l'extrémité de blanc. TH. TRANSANDEANUS
c Noir intense en entier.
c' Une grande tache humérale blanche. TH. LEUCONOTUS
c'' Toutes les tectrices alaires bordées à l'extrémité de blanc, rectrices excepté les quatre médianes terminées d'une tache blanche, l'externe a aussi une tache blanche dans les deux tiers de la barbe externe. TH. SUBANDINUS
c''' Plus fort que le précédent, à bordures blanches plus grosses aux tectrices alaires, couvrant le noir sur le devant de l'aile, point de tache blanche sur la barbe externe de la rectrice externe. TH. SUBANDINUS MAJOR
c'''' Le pli de l'aile et les bordures des tectrices alaires blancs, le ventre ondulé de cendré clair. TH. MELANCHROUS
d Plumage général du corps cendré.
d' Sommet de la tête noir, des bordures blanches aux tectrices alaires et une tache terminale blanche aux rectrices.
d[a] Des taches noires au milieu du dos, tout le dessous cendré. TH. NÆVIUS

d[b] Des taches noires au milieu du dos, milieu de l'abdomen largement blanc. TH. ALBIVENTRIS
d[c] Des taches noires au milieu du dos, sous-caudales noires bordées de blanc. TH. AMAZONICUS
d'' Sommet de la tête noir, tectrices alaires sans bordures blanches, queue schistacée noirâtre. TH. CAPITALIS
d''' Sommet de la tête cendré, des bordures blanches très fines aux grandes et moyennes tectrices alaires et à l'extrémité des rectrices. TH. MURINUS.
e Capuchon noir couvrant toute la tête, la gorge et le devant du cou, bordé tout autour de blanc.
e' Dos brun légèrement olivâtre, le noir du capuchon ne dépassant pas la poitrine. TH. ALBINUCHALIS
e'' Dos gris fuligineux foncé, le noir du capuchon prolongé largement sur le haut de l'abdomen. TH. LORETOYACENSIS
e''' Dos roux brunâtre pâle, le noir du capuchon prolongé sur le milieu de la poitrine en une ligne peu large. TH. LEUCAUCHEN
f Tête et cou noirs, dos et queue d'un roux cannelle vif; dessous du corps noir rayé en travers de blanc. TH. PALLIATUS
g Dos cendré, sommet de la tête et ailes roux à l'extérieur, dessous blanchâtre, à poitrine rayée en travers de noirâtre. TH. SUBFASCIATUS
h Tout le plumage noir rayé en travers de blanc.
h' Plumes de la huppe longuement blanches à la base. TH. DOLIATUS
h'' Plumes du sommet de la tête maculées de petites taches blanches, couleur noire prédominante sur la gorge. TH. TENUIFASCIATUS
h''' Plumes de la huppe noires en entier.
h[a] Le blanc prédominant sur la gorge, raies noires moins larges que les blanches sur l'abdomen. TH. RADIATUS
h[b] Le noir prédominant sur la gorge, raies blanches beaucoup plus fines que les noires sur l'abdomen. TH. BERLEPSCHI

GENRE **MYRMELASTES**

a Plumage général noir, avec une tache blanche sur le devant de l'aile voisine de l'avant-bras. M. NIGERRIMUS
b Plumage général plombé, plus foncé en dessus qu'en dessous, petite tache blanche à l'extrémité de toutes les tectrices alaires. M. PLUMBEUS

Genre PYGOPHILA

a Sommet de la tête noir, tectrices alaires terminées par une petite tache blanche subtriangulaire. P. MACULIPENNIS

b Sommet de la tête concolore au dos, tectrices alaires terminées par une grosse goutte blanche. P. MARGARITATA

Genre DYSITHAMNUS

a Plumage général ardoisé.

a' D'un cendré beaucoup plus clair en dessous, blanchâtre au milieu du ventre, plumes du milieu du sommet de la tête noires bordées de cendré. D. SCHISTACEUS

a'' Plumage de tout le corps d'un schistacé très foncé, tectrices alaires terminées par une tache blanchâtre très petite. D. ARDESIACUS

b Devant de l'oiseau ardoisé, derrière du corps olive.

b' Gorge largement blanchâtre, le cendré du dessous dépassant peu la poitrine, tectrices alaires bordées ou terminées d'une petite tache blanche. D. SEMICINEREUS

b'' Gorge cendrée comme la poitrine, le cendré du dessous prolongé sur l'abdomen, les grandes et les moyennes tectrices alaires bordées très finement de blanc, les petites sans tache terminale. D. TAMBILLANUS

Genre HERPSILOCHMUS

a Une large bande sourcilière blanche.

a' Sommet de la tête noir unicolore, barbe externe des rémiges rousse, dessous du corps d'un jaune très pâle. H. RUFIMARGINATUS

a'' Sommet de la tête noir tacheté au milieu de blanc, barbe externe des rémiges grise, dessous du corps blanc. H. MOTACILLOÏDES

b Sourcils composés de taches blanches isolées, sommet de la tête noir parsemé de macules blanches, bord externe des rémiges olive clair, dessous du corps jaune soufre. H. AXILLARIS

Genre MYRMOTHERULA

a Dessus du corps noir strié de blanc.
- *a'* Dessous du corps jaune sulfureux, à gorge blanche. — M. PYGMÆA
- *a''* Dessous du corps blanc strié de noir sur la poitrine.
  - *a*[a] Plumes dorsales blanches à la base. — M. SURINAMENSIS
  - *a*[b] Plumes dorsales sans rien de blanc à la base. — M. MULTOSTRIATA

b Flancs de l'abdomen d'un blanc éclatant.
- *b'* Parties supérieures du corps d'un cendré plombé. — M. AXILLARIS
- *b''* Parties supérieures du corps d'un noir intense. — M. MELÆNA

c Gorge, cou antérieur et milieu de la poitrine noirs, dos ardoisé foncé, tectrices alaires terminées d'une bordure blanche. — M. MENETRIESII

d Gorge noire tachetée de blanc.
- *d'* Dos d'un roux rougeâtre plus ou moins intense. — M. HÆMATONOTA
- *d''* Dos brun terreux. — M. GULARIS

e Gorge noire, plumage général cendré plombé, tectrices alaires noires terminées d'une tache blanche. — M. ATROGULARIS

f Gorge cendrée, plumage général cendré plombé.
- *f'* Tectrices alaires noires, les grandes et les moyennes terminées par une bordure blanche formant deux lignes continues en travers de l'aile, les rémiges tertiaires et les secondaires terminées par une tache blanche, sous-alaires cendrées. — M. HAUXWELLI
- *f''* Tectrices alaires noires dans leur partie terminale, bordées de blanc, rémiges sans tache terminale blanche, sous-alaires blanches. — M. CINEREIVENTRIS

Genre FORMICIVORA

a Dos brun roussâtre, dessous du corps et côtés de la tête noirs; cette dernière couleur bordée d'une raie blanche depuis la naissance du bec jusqu'à la queue. — F. RUFATRA

b Plumage du corps noir.
- *b'* Plumes du dos longuement blanches à la base. — F. BICOLOR
- *b''* Plumes du dos longuement blanches à la base, celles du dos inférieur et du croupion toutes blanches. — F. QUIXENSIS

Genre CERCOMACRA

a Queue unicolore. C. TYRANNINA
b Rectrices terminées par une grosse tache blanche. C. CINERASCENS

Genre PYRIGLENA

a Plumage général noir uniforme. P. PICEA
b Plumage général noir tirant au schistacé en dessous, tectrices bordées d'une ligne blanche assez fine. P. SERVA

Genre PERCNOSTOLA

a Plumage général ardoisé, plus clair en dessous, sommet de la tête et gorge noirs, tectrices alaires noires, à bordure terminale blanche fine. P. FUNEBRIS
b Plumage général ardoisé foncé, le sommet de la tête, la gorge, le devant du cou et le haut de la poitrine noirs, pli de l'aile blanc. P. FORTIS

Genre MYRMECIZA

a Dos roux brunâtre, tête schistacée, dessous jusqu'à la poitrine noir, ventre blanc. M. HEMIMELÆNA
b D'un fuligineux foncé, à milieu du dessous noir. M. MAYNANA

Genre HYPOCNEMIS

a Sommet de la tête et devant du dos variés de blanc sur un fond noir.
  a' Dessous blanc, flancs roux, poitrine variée de noir. H. CANTATOR, PERUVIANUS
  a'' Dessous jaune pâle.
    a^a Dos gris olive jusqu'aux sus-caudales, varié sur le devant de noir et de blanchâtre, flancs du ventre d'un roux pâle, queue olive brunâtre. H. SUBFLAVA
    a^b Dos gris olivâtre passant au roux brunâtre sur le dos inférieur et le croupion, varié sur le devant de noir et de blanc, flancs roux intense, queue brun roussâtre. H. FLAVESCENS
b Tête sans taches ni sourcils, dos tacheté.

b' Plumage général cendré ardoisé, dos varié de grosses taches noires, avec une bordure blanche squamiforme, tectrices alaires noires également squamulées. H. LEPIDONOTA

b'' Dos noir maculé de fauve, dessous blanc, à gorge noire et une large bande pectorale composée de grosses macules noires. H. THERESÆ

b''' Milieu du dos noir parsemé de gouttelettes blanches, bande pectorale comme chez le précédent, gorge blanche bordée d'une grosse moustache noire atteignant les tectrices auriculaires. H. NÆVIA

c Couleur générale ardoisée.

c' Front d'un cendré très clair, gorge et côtés de la tête noirs.

c^a Dessous du corps très clair, le cendré frontal prolongé en un sourcil très long, tectrices alaires noires squamulées de blanc. H. MYIOTHERINA

c^b Dessous du corps presque aussi foncé que le dos, le noir des joues n'atteignant pas le bord supérieur de l'œil, bande sourcilière très large. H. LEUCOPHRYS

c^c Milieu de la poitrine et de l'abdomen d'un cendré très clair, le noir dépassant le bord supérieur de l'œil. H. LUGUBRIS

c'' La tête et tout le cou noirs, tectrices alaires finement squamulées de blanc. H. MELANURA

c''' Milieu même de la gorge couvert de plumes noires bordées de schistacé. H. MELANOPOGON

c'''' Gorge sans noir, un point blanc sur l'extrémité des tectrices alaires. H. SCHISTACEA

d Tout le dessus du corps, le haut des côtés de la tête, les ailes et la queue noir intense, dessous blanc soyeux, taches blanches subtriangulaires sur les tectrices alaires. H. HEMILEUCA

GENRE **PITHYS**

a Huppe bifide et barbe blanches, dessus du corps schistacé, dessous et queue roux; point de ligne blanche derrière l'œil. P. PERUVIANUS

b Tout le dessus, les ailes et la queue d'un roux brunâtre; gorge, cou antérieur, milieu de la poitrine blancs, bordés largement de noir. P. LEUCASPIS

c Brun terreux à plumes du dos, les tectrices alaires, les rémiges secondaires et tertiaires ornées d'une tache antéapicale noire bordée en arrière d'une lunule ocreuse. P. LUNULATA

Genre FORMICARIUS

a Front noir, nuque rousse, gorge et côtés de la tête noirs. F. NIGRIFRONS
b Tout le sommet de la tête brun olivâtre, gorge et devant du cou noirs, sous-caudales rousses. F. ANALIS

Genre PHLOGOPSIS

a Dos et tectrices alaires à gouttes noires bordées de plus clair que le fond. PH. NIGROMACULATA
b Dos et petites tectrices squamulées de blanc. PH. ERYTHROPTERA

Genre CHAMÆZA

a D'un olive roussâtre en dessus, le plus roussâtre sur la nuque et au croupion, tout le dessous blanc squamulé de noir. C. NOBILIS
b Olive foncé en dessus, la gorge, le cou antérieur et la poitrine d'un ocreux vif, le reste du dessous blanc roussâtre squamulé de noir. C. OLIVACEA

Genre GRALLARIA

a Toutes les parties supérieures du corps striées de blanchâtre, tout le dessous squamulé de noir. G. ANDICOLA
b Tout le dessus du corps distinctement squamulé.
  b' Sommet de la tête ardoisé, dos brun olivâtre, le tout squamulé de noir; gorge brun foncé strié de roussâtre, dessous roux. G. REGULUS
  b'' Tout le dessus ardoisé foncé, squamulé de plus foncé; gorge blanchâtre bordée des deux côtés d'une moustache brune, dessous roussâtre squamulé de noirâtre. G. SQUAMIGERA
c Dessus sans taches.
  c' Dessus brun roussâtre, à sommet de la tête brun foncé, flancs roux immaculés. G. PRZEWALSKII
  c'' Dessus roux foncé, à sommet de la tête plus roux, la poitrine et les flancs de l'abdomen ferrugineux, à plumes bordées de blanc. G. ERYTHROLEUCA
  c''' Roux brunâtre pâle en dessus, plus pâle en dessous; taille petite. G. RUFULA

c'''' Dessus olive grisâtre, à sommet de la tête roux brunâtre, lores et tour des yeux blanc isabelle, flancs variés largement de lignes noires et d'olivâtre. G. ALBILORIS

c''''' Dessus olive roussâtre, dessous blanc varié fortement d'olive sur la poitrine et de cendré sur les flancs de l'abdomen. G. MINOR

GENRE CONOPOPHAGA

Fascicules postoculaires blanc soyeux.

a Sommet de la tête roux.

a' Dos brun olive, tout le dessous schistacé foncé. C. CASTANEICEPS

a'' Sommet de la tête et dos brun roussâtre, dessous cendré, à milieu du ventre blanc. C. TORRIDA

a''' Sommet de la tête brun roussâtre foncé, dessous gris cendré, à milieu de l'abdomen blanc, tectrices alaires terminées par une goutte fauve entourée d'une bordure noire. C. PERUVIANA

FAMILLE DENDROCOLAPTIDÆ

A Queue normale, à rectrices non raides.

A' Bec plus ou moins courbé.

AA Queue dépassant peu le bout de l'aile, coupée carrément ou échancrée; ailes longues, à deuxième rémige la plus longue; bec parfois droit. GEOSITTA

AB Queue médiocre dépassant les ailes jusque près de la moitié de sa longueur, à première rectrice plus courte que les autres qui sont égales; ailes médiocres, à troisième rémige la plus longue; tarse élevé; couleur rousse. FURNARIUS

AC Queue fort arrondie, dépassant les ailes dans sa plus grande moitié; ailes courtes, à troisième rémige la plus longue; bec grêle arqué dans toute sa longueur. UPUCERTHIA

A'' Bec très peu arqué.

AA Queue courte, large, fort arrondie.

Aa Quatrième rémige la plus longue. LOCHMIAS

Ab Troisième rémige la plus longue, quatrième et cinquième presque égales. SCLERURUS

Famille STRIGIDÆ

A Tête à deux huppes latérales.
- *A'* Fente auriculaire courte, moins large que l'œil.
  - *AA* Aile courte, tarse et doigts plus ou moins emplumés. — Bubo
  - *AB* Doigts dénués.
    - *Aa* Ailes dépassant l'extrémité de la queue. — Scops
    - *Ab* Ailes n'atteignant pas l'extrémité de la queue. — Lophostrix
- *A''* Fente auriculaire très longue, plus longue que le diamètre de l'œil; ailes atteignant ou dépassant l'extrémité de la queue. — Otus

B Tête sans huppes.
- *B'* Fente auriculaire petite, moins longue que le diamètre de l'œil.
  - *BA* Doigt médian avec l'ongle plus long que le tarse. — Glaucidium
  - *BB* Doigt médian avec l'ongle plus court que le tarse. — Pholeoptynk
- *B''* Fente auriculaire plus longue que le diamètre de l'œil.
  - *BA* Plumes rayonnées courtes au-dessus de l'œil.
    - *Ba* Doigts emplumés dans leur plus grande moitié basale. — Pulsatrix
    - *Bb* Doigts nus presque en entier. — Ciccaba
  - *BB* Plumes rayonnées longues autour des yeux. — Strix

Genre OTUS

- *a* Huppes longues. — O. mexicanus
- *b* Huppes très courtes. — O. brachyotus

Genre CICCABA

- *a* Dos brun uniforme. — C. melanonota
- *b* Dos brun rayé en travers de blanc. — C. virgata

Famille CAPRIMULGIDÆ

A Ongle du doigt médian non dentelé; doigt externe à cinq phalanges.
- *A'* Bec élevé, à arête fort arquée, les narines éloignées des plumes frontales; tarse court dénué. STEATORNIS
- *A''* Bec fort, aplati, couvert de plumes jusqu'aux narines; tarse court emplumé. NYCTIBIUS

B Ongle du doigt médian dentelé; doigt externe à quatre phalanges.
- *B'* Base du bec non armée de soies raides.
  - *BA* Tarse élevé non emplumé, queue médiocre terminée carrément. PODAGER
  - *BB* Tarse court emplumé au-devant et à l'extérieur.
    - *Ba* Queue courte coupée carrément. LUROCALIS
    - *Bb* Queue médiocre, échancrée. CHORDEILES
- *B''* Base du bec armée de soies raides.
  - *BA* Queue normale.
    - *Ba* Tarse court emplumé dans sa partie supérieure.
      - *Bα* Queue arrondie à l'extrémité. ANTROSTOMUS
      - *Bβ* Queue échancrée ou coupée carrément. STENOPSIS
    - *Bb* Tarse élevé non emplumé. NYCTIDROMUS
  - *BC* Queue anormale très longue et profondément fourchue. HYDROPSALIS

Genre NYCTIBIUS

- *a* Blanchâtre vermiculé de brun, à bande pectorale noire incomplète, taille forte. N. GRANDIS
- *b* Macules noires sur la poitrine.
  - *b'* Brun grisâtre en dessus strié de noir, taille médiocre. N. JAMAÏCENSIS
  - *b''* Roux strié et vermiculé de noir, taille médiocre. N. LONGICAUDATUS
- *c* Marron foncé vermiculé de noir; poitrine, ventre et scapulaires à taches blanches bordées de noir, taille petite. N. BRACTEATUS

Genre CHORDEILES

- *a* Quatre premières rémiges traversées par une large bande blanche.

a' Sommet de la tête noir maculé de roussâtre, dos noir varié de taches et ocelles gris. C. ACUTIPENNIS

a'' Sommet de la tête gris roussâtre varié de grosses stries noires, dos gris clair strié de noir. C. PERUVIANUS

b Quatre premières rémiges sans bande blanche, les autres primaires à base blanche formant un grand miroir. C. RUPESTRIS

Genre ANTROSTOMUS

a Rémiges sans raie blanche.

a' Trois rectrices latérales de chaque côté de la queue terminées longuement de roussâtre; demi-anneau collaire roussâtre. A. RUFUS

a'' Trois rectrices latérales terminées courtement de blanc; plumage roux brunâtre, demi-anneau collaire blanc, ocelles noirs sur les scapulaires, macules blanches sur l'abdomen. A. OCELLATUS

a''' Rectrices traversées d'une douzaine de raies roussâtres tachetées de noirâtre. A. MACULICAUDUS

b Les deuxième, troisième et quatrième rémiges traversées d'une raie blanche.

b' Deuxième et troisième rectrices terminées de blanc. A. NIGRESCENS

b'' Première rectrice terminée de blanc. A. PARVULUS

Genre STENOPSIS

a Trois rectrices latérales de chaque côté de la queue blanches dans le tiers terminal, une bande blanche dans leur moitié, dessin du dessus du corps subtil. S. BIFASCIATA

b Deux rectrices latérales de chaque côté de la queue terminées de blanc, dessin du dessus du corps gros. S. ÆQUICAUDATA

Genre HYDROPSALIS

a Rectrices externes fort prolongées, atténuées à l'extrémité, à baguette et barbe externe toutes blanches. H. SEGMENTATA

b Rectrice externe fort prolongée noire, terminée de blanc, bordée intérieurement de roux à la base, collier roux. H. LYRA

c Queue profondément bifurquée, deuxième et troisième rectrices blanches terminées de noirâtre. H. BIFURCATA

Famille CYPSELIDÆ

A Tarses emplumés; doigts externe et médian à trois phalanges; pouce dirigé en avant ou sur le côté; rectrices normales.
- *a* Tarse emplumé, doigts dénués, pouce antérieur. Cypselus
- *a'* Tarse et doigts emplumés, pouce latéral. Panyptila

B Rectrices terminées en pointe.
- *b* Baguettes à épines proéminentes. Chætura
- *b'* Baguettes à épines non proéminentes. Cypseloïdes

Genre CYPSELUS

- *a* D'un noir fuligineux mat.
  - *a'* Croupion et un demi-collier blancs. C. andecolus
  - *a''* Plaque jugulaire et une bande le long du dessous blanches. C. montivagus
- *b* Dessus noir lustré de verdâtre, à plumes bordées finement de blanchâtre. C. squamatus

Genre CHÆTURA

- *a* Queue courte, à rectrices ne dépassant les tectrices que par leurs épines. Ch. poliura
- *b* Queue dépassant plus ou moins les tectrices.
  - *b'* Noir fuligineux, avec un collier roux très large. Ch. rutila
  - *b''* Noir luisant en dessus, cendré foncé au croupion et en dessous. Ch. Sclateri

Famille HIRUNDINIDÆ

A Bec robuste, non aplati à la base, à narines rondes. Progne

B Bec aplati à la base, à narines oblongues.
- *B'* Narines voisines des plumes frontales; couleur des parties supérieures du corps à reflet métallique plus ou moins fort.
  - *BA* Queue plus ou moins profondément fourchue.
    - *Ba* Sous-caudales concolores à l'abdomen. Hirundo
    - *Bb* Sous-caudales noires. Atticora
  - *BB* Queue coupée carrément ou à peine entaillée. Petrochelidon

B'' Narines éloignées des plumes frontales; couleur sans reflet métallique sur les parties supérieures du corps.
- *BA* Barbe externe de la première rémige normale. — COTYLE
- *BB* Barbe externe de la première rémige à barbules raides recourbées à l'extrémité en crochet. — STELGIDOPTERYX

GENRE PROGNE

a Couleur générale noire lustrée de bleu. — P. PURPUREA
b Bicolore.
- *b'* Noir lustré de bleu en dessus, blanc en dessous, nébulé de gris au cou et à la poitrine. — P. CHALYBÆA
- *b''* Gris fuligineux en dessus, dessous blanc, à poitrine grise. — P. TAPERA

GENRE HIRUNDO

a Rectrices externes prolongées en un appendice atténué.
- *a'* Front gris blanchâtre; dessous roux. — H. ERYTHROGASTRA
- *a''* Front et dessous du corps roux. — H. TYTLERI

b Rectrices latérales normales.
- *b'* Dessous et croupion blancs.
  - *ba* Dessous blanc pur, une grosse tache alaire blanche. — H. ALBIVENTRIS
  - *bb* Flancs et dessous grisâtres, devant du front blanchâtre. — H. LEUCORRHOA
  - *bc* Poitrine et côtés de l'abdomen enduits de grisâtre, point de tache blanche alaire. — H. LEUCOPYGIA
- *b''* Tout le dessous grisâtre, à gorge d'un gris plus foncé; croupion concolore au dos. — H. ANDICOLA

GENRE ATTICORA

a Dessous du corps blanc, sous-caudales noires. — A. CYANOLEUCA
b Dessous du corps noir ou gris.
- *b'* Dessous noir, à bande pectorale blanche. — A. FASCIATA
- *b''* Dessous et croupion gris, tibias blancs. — A. TIBIALIS
- *b'''* Dessous gris uniforme, à sous-caudales noirâtres, croupion concolore au dos. — A. CINEREA

GENRE STELGIDOPTERYX

a Plumes du croupion concolores au dos. — S. RUFICOLLIS
b Plumes du croupion blanchâtres. — S. UROPYGIALIS

Famille TROCHILIDÆ

A Queue normale.
- *A'* Oiseaux sans huppe et sans collerette sur les côtés du cou.
  - *AA* Bec à arête dorsale dénudée entre les scutelles nasales, dépassant le bord antérieur des narines, ces dernières découvertes.
    - *Aa* Bec plus long que la tête, non cylindrique, rectrices médianes presque égales aux submédianes.
      - *Aα* Bec arqué presque en tiers de cercle, à mâchoire comprimée et creusée sur les côtés jusqu'aux $^2/_3$ de sa longueur. EUTOXERES
      - *Aβ* Bec légèrement arqué, à mâchoire non comprimée, à sillon creux n'atteignant pas la moitié du bec. GLAUCIS
    - *Ab* Rectrices médianes notablement plus longues que les submédianes, ordinairement allongées et brusquement atténuées après les submédianes, cette partie allongée souvent blanche. PHAËTHORNIS
    - *Ac* Baguette des rémiges primaires dilatée et aplatie dans sa partie basale.
      - *Aα* Queue longue et fourchue profondément. EUPETOMENA
      - *Aβ* Ailes presque coudées, chez le ♂ la baguette de la première rémige très dilatée à la base et non barbée à l'extérieur de cette partie, queue non fourchue arrondie. CAMPYLOPTERUS
      - *Aγ* Ailes falciformes chez le ♂, à baguette de la première rémige peu dilatée et peu aplatie, barbée à l'extérieur. APHANTOCHROA
    - *Ad* Baguette des rémiges primaires normale, queue légèrement arrondie. LAMPORNIS
    - *Ae* Bec droit aussi long que les deux tiers du corps; des plumes squamiformes au front. FLORICOLA
    - *Af* Bec droit ou peu arqué, moins long que les deux tiers du corps.
      - *Aα* Queue tronquée ou presque tronquée.

b Dessus du corps brun roussâtre.
b' Sourcils jaune verdâtre devant l'œil, ocreux vif en arrière. A. TEMPORALIS
b'' Sourcils d'un roux ferrugineux, gorge ocreuse, côtés du cou roux. A. RUFICOLLIS

GENRE XENOPS

a Abdomen strié de blanc. X. RUTILUS
b Abdomen unicolore. X. LITTORALIS

GENRE SITTASOMUS

a Tête gris olive unicolore. S. AMAZONUS
b Tête à baguettes claires dans les plumes du sommet, des côtés et de la gorge. S. STICTOLÆMUS

GENRE MARGARORNIS

a Sourcil blanc jaunâtre, dos et queue rousse, gorge et taches du dessous blanc jaunâtre. M. PERLATUS
b Point de bande sourcilière, dos brun roussâtre, queue noirâtre, gorge et taches du dessous roux ocreux. M. BRUNNESCENS

GENRE DENDROCINCLA

a Côtés de la tête grisâtres, gorge d'une nuance plus pâle que celle de la poitrine et variée par les baguettes blanchâtres dans toutes les plumes. D. FUMIGATA
b Gorge blanchâtre traversée dans toute sa longueur par deux raies foncées. D. MERULA

GENRE DENDROCOLAPTES

a Tectrices alaires rayées de noir comme le dos. D. RADIOLATUS
b Tectrices alaires variées de quelques macules noires et des stries fauves sur les baguettes. D. VALIDUS

GENRE PICOLAPTES

a Gorge largement d'un ocreux pur, de grosses stries isabelles sur le dessous du corps. P. SOULEYETI
b Milieu de la gorge jaunâtre, des stries fines blanchâtres, plus ou moins aiguës au bout sur le dessous du corps. P. WARSZEWICZI

culaire parée d'une touffe de plumes se détachant du corps, queue à rectrices larges peu inégales. PETASOPHORA

Aβ Queue entaillée, à rectrices terminées en angle émoussé. JOLÆMA

Aγ Queue à rectrices rigides, peu inégales, atténuées vers l'extrémité et aiguës au bout, barbe externe de la rectrice latérale étroite; gorge et devant du cou parés d'une plaque squamiforme verte ou d'un bleu violet. OREOTROCHILUS

Aδ Bec peu arqué et peu dilaté, queue presque tronquée, à rectrices larges subarrondies, gorge et devant du cou métallique non squamiforme. FLORISUGA

Aε Rémige externe atténuée, queue échancrée, à rectrices larges terminées en angle obtus, gorge et poitrine écailleuses. LAFRESNYA

Ab Bec droit, à base plus ou moins emplumée couvrant les narines; tête triangulaire; queue plus ou moins entaillée.

Aα Bec plus long que la tête et le corps. DOCIMASTES

Aβ Bec moins long que le corps.

Ax Bec beaucoup plus long que la tête.

*A*1 Taille très forte, plumage non métallique, queue longue et large. PATAGONA

*A*2 Extrémité du bec courbée légèrement en haut; queue ample et longue, ailes en grande partie bleu métallique. PTEROPHANES

*A*3 Sommet de la tête métallique fort luisant, corps en partie; queue et ailes rousses, une gemme violette au cou du mâle. DIPHLOGÆNA

*A*4 Queue ample faiblement entaillée; plumage métallique, une gemme jugulaire et prase frontale brillants. HELIANTHEA

*A*5 Queue longue, fourchue; plumage métallique, tête ornée d'une bande médiane fort brillante. CLYTOLÆMA

*A*6 Queue ample fort entaillée; plumage brillant, une large bande pectorale blanche ou rousse, ou plumage général sombre prenant sous certain jour un éclat étincelant au croupion. BOURCIERIA

*A*7 Queue médiocre entaillée; plumage métallique, bande médiane du sommet de la tête et gorge fort brillants; rémiges secondaires en partie rousses. LAMPRASTER

*A*8 Queue longue profondément fourchue; plumage métallique, celui du centre du sommet de la tête, gorge et poitrine fort brillants. HELIODOXA

Axx Bec presque aussi long que la tête.

*A*1 Queue large médiocrement entaillée; tarse emplumé; plumage métallique fort étincelant sous certain jour, en partie non métallique. PANOPLITES

*A*2 Queue longue fourchue; plumage métallique, prase frontale et gorge fort brillants. HELIOTRYPHA

*A*3 Bec légèrement fléchi; queue large peu entaillée, à baguettes roussâtres dans les rectrices; dessous du corps fauve, une gemme rouge fort brillante au cou. PHÆOLÆMA

Ac Bec droit, la tête subarrondie.

Aα Bec moins long que la moitié du corps.

*A*1 Pattes garnies d'une manchette duveteuse, dessous du corps fort étincelant. ERIOCNEMIS

*A*2 Pattes non pattues, plumage général terne, excepté le croupion qui est largement fort étincelant, une touffe de plumes blanches ou fauves se détachant du corps sur le milieu de l'abdomen. AGLÆACTIS

Aβ Bec égalant les $^2/_3$ du corps, front paré d'une plaque métallique fort luisante. DORYFERA

Ad Bec légèrement arqué égal à la moitié du corps, queue échancrée, gorge et cou antérieur parés de plumes squamiformes vertes étendues jusqu'au bord antérieur des yeux, le reste du dessous ordinairement bleu. THALURANIA

Ae Bec droit plus long que la tête.

Aα Gorge et cou antérieur parés d'une plaque rouge ou violette très polie. HELIANGELUS

Aβ Gorge et cou antérieur parés de plumes squamiformes vertes. UROSTICTE

Af Bec droit égal ou un peu plus long que la tête, fort comprimé à l'extrémité même.

Aα Queue échancrée métallique sur les deux pages, changeant en bleu ou lilas sur la supérieure. METALLURA

Aβ Queue tronquée, à rectrices peu métalliques terminées d'une tache blanchâtre, gorge blanchâtre parsemée de points submétalliques. ADELOMYIA

Aγ Queue tronquée médiocrement métallique, à rectrices terminées par une bordure blanche, sommet de la tête et gorge d'un bleu violet. KLAÏS

Ag Oiseaux ornés d'un rabat jugulaire métallique très splendide, plus ou moins atténué, ordinairement bicolore.

Aα Bec plus court que la tête, queue échancrée, à rectrices larges, poitrine à plumes colorées. RHAMPHOMICRON

Aβ Bec aussi long que la moitié du corps, queue fort échancrée, à rectrices larges, blanches à la base, poitrine blanche. OREONYMPHA

Ah Bec assez large, fort comprimé dans le quart de sa longueur en une lame très mince, une touffe bleue violette se détachant de chaque côté du cou.

Aα Queue médiocre, arrondie. SCHISTES

Aβ Queue longue, à rectrices externes courtes. HELIOTHRIX

B Oiseaux ornés d'une huppe, d'une collerette, ou à queue singulière, à narines couvertes de plumes frontales, à base de l'arête du bec non visible.

Ba Une bande blanche ou roussâtre en travers du dos inférieur.

[illegible]

(1) Queue très courte ne dépassant pas les tectrices ; trois rectrices latérales de chaque côté fort atténuées, rigides et plus courtes que les suivantes. — MYRMIA

(2) Queue dépassant les tectrices.

(1) Deux rectrices latérales fines en lame de poignard, troisième large graduellement atténuée vers l'extrémité qui est aiguë, deuxième et troisième égales et les plus longues. — ACUSTRURA

(2) Rectrice externe très mince, les deux suivantes fines subparallèles, la troisième plus longue. — CHÆTOCERCUS

GENRE GLAUCIS

(1) Dessous roussâtre, queue roux cannelle traversée par une bande noire devant l'extrémité blanchâtre, rectrices médianes bronzées. — G. HIRSUTUS

(2) Gorge noire, queue [illegible], à rectrices médianes d'un vert noirâtre. — G. CERVINICAUDA

GENRE PHAETHORNIS

(1) Rectrices médianes prolongées en un appendice atténué, aussi long environ que leur partie large et ordinairement blanc.

(1) Bec presque droit, dessous fauve pâle. — PH. ROUBIDOUX

(2) Bec courbé.

(a) Dessous cendré plus ou moins foncé, lustré en partie de vert, dos et base des rectrices vert bleuâtre. — PH. EMILIÆ

(b) Dessous fauve roussâtre.

(aa) Gorge grise traversée d'une ligne médiane fauve, plumes du croupion frangées de roux. — PH. SUPERCILIOSUS

(aβ) Gorge blanche bordée des deux côtés d'une moustache grise, sous-caudales rousses. — PH. SYRMATOPHORUS

(ac) Dessous gris, plumes du croupion bordées de gris. — PH. HISPIDUS

(2) Rectrices médianes peu prolongées en un appendice atténué graduellement, à extrémité blanche ou rousse, queue du ♂ arrondie.

(a) Dessous roux.

ba Rectrices médianes noirâtres devant l'extrémité. — Ph. griseigularis
bb Gorge grise striée de noirâtre. — Ph. striigularis
b'' Bande pectorale distincte chez le ♂, mandibule orangée en grande partie. — Ph. nigricinctus

Genre APHANTOCHROA

Dessus du corps vert.
a Dessous blanc tacheté de vert. — A. hyposticta
b Plaque gulaire squamiforme d'un rouge lilas. — A. gularis

Genre OREOTROCHILUS

Plaque gulaire verte, squamiforme chez le ♂.
a Dessous du corps blanc avec une bande médiane noire. — O. leucopleurus
b Dessous du corps blanc avec une large bande médiane brun châtain. — O. Estellæ
c Dessous du corps noir velouté lustré de bleu. — O. melanogaster

Genre DORYFERA

a Dessous du corps noir chez le ♂, gris verdâtre chez la ♀, plaque frontale violette chez le ♂, vert bleuâtre chez la ♀. — D. Johannæ
b Dessous du corps olive grisâtre, plaque frontale verte. — D. rectirostris

Genre JOLÆMA

a Front sans éclat métallique, une tache violet améthyste squamiforme sur le devant du cou. — J. Schreibersi
b Plumes frontales fort étincelantes, poitrine verte. — J. whitelyana

Genre THALURANIA

Gorge et devant du cou largement vert brillant.
a Dessous du corps bleu de Prusse, taille plus forte. — T. nigrofasciata
b Dessous du corps bleu de Prusse, sommet de la tête cuivreux, taille plus faible. — T. Jelskii

Genre **LOPHORNIS**

a Gorge d'un vert métallique, huppe rousse ponctuée de noir. L. Delattrii
b Gorge non métallique, huppe verte ponctuée de blanc, dessous brun foncé, à lustre bronzé. L. Verreauxi

Genre **GOULDIA**

a Huppée, à poitrine noire non métallique. G. Popelairi
b Sans huppe, poitrine vert métallique bordée de rouge. G. Langsdorffi

Genre **MYRTIS**

a Gorge d'un vert métallique bordée de violet, quatre rectrices latérales également larges dans toute leur longueur. M. fanny
b Gorge d'un rouge violet métallique passant au bleu, trois rectrices latérales atténuées et pointues. M. Yarrelli

Genre **STEGANURA**

Plumage du tarse roux.
a Rectrice externe courbée en dedans, à palette subpentagonale à peine plus longue que large. S. peruana
b Rectrice externe droite, à barbe non barbée jusqu'à la palette.
b' Palette ovale allongé, dessous du corps vert. S. solstitialis
b'' Palette subpentagonale, dessous blanc tacheté de vert. S. addæ
c Rectrice externe droite toute barbée, palette oblongue subarrondie au bout. S. cissiura

Genre **LESBIA**

a Rectrice externe noire lustrée très légèrement de vert, à tache terminale verte, le gris blanchâtre de la barbe externe dépassant longuement la rectrice submédiane. L. gracilis
b Rectrice externe noire dans la moitié basale, puis verte terminée par une tache brillante vert olive tirant au rouge, le gris de la barbe externe n'atteignant pas l'extrémité de la rectrice submédiane. L. nuna

Genre CYNANTHUS

a Rectrice externe noir bleuâtre jusqu'à l'extrémité des subexternes, puis d'un vert très brillant, dessous d'un vert bronzé. C. MOCOA
b Rectrice externe noir indigo, plus bleue après avoir dépassé la submédiane, extrémité (?), dessous gris cendré, à plumes bordées de blanchâtre. C. GRISEIVENTRIS

Genre SAPPHO

a Gorge vert métallique, queue très brillante d'un rouge vineux ou cramoisi, à extrémité des rectrices noire. S. PHAON
b Gorge rouge, rectrices sans noir terminal. S. CAROLI

Genre AGLÆACTIS

Dessous roux.
a Touffe pectorale fauve.
a' Tout le dessous roux. A. CUPREIPENNIS
a'' Poitrine et abdomen d'un brun bronzé. A. CAUMATONOTA
b Touffe pectorale blanche, croupion lilas pourpré. A. CASTELNAUDI

Genre RHAMPHOMICRON

a Dessus du corps d'un bleu violâtre, rabat gulaire vert doré large et unicolore. R. MICRORHYNCHUS
b Rabat gulaire étroit bicolore.
b' Sommet de la tête concolore au dos.
b[a] Couleur générale olive, rabat vert en haut et d'un violet rougeâtre en bas; queue olive bronzée. R. OLIVACEUS
b[b] Couleur du dessus bleue, rabat vert en haut, violet en bas; queue bleue verdâtre. R. STANLEYI
b'' Sommet de la tête roux marron rougeâtre, queue bronzée. R. RUFICEPS

Genre METALLURA

a Rabat gulaire rouge, couleur générale bronzée, queue bronzée changeant au bleu. M. EUPOGON
b Rabat gulaire vert.

b' Plumage général noir avec un faible lustre rougeâtre.
- *b*[a] Queue rouge vineux changeant au bleu. M. JELSKII
- *b*[b] Queue cuivreuse. M. OPACA

b'' Vert en dessus.
- *b*[c] Queue d'un pourpré bronzé, dessus du corps vert. M. TYRIANTHINA
- *b*[d] Queue violet changeant au bleu, dessus du corps vert. M. SMARAGDINICOLLIS
- *b*[e] Queue bronzée changeant en bleu. M. ÆNEICAUDA

GENRE **ADELOMYIA**

Dessous du corps isabelle sale à flancs verts.

a Gorge maculée de bleu. A. INORNATA
b Gorge maculée de vert. A. CHLOROSPILA
c Gorge maculée d'olive brunâtre. A. MELANOGENYS

GENRE **PETASOPHORA**

a Plumage général vert métallique.
- *a'* Touffe auriculaire rouge violâtre, sous-caudales blanches. P. SERRIROSTRIS
- *a''* Touffe auriculaire d'un bleu foncé. P. ANAÏS
- *a'''* Touffe auriculaire d'un bleu violâtre. P. CYANOTIS

b Plumage général non métallique, touffe auriculaire d'un bleu violet. P. DELPHINÆ

GENRE **HELIANTHEA**

Dessous du corps revêtu de plumes roussâtres à la base.

a Queue roux pâle, à extrémité vert bronzé, prase jugulaire violette, tectrices alaires d'un vert cuivreux. H. OSCULANS
b Queue fauve roussâtre terminée de vert bronzé, prase jugulaire bleu saphir passant au violet, tectrices alaires d'un rouge cuivreux. H. DICHROURA

GENRE **HELIOTRYPHA**

a Gorge d'un violet très brillant. H. VIOLA
b Gorge d'un rouge feu très brillant. H. MICRASTER

a'' Bordures des rémiges primaires jaune olivâtre.
aa Huppe interne rouge orangé, bordée finement de jaune; plumes du sommet de la tête olive foncé; front peu enduit de blanchâtre. M. SIMILIS
ab Huppe interne orangée rougeâtre; sourcils très larges, front longuement blanchâtre; plumes du sommet et des côtés de la tête d'un cendré ardoisé. M. GRANADENSIS
b Sourcils nuls.
b' Tête cendrée, à huppe interne orangée en entier chez le mâle, jaune citron chez la femelle; gorge et devant du cou largement blancs. M. SULPHUREUS
b'' Tête d'un olive très foncé, à huppe interne d'un minium orangé bordée de plumes blanches en partie jaunes. M. LUTEIVENTRIS

GENRE RHYNCHOCYCLUS

a Queue olivâtre.
a' Sommet de la tête concolore au dos.
aa Cou antérieur et poitrine d'un roux olivâtre; plumes alaires bordées de roussâtre. R. FULVIPECTUS
ab Poitrine jaunâtre pâle. R. VIRIDICEPS
a'' Sommet de la tête cendré.
aa Sommet de la tête cendré bleuâtre; tache auriculaire noirâtre très prononcée; longueur de l'aile, 74 millimètres. R. PERUVIANUS
ab Sommet de la tête schistacé enduit plus ou moins d'olive; tache auriculaire nulle; longueur de l'aile, 61-66 millimètres. R. SULPHURESCENS
ac Sommet de la tête ardoisé enduit légèrement d'olivâtre; tache auriculaire nulle; longueur de l'aile, 53 millimètres. R. MEGACEPHALUS
ad Sommet de la tête cendré, à plumes enduites de vert olive sur leurs extrémités; longueur de l'aile, 53 millimètres. R. POLIOCEPHALUS
b Queue rousse; plumes alaires bordées largement de roux; dessous du corps fort strié. R. RUFICAUDA

GENRE MYIODYNASTES

a Corps fort tacheté.
a' Le brun foncé occupant largement le milieu

des rectrices; tout le milieu du ventre tacheté; une bande foncée large au milieu des sous-caudales. M. SOLITARIUS

a'' Le brun foncé occupant finement le milieu des rectrices.

aa Menton blanc, moustache brune fine, milieu du ventre blanc pur; bordures des rémiges primaires rousses. M. AUDAX

ab Menton noirâtre prolongé en moustaches larges; milieu du ventre blanc plus ou moins enduit de jaune; sous-caudales blanches ou jaunes, à baguettes blanches en grande partie. M. LUTEIVENTRIS

b Corps non tacheté.

b' Dos olive; queue schistacée, à bordures olives fines. M. CHRYSOCEPHALUS

b'' Dos brunâtre; queue en grande partie et croupion roux. M. ATRIFRONS

TRIBU TYRANNINÆ

A Bec depuis la commissure plus long que le tarse.

A' Bec beaucoup plus long que le tarse.

AA Bec aplati et large, cils maxillaires prolongés jusque près de son extrémité; tête ornée d'une huppe en éventail transversal. MUSCIVORA

AB Bec large non aplati, cils maxillaires courts; tête ornée d'une huppe interne jaune. MEGARHYNCHUS

A'' Longueur du bec dépassant peu celle du tarse.

AA Bec aplati à la base, subtriangulaire, comprimé à l'extrémité, à crochet terminal fort courbé, la ligne latérale convexe à la base et concave à l'extrémité.

Aa Cils maxillaires n'atteignant pas la moitié du bec, la deuxième rémige la plus longue, la troisième distinctement plus courte; couleur du dessous du corps rousse. HIRUNDINEA

Ab Cils maxillaires dépassant la moitié du bec; les deuxième et troisième rémiges les plus longues et égales. CONTOPUS

AB Bec triangulaire non aplati à la base, à côtés presque droits, terminé par un crochet courbé.

Aa Bec faible; sommet de la tête à plumes allongées, formant une couronne abondante; coloration différente dans les deux sexes. PYROCEPHALUS

Ab Bec épais, large à la base.

Aα Point de huppe interne. MYIARCHUS
Aβ Une huppe interne jaune ou orangée.
A1 Première rémige atténuée faiblement à l'extrémité, les autres normales; bec plus court que la tête. EMPIDONOMUS
A2 Six rémiges primaires fort atténuées à l'extrémité. TYRANNUS
A3 Deux rémiges externes fort atténuées à l'extrémité; queue très longue et très profondément fourchue. MILVULUS

B Bec depuis la commissure plus court que le tarse.
B' Huppe interne jaune ou rouge, queue beaucoup plus courte que l'aile. MYIOBIUS
B'' Huppe interne peu prononcée; queue à peine moins longue que l'aile. MITREPHORUS
B''' Point de huppe interne.
BA Troisième et quatrième rémiges les plus longues. EMPIDOCHANES
BB Deuxième et troisième rémiges les plus longues. EMPIDONAX

GENRE **CONTOPUS**

a Plumage général ardoisé, moins foncé en dessous; taille forte. C. ARDESIACUS
b Couleur du dessus du corps gris olivâtre, à sommet de la tête plus foncé.
b' Taille forte; milieu du dessous jaunâtre pâle, flancs largement gris olive strié de plus foncé; longueur de l'aile, 113 millimètres. C. BOREALIS
b'' Taille petite.
ba Sommet de la tête noirâtre; bec fort aplati à la base, à arête dorsale fort proéminente; longueur de l'aile, 72-74 millimètres. C. PUNENSIS
bb Sommet de la tête brun; arête dorsale du bec presque effacée.
bα Longueur de l'aile, 83 millimètres. C. PLEBEJUS
bβ Longueur de l'aile, 74 millimètres. C. VIRENS

GENRE **PYROCEPHALUS**

a La tête et tout le dessous rouges chez le mâle.
a' Taille plus forte; longueur de l'aile, 80 millimètres. P. CORONATUS

a'' Taille moins forte; longueur de l'aile, 74-75 millimètres. P. RUBINEUS
b La tête et le dessous d'un fuligineux lavé de rosé. P. OBSCURUS

GENRE MYIOBIUS

a Huppe interne dans les deux sexes.
a' Dessus du corps olive, croupion et ventre d'un jaune pâle.
aa Poitrine et flancs largement roux, huppe interne jaune chez le mâle, rousse chez la femelle; bec large. M. VILLOSUS
ab Poitrine légèrement enduite de roussâtre; bec peu élargi. M. BARBATUS
a'' Tout le dessous roux vif; dos olive foncé; une bande ocreuse en travers du croupion; huppe jaune citron dans les deux sexes. M. CINNAMOMEUS
a''' Dessus olive verdâtre, croupion et ventre largement jaunes; queue rousse unicolore; huppe interne jaune. M. PHŒNICURUS
a'''' Dessus olive foncé, dessous jaune serin, à poitrine enduite de roussâtre; huppe interne roux orangé. M. PULCHER
a''''' Espèces tachetées en dessous.
aa Dessous fort strié.
aα Fond du dessous blanc; huppe interne roux cannelle vif; souvent jaune chez la femelle. M. CRYPTERYTHRUS
aβ Fond du dessous jaunâtre pâle; huppe interne jaune. M. NÆVIUS
ab Dessous roux non strié; huppe interne roux cannelle. M. RUFESCENS
b Huppe interne chez le mâle, nulle chez la femelle; olive verdâtre en dessus, jaune en dessous; tour de l'œil jaune; point de bandes transalaires. M. SUPERCILIOSUS
c Point de huppe interne dans les deux sexes, queue, ailes et dessous du corps roux. M. ERYTHRURUS

GENRE EMPIDOCHANES

a Barbe interne des rémiges et des rectrices bordée largement de roux; ventre, sous-caudales et sous-alaires roux. E. PŒCILURUS
b Queue schistacée; milieu du ventre jaunâtre pâle; deux bandes transalaires et bordures des rémiges roussâtres. E. OLIVUS

Genre MYIARCHUS

a Poitrine cendrée; abdomen jaune pâle.
- *a'* Barbe interne des rectrices largement rousse. M. ERYTHROCERCUS
- *a"* Point de roux sur la queue.
  - *aa* Sommet de la tête noir. M. NIGRICEPS
  - *ab* Sommet de la tête cendré, à milieu plus ou moins noirâtre. M. PHÆOCEPHALUS
  - *ac* Sommet de la tête brun olivâtre.
    - *aα* Barbe externe des rectrices latérales grise, bandes transalaires peu prononcées. M. TYRANNULUS
    - *aβ* Barbe externe des rectrices latérales blanche ou blanchâtre; bandes transalaires bien prononcées. M. CEPHALOTES

b Tout le dessous du corps roux. M. SEMIRUFUS

Genre TYRANNUS

a Abdomen jaune.
- *a'* Gorge cendrée, poitrine olivâtre; huppe interne orangée bordée de jaune; queue profondément échancrée. T. MELANCHOLICUS
- *a"* Gorge blanche passant au cendré clair sur la poitrine; huppe interne jaune citron; queue à peine entaillée. T. NIVEIGULARIS

b Abdomen blanc; tête noire au sommet et sur les côtés, huppe interne orangée bordée de blanc; queue terminée de blanc. T. PIPIRI

c Tout le dessous gris cendré; sommet de la tête noir; huppe interne jaune citron. T. AURANTIO-ATROCRISTATUS

Famille PIPRIDÆ

A Rémiges primaires atténuées aiguës à l'extrémité.
- *A'* Primaires jusqu'à la cinquième ou sixième longuement atténuées, plus ou moins courbées, les secondaires raides. — Chiromachæris
- *A''* Primaires jusqu'à la troisième ou quatrième atténuées jusqu'à l'extrémité, droites. — Chiroxiphia
- *A'''* Première et deuxième rémiges longuement atténuées à l'extrémité; dessous du corps strié. — Machæropterus

B Rémiges primaires normales.
- *B'* Queue courte, raide ou molle, quelquefois à rectrices prolongées en appendices criniformes. — Pipra
- *B''* Queue longue, étagée; plumes frontales érigées, piliformes. — Metopothrix
- *B'''* Queue médiocre; coloration modeste.
  - *BA* Queue coupée carrément ou légèrement arrondie.
    - *Ba* Bec médiocre turdiforme. — Heteropelma
    - *Bb* Bec court assez robuste. — Schiffornis
    - *Bc* Bec court et faible.
      - *Bα* Troisième et quatrième rémiges les plus longues et égales. — Chloropipo
      - *Bβ* Troisième rémige la plus longue. — Neopipo
  - *BB* Queue plus ou moins étagée.
    - *Ba* Queue cunéiforme, à rectrices terminées par une tache blanche. — Piprites
    - *Bb* Queue à six rectrices médianes larges presque égales, les autres fort étagées et étroites. — Heterocercus

Genre PIPRA

- *a* Queue à baguettes des rectrices prolongées en un appendice criniforme plus long que les rectrices mêmes, et courbées; tête et cou postérieur du mâle rouge écarlate, tout le dessous jaune. — P. filicauda
- *b* Queue normale courte.
  - *b'* Tête à huppe cervicale bifide; tête rouge. — P. cornuta
  - *b''* Tête sans huppe.
    - *ba* Queue à rectrices raides, les baguettes épaisses et raides.
      - *bα* Tête rouge, à gorge noire, tibias jaunes. — P. chloromeros

bβ Tête jaune, à gorge noire, tibias rouges. P. AURICAPILLA
bb Queue à rectrices non raides.
bα Tête rouge, à gorge noire; tibias blancs avec du rouge sur le bas du côté externe. P. RUBRICAPILLA
bβ Vertex, nuque et derrière du cou rouges; front, côtés de la tête, gorge et devant du cou jaunes. P. FASCIATA
bγ Sommet de la tête bleu.
*b*1 Front concolore au reste du sommet; le croupion et les sus-caudales bleus. P. CÆRULEOCAPILLA
*b*2 Front noir, point de bleu au croupion. P. CYANEOCAPILLA
bδ Sommet de la tête blanc.
*b*1 Croupion et sus-caudales bleus. P. ISIDORI
*b*2 Point de bleu au croupion.
*b** Taille plus forte, le blanc plus prolongé sur la nuque; longueur de l'aile, 65 millimètres. P. CORACINA
*b*** Taille moins forte, le blanc moins prolongé sur la nuque; longueur de l'aile, 59 millimètres. P. LEUCOCILLA
bε Plumage vert olive dans les deux sexes. P. VIRESCENS

GENRE MACHÆROPTERUS

a Sommet de la tête jaune avec une raie médiane rouge. M. PYROCEPHALUS
b Sommet de la tête rouge. M. STRIOLATUS

GENRE HETEROPELMA

a Dessus olive sale, presque uniforme partout. H. WALLACII
b Dessus olive brunâtre, à sommet de la tête d'une nuance différente; bordures des plumes alaires roussâtres. H. AMAZONUM

Famille COTINGIDÆ

Tribu TITYRINÆ

A Deuxième rémige du mâle normale; plumage général cendré avec du noir et du blanc. — Tityra

B Deuxième rémige du mâle courte et aiguë au bout.

B' Cils maxillaires assez forts; plumage du mâle cendré foncé sans blanc aux ailes et la queue, roux dans la femelle. — Hadrostomus

B'' Cils maxillaires faibles et courts; plumage du mâle cendré, noir ou vert, souvent avec du blanc aux ailes et sur la queue; coloration différente dans les femelles; rarement rousse dans les deux sexes. — Pachyrhamphus

Tribu LIPAUGINÆ

A Cils maxillaires forts.

A' Ligne dorsale du bec droite jusqu'à l'extrémité courbée en crochet; narines rondes; talon armé de squamules disposées en scie. — Lipaugus

A'' Ligne dorsale du bec courbe; narines larges en travers; talon sans armure. — Lathria

B Cils maxillaires courts et fins; ligne dorsale du bec droite jusqu'à l'extrémité courbée en crochet. — Aulia

Tribu ATTILINÆ

Ligne dorsale du bec droite, jusqu'au bout courbé en crochet; cils maxillaires forts, mais courts. — Attila

Tribu RUPICOLINÆ

A Bec couvert en entier par les plumes frontales érigées en une crête verticale fort élevée. — Rupicola

B Plumes frontales courtes et verticales, le reste du plumage du sommet de la tête plat. — Phœnicocercus

Tribu COTINGINÆ

A Tête sans huppe.
- *A'* Plumage général vert.
  - *AA* Troisième et quatrième rémiges les plus longues et égales. — Ampelio
  - *AB* Quatrième et cinquième rémiges les plus longues et égales. — Pipreola
- *A''* Rémiges primaires externes atténuées; tectrices alaires non atténuées; narines découvertes. — Cotinga
- *A'''* Rémiges primaires non atténuées.
  - *AA* Taille forte, narines couvertes en entier par les plumules, ailes et queue à lustre coracin. — Sericossypha
  - *AB* Taille petite, narines couvertes par les plumules criniformes, plumage modeste, à faisceau de plumes violettes sur les flancs. — Iodopleura

B Huppe occipitale assez longue, composée de plumes atténuées, rousses en grande partie. — Heliochera

C Huppe interne rouge cannelle. — Doliornis

Tribu GYMMODERINÆ

A Tête surmontée d'un panache élevé abritant toute la tête et le bec, une expansion cutanée plus ou moins longue au-dessous de la gorge, empluméc ou dénuée. — Cephalopterus

B Tête sans huppe.
- *B'* Toute la tête et le cou emplumés, narines couvertes de plumes frontales.
  - *BA* Bec fort élargi, aplati, deux fois aussi large que haut derrière les narines, troisième et quatrième rémiges égales et les plus longues. — Querula
  - *BB* Bec peu élargi et non aplati, moins de deux fois aussi large que haut, derrière les narines; quatrième et cinquième rémiges égales et les plus longues. — Pyroderus
- *B''* Joues et côtés du cou dénués en grande partie; narines non couvertes; deuxième rémige la plus longue. — Gymnoderus

Genre TITYRA

a Femelle striée de noir; le noir du sommet de la tête chez le mâle prolongé jusqu'à la nuque. — T. cayana

b Femelle non striée de noir.

b' Queue blanche à la base et à l'extrémité. T. SEMIFASCIATA
b'' Queue toute noire. T. ALBITORQUES

GENRE **HADROSTOMUS**

a Mâle, à cravate rosée en travers du cou. H. MINOR
b Point de rosé au cou.
b' Mâle, à dessous du corps gris pâle. H. AUDAX
b'' Mâle, à dessous du corps schistacé cendré. H. HOMOCHROUS

GENRE **PACHYRHAMPHUS**

a Sommet de la tête noir chez le mâle.
a' Dos du mâle vert olivâtre. P. VIRIDIS
a'' Dos du mâle cendré.
aa Rectrices terminées longuement de blanc. P. ALBOGRISEUS
ab Rectrices bordées finement au bout de blanchâtre. P. CINEREUS
a''' Dos du mâle noir.
aa Rectrices terminées longuement de blanc.
aα Dessous du corps cendré ardoisé. P. ATRICAPILLUS
aβ Dessous du corps noirâtre. P. NIGER
ab Rectrices non terminées de blanc.
aα Dessus du corps cendré ardoisé. P. SPODIURUS
aβ Dessous blanchâtre, à cou jaune, le tout ondulé de foncé. P. VERSICOLOR
b Sommet de la tête roux dans les deux sexes, plumage général roux. P. RUFESCENS

GENRE **ATTILA**

a Sommet et côtés de la tête cendré obscur, croupion et milieu de l'abdomen jaune roussâtre clair. A. CITRINIVENTRIS
b Sommet de la tête strié finement de foncé, milieu de l'abdomen jaunâtre. A. TORRIDUS
c Sommet de la tête aussi roux que le dos, rien de jaune ni au croupion ni au milieu du ventre. A. THAMNOPHILOÏDES

GENRE **PIPREOLA**

a Capuchon céphalique.
a' Vert obscur entouré d'une bordure jaune; le jaune des flancs strié de vert. P. RIEFFERI
a'' Noir entouré d'une bordure jaune; le jaune de l'abdomen squamulé de noirâtre. P. INTERMEDIA

a''' Noir non bordé de jaune; milieu de l'abdomen jaune pur, flancs verts. P. LUBOMIRSKII
b Capuchon céphalique peu prononcé et réduit au-devant du visage, plaque gutturale d'un orangé vif. P. ELEGANS

GENRE AMPELIO

a Dos vert olivâtre unicolore, dessous rayé en travers de noir; capuchon noir chez le mâle. A. ARCUATUS
b Plumes du dos noires bordées de vert olive, celles du dessous vert olives, à disque jaune; chez le mâle sommet de la tête noir, lores et demi-collier nucal jaunes. A. CINCTUS

GENRE HELIOCHERA

a Rectrices à tache blanche subterminale, point de collier roux. H. RUBROCRISTATA
b Rectrices sans tache blanche, collier roux occupant la gorge, région auriculaire et la nuque. H. RUFAXILLA

GENRE COTINGA

a Dessus du corps bleu.
a' Bleu uniforme sur tout le dessus, tectrices alaires bleues, gorge largement violette. C. MAYNANA
a'' Base des plumes bleues longuement noires, tectrices alaires noires bordées de bleu, gorge et devant du cou violet. C. CAYANA
b Dessus du corps noir squamulé de blanc, dessous blanc, gorge violet obscur. C. PORPHYROLÆMA

Famille PHYTOTOMIDÆ

Genre PHYTOTOMA

a Tout le sommet de la tête roux. — Ph. rara
b Le roux n'occupe que la bordure frontale. — Ph. Raimondii

Famille CORVIDÆ

A Plumes frontales plus ou moins longues et érigées en y formant une espèce de huppe. — Cyanocorax
B Plumes frontales courtes sans former de huppe. — Cyanocitta

Genre CYANOCORAX

a Plumage du corps violâtre, tête et devant du cou noirs. — C. violaceus
b Dessus du corps bleu foncé, tête et devant du cou noirs; la nuque, le cou postérieur, le dessous du corps et les rectrices latérales blancs. — C. mystacalis
c Dessus du corps vert, dessous jaune, sommet de la tête blanc jaunâtre. — C. yncas

Genre CYANOCITTA

a Plumage général bleu verdâtre, plaque gulaire d'un vert très obscur, entourée en dessous d'une bordure blanche. — C. viridicyanea
b Plumage général bleu outremer, plaque gulaire bleu violâtre, à bordure blanche peu prononcée. — C. jolliæ

Famille ICTERIDÆ

A Bec épais, large à la base, à arête dorsale fort dilatée en une scutelle plus ou moins élevée au-dessus du front.
- *A'* Scutelle frontale renflée.
  - *AA* Ailes n'atteignant qu'à la moitié de la queue. — Clypeicterus
  - *AB* Ailes dépassant l'extrémité de la queue. — Ocyalus
- *A''* Scutelle frontale plus ou moins aplatie.
  - *AA* Queue longue plus ou moins étagée. — Ostinops
  - *AB* Queue médiocre arrondie à l'extrémité. — Cassicus

B Bec moins fort, à arête dorsale non élargie.
- *B'* Tête tout emplumée.
  - *BA* Queue assez longue, à rectrices latérales fort raccourcies; couleur prédominante jaune. — Icterus
  - *BB* Queue médiocre, à rectrices externes peu raccourcies. — Xanthosomus
  - *BC* Queue médiocre coupée carrément à l'extrémité.
    - *Ba* Bec conique élevé à la base; beaucoup de rouge sur le dessous du corps.
      - *Bα* Sourcils blancs chez le mâle. — Trupialis
      - *Bβ* Point de sourcil blanc chez le mâle. — Leistes
    - *Bb* Bec assez faible, point de rouge. — Agelaius
    - *Bc* Plumage noir uniforme.
      - *Bα* Bec court épais.
        - *B1* Queue coupée carrément. — Molothrus
        - *B2* Queue arrondie.
          - *B'* Troisième, quatrième, cinquième et sixième rémiges les plus longues. — Dives
          - *B''* Deuxième et troisième rémiges les plus longues. — Lampropsar
        - *B3* Rectrices prolongées en pointe. — Dolichonyx
- *B''* Lores, tour de l'œil et côtés de la gorge dénués. — Gymnomystax

C Bec très épais, large à la base, à arête dilatée en une scutelle frontale aplatie; deuxième rémige la plus longue; plumage noir coracin. — Cassidix

D Bec à arête non élargie à la base; troisième rémige la plus longue; queue cunéiforme; plumage noir, à reflets bleus ou verts. — Quiscalus

Genre OSTINOPS

a Dos, ailes et ventre marron, tête, cou et poitrine jaune olivâtre. — O. Yuracarium

b Couleur noire prédominante au corps. O. DECUMANUS
c Couleur olive prédominante au corps.
c' Plaque frontale élargie. O. VIRIDIS
c'' Plaque frontale peu large.
ca Bec jaune.
cα Quatre rectrices médianes toutes olives. O. ATROVIRENS
cβ Deux rectrices médianes et la barbe interne des submédianes olives; côtés du front d'un jaune sulfureux. O. ALFREDI
cb Bec noirâtre. O. ANGUSTIFRONS

GENRE CASSICUS

a Noirs, à croupion jaune.
a' Rectrices jaunes à la base.
aa Dans la plus grande moitié. C. PERSICUS
ab Dans la plus petite moitié. C. FLAVICRISSUS
a'' Rectrices noires en entier.
aa Ailes toutes noires. C. CHRYSONOTUS
ab Grosse tache jaune sur les tectrices alaires. C. LEUCORHAMPHUS
b Noirs à croupion rouge, plumage luisant. C. AFFINIS
c Noirs en entier.
c' Troisième et quatrième rémiges les plus longues; base du bec plombé olivâtre. C. SOLITARIUS
c'' Quatrième et cinquième rémiges les plus longues, bec tout jaune. C. HOLOSERICEUS

GENRE ICTERUS

a Plumage noir, à tache humérale jaune.
a' Sommet de la tête, croupion et tibias jaunes. I. CHRYSOCEPHALUS
a'' Sommet de la tête, croupion et tibias noirs. I. CAYENNENSIS
b Plumage jaune en grande partie, région interscapulaire noire.
b' Rectrices noires, l'externe blanche à l'extérieur. I. GRACE-ANNÆ
b'' Rectrices médianes noires, les externes jaunes. I. MESOMELAS
c Plumes de la gorge longues et atténuées. Plumage orangé, à dos concolore, queue toute noire. I. CROCONOTUS

GENRE TRUPIALIS

a Sous-alaires blanches.
a' Bec dépassant 3 centimètres; tibias gris, tachetés de noir. T. MILITARIS
a'' Bec n'atteignant pas 3 centimètres; tibias blancs. T. BELLICOSA

Famille TANAGRIDÆ

Tribu EUPHONIINÆ

A Coloration dissemblable dans les deux sexes.
- *A'* Bec deux fois aussi large à la base que haut; queue médiocre, faiblement échancrée. — PROCNIAS
- *A''* Bec un peu plus large à la base que haut; queue courte.
  - *AA* Plumage général vert vif, à éclat vitreux, dessous jaune; femelle peu différente. — CHLOROPHONIA
  - *AB* Plumage du mâle noir lustré de bleu violet, à dessous jaune ou roux, femelle olive; ou mâle olive peu différent de la femelle. — EUPHONIA

B Coloration semblable dans les deux sexes; bec aussi haut que large à la base, queue médiocre. — PIPRIDEA

Genre EUPHONIA

- *a* Mâle noir lustré de bleu en dessus.
  - *a'* Sommet de la tête bleu. — E. NIGRICOLLIS
  - *a''* Tête et gorge tout noirs. — E. RUFIVENTRIS
  - *a'''* Sommet de la tête plus ou moins jaune.
    - *aa* Queue noire en entier.
      - *aα* Le jaune du sommet de la tête prolongé jusqu'à la nuque; gorge noire. — E. SATURATA
      - *aβ* Le jaune occupant le front et le vertex; gorge jaune. — E. MELANURA
    - *ab* Rectrices externes à tache blanche.
      - *aα* Gorge jaune; sommet de la tête jaune jusqu'à la nuque. — E. HYPOXANTHA
      - *aβ* Gorge noire.
        - *a*1 Lustre violet sur la tête et le cou.
          - 1 Le jaune frontal et du dessous clair. — E. SERRIROSTRIS
          - 2 Le jaune frontal et du dessous orangé sale. — E. XANTHOGASTRA
        - *a*2 Lustre de la tête et du cou non violet. — E. MINUTA
- *b* Mâle vert olive en dessus.
  - *b'* Front d'une nuance tirant au jaunâtre. — E. CHRYSOPASTA
  - *b''* Front largement jaune soufré. — E. CHALCOPASTA

Genre PIPRIDEA

- *a* Moustaches noires sur les côtés de la gorge. — P. CASTANEIVENTRIS
- *b* Point de moustaches noires. — P. VENEZUELENSIS

FAMILLE TANAGRINÆ

A Bec fin, peu dilaté à la base, comprimé dans la moitié terminale.
- *A'* Deuxième, troisième et quatrième rémiges les plus longues et égales; narines couvertes en grande partie de plumules frontales; couleur prédominante bleu foncé. — TANAGRELLA
- *A''* Deuxième et troisième rémiges les plus longues et presque égales; narines presque rondes et découvertes; couleur prédominante vert brillant; plumes de la tache parotique à barbules jointes en faisceaux rappelant une production de cire. — CHLOROCHRYSA

B Bec court, peu épais, élargi à la base; queue médiocre; rectrices presque égales entre elles.
- *B'* Deuxième, troisième et quatrième rémiges les plus longues, première = cinquième; couleurs en général vives, à éclat vitreux, changeant de nuance vers la lumière. — CALLISTE
- *B''* Bec plus élargi à la base; couleur dominante bleue. — DIVA

C Bec court et épais.
- *C'* Narines couvertes par les plumes frontales; bec comprimé, plus haut que large à la base; quatrième rémige la plus longue. — IRIDORNIS
- *C''* Narines rondes, ouvertes en entier.
  - *CA* Bec aussi haut que large à la base; deuxième et troisième rémiges les plus longues, première plus courte que la quatrième. — TANAGRA
  - *CB* Bec plus haut que large à la base; troisième rémige la plus longue; taille forte. — BUTHRAUPIS
  - *CC* Bec à arête dorsale peu courbée; narines oblongues.
    - *Ca* Une tache temporale jaune ou rouge, correspondante à la couleur de l'abdomen; troisième et quatrième rémiges les plus longues; première = septième. — POECILOTHRAUPIS
    - *Cb* Une grosse tache jaune cervico-nucale; troisième et quatrième rémiges les plus longues; première = sixième. — COMPSOCOMA

D Bec à mandibule fort élevée, plate, à base arrondie, élevée au-dessus du plumage voisin, d'une couleur plombée. — RHAMPHOCELUS

E Bec plus long que la moitié de la tête, à ligne dorsale faiblement courbe, terminée en crochet courbé, plus haut que large à la base.
- *E'* Bord de la mâchoire droit non armé d'une dent médiane.
  - *EA* Cils maxillaires fort développés; coloration semblable dans les deux sexes. TRICHOTHRAUPIS
  - *EB* Cils maxillaires peu développés.
    - *Ea* Plumage dissemblable dans les sexes, beaucoup de noir chez les mâles. TACHYPHONUS
    - *Eb* Plumage semblable dans les deux sexes; rien de noir; une huppe cervicale plate plus ou moins développée. EUCOMETIS
- *E''* Bord de la mâchoire armé au milieu d'une dent plus ou moins développée.
  - *EA* Bec plus ou moins faible.
    - *Ea* Tête noire uniforme. LANIO
    - *Eb* Tête à bande médiane largement rousse. CREURGOPS
  - *EB* Bec épais.
    - *Ea* Quatrième et cinquième rémiges les plus longues; première = huitième. PHŒNICOTHRAUPIS
    - *Eb* Deuxième jusqu'à la cinquième rémige les plus longues; première plus longue ou égale à la sixième. PYRANGA

F Bec plus ou moins faible, plus haut que large à la base, droit, à ligne dorsale peu courbée; coloration des deux sexes semblable ou peu différente.
- *F'* Première rémige égale à la neuvième. NEMOSIA
- *F''* Première rémige plus longue que la huitième, couleur prédominante olive. CHLOROSPINGUS
- *F'''* Bec très faible, à arête dorsale légèrement courbe, doigt externe sans ongle égal à l'interne. MICROSPINGUS

GENRE **TANAGRELLA**

- *a* Front d'un bleu concolore au-dessous du corps. T. IRIDINA
- *b* Front d'un céladon doré. T. CALLOPHRYS

GENRE **CALLISTE**

- *a* Dos noir velouté, tête verte, dessous bleu de ciel, à gorge violette.
  - *a'* Croupion rouge feu. C. YENI

a'' Croupion jaune et rouge. C. CŒLICOLOR
b Dos noir mat.
b' Tête avec la gorge et le cou bleus. C. CYANICOLLIS
b'' Tête et cou lilacés, gorge et joues vert pomme. C. NIGRICINCTA
b''' Tête noire, à sourcils très larges et gorge verts. C. MELANOTIS
b'''' Tête à sommet vert, dessous du corps tacheté de vert et de noir. C. BERLEPSCHI
b''''' Tête à sommet et la nuque jaune, front et joues d'un rouge miniacé. C. PARZUDAKII
c Dos noir squamulé de vert.
c' Milieu du ventre jaune. C. XANTHOGASTRA
c'' Milieu du ventre blanc. C. PUNCTATA
d Dos vert strié de noir.
d' Croupion jaune.
d[a] Côtés de la tête noirs, avec la gorge et une tache antéoculaire vertes. C. SCHRANKI
d'' Croupion vert, tête jaune, gorge noire.
d[b] Tête d'un jaune doré en entier. C. VENUSTA
d[c] Tête à sommet orangé. C. XANTHOCEPHALA
d''' Croupion bleu verdâtre.
d[e] Front jaune doré, tache auriculaire orangé doré, bordée en dessous de noir. C. CHRYSOTIS
e Dos straminé, sommet de la tête roux, la gorge et le devant du cou d'un bleu violâtre. C. CYANOLÆMA
f Dos noir strié de jaune, la tête et le dessous du corps jaune, gorge marron foncé. C. PULCHRA
g Dos vert, dessous bleu, tête marron rougeâtre. C. GYROLOÏDES
h Plumage général bleu, dos noir, milieu de l'abdomen jaune sulfureux. C. BOLIVIANA
i Plumage général bleu céladon; nuque traversée d'une raie d'un roux soyeux peu large. C. FULVICERVIX
k Sommet de la tête et dessous du corps largement noirs.
k' Dos bleu argenté.
k[a] Gorge et côtés de la tête d'un jaune roussâtre. C. ARGENTEA
k[b] Gorge et côtés de la tête d'un vert pomme jaunâtre. C. VIRIDICOLLIS
k'' Dos straminé argenté.
k[c] Gorge et côtés de la tête vert céladon. C. ARGYROPHENGES

GENRE **DIVA**

a Plumage général bleu. D. VASSORI
b Plumage général bleu, à tête céladon grisâtre. D. BRANICKII

c Plumage général bleu, à dos noir. tache nucale d'un blanc straminé. D. ATROCÆRULEA

GENRE **IRIDORNIS**

a Tête jaune au sommet, dos bleu, abdomen roux. I. JELSKII
b Tête noire, demi-collier nucal jaune, dos et poitrine bleus, ventre verdâtre sale. I. REINHARDTI
c Tête à sommet ardoisé foncé, dos olive, gorge jaune, abdomen ocreux. I. ANALIS

GENRE **TANAGRA**

a Plumage général cendré bleuâtre.
  a' Petites tectrices alaires d'un blanc violâtre. T. CŒLESTIS
  a'' Petites tectrices alaires d'un bleu outremer, le cendré du corps coloré plus ou moins de verdâtre. T. CANA
b Plumage général olive violâtre; tête, devant de l'aile vert pomme jaunâtre. T. MELANOPTERA
c Dessous du corps jaune.
  c' D'une nuance sulfurée; dos olive brunâtre; la tête avec le cou et les ailes bleus. T. DARWINI
  c'' Poitrine orangée; dos noir; la tête avec le cou et les ailes bleus. T. STRIATA
d Dessous du corps cendré ardoisé, dos vert olive, sommet de la tête bleu outremer. T. CYANOCEPHALA

GENRE **PŒCILOTHRAUPIS**

a Dessous du corps jaune.
  a' Tête et dos bleuâtre, tache lacrymale jaune. P. LACRYMOSA
  a'' Tête et dos ardoisé olivâtre, à peine bleuâtre, taches lacrymales et palpébrales jaunes. P. PALPEBROSA
b Poitrine et abdomen d'un rouge vif.
  b' Sous-caudales rouges variées de noir. P. IGNICRISSA
  b'' Sous-caudales rouges en entier. P. IGNIVENTRIS

GENRE **RHAMPHOCELUS**

a Dos, ailes et queue noirs; la tête, le cou et le dessous rouges, masque céphalique et milieu du ventre noirs. R. NIGROGULARIS
b Plumage général noir rougeâtre, à croupion et les sous-caudales rouges. R. LUCIANI

c Tête et cou d'un rouge obscur.
c' Abdomen et dos d'un rouge très obscur. R. JACAPA
c'' Abdomen et dos noirs. R. ATROSERICEUS

GENRE TACHYPHONUS

a Plumage général du mâle noir.
a' Une tache humérale blanche. T. MELALEUCOS
a'' Bande humérale rouge. T. PHŒNICEUS
a''' Croupion fauve.
aα Le noir du plumage général coracin, milieu du sommet de la tête fauve, côtés du bas-ventre roux. T. NAPENSIS
ab Le noir du plumage mat.
aα Gorge fauve, milieu du sommet de la tête orangé rougeâtre, à bordures fauves. T. CRISTATUS
aβ Poitrine et ventre roux, tache verticale fauve. T. RUFIVENTRIS

GENRE PHŒNICOTHRAUPIS

a Rouge sale, à huppe interne rouge feu. PH. PERUVIANUS
b Olive jaunâtre, à gorge striée de jaune. PH. CARMIOLI

GENRE PYRANGA

a Mâle tout rouge.
a' D'un rouge rosé; bec non denté. P. ÆSTIVA
a'' D'un rouge cinabarin; bec denté. P. AZARÆ
b Rouge à ailes et queue noires, deux bandes blanches en travers de l'aile. P. ARDENS
c Rouge sur la tête, le cou et la poitrine, jaune sur l'abdomen et le croupion. P. RUBRICEPS

GENRE NEMOSIA

a Grise en dessus.
a' Tête rousse en entier.
aa Dessous du corps roux, à milieu du ventre blanc. N. ORNATA
ab Gorge et poitrine rousses, abdomen blanc, à flancs gris. N. PECTORALIS
a'' Sommet de la tête gris, côtés de la tête roussâtres.

aa Gorge jaunâtre, dessous roussâtre, à milieu du ventre blanc. N. SORDIDA
ab La gorge et tout le dessous ocreux. N. INORNATA
b Vert olive en dessus, côtés de la tête et gorge noirs.
b' Sourcils et demi-collier d'un jaune sulfureux. N. GUIRA
b'' Sourcil roux foncé très fin. N. GUIRINA
c Dos noir sur les côtés, jaune au milieu; gorge jaune, le reste du dessous blanc.
c' Point de jaune sur l'aile. N. FLAVICOLLIS
c'' Tache jaune sur l'aile. N. PERUANA
d Dessus du corps bleuâtre, dessous blanc. N. PILEATA

GENRE CHLOROSPINGUS

a Olive verdâtre en dessus.
a' Olive jaunâtre en dessous, milieu de la gorge jaunâtre; sourcil jaunâtre peu marqué. CH. OLEAGINEUS
a'' Blanc grisâtre en dessous, à flancs olives.
aa Tête schistacé brunâtre, gorge et devant du cou fauve blanchâtre. CH. CINEREOCEPHALUS
ab Tête brun noirâtre, à grosse tache postoculaire blanche, bande pectorale olive pâle. CH. ALBITEMPORALIS
a''' Gris sale en dessous, tête concolore au dos, gorge jaune. CH. FLAVIGULARIS
a'''' Jaune en dessous.
aa Tête noire au sommet et les côtés, sourcils blancs très longs. CH. AURICULARIS
ab Tête cendré ardoisé, gorge et poitrine cendré blanchâtre; sous-caudales roussâtres. CH. CHRYSOGASTER
ac Front jaune, sourcils jaunes verdâtres; sous-caudales roussâtres. CH. FRONTALIS
ad Front cendré, sourcils blancs. CH. SUPERCILIOSUS
b Gris en dessus.
b' Blanchâtre en dessous.
ba Sourcils et tache génale blancs. CH. LEUCOGASTER
bb Point de sourcils blancs, bec mince. CH. XANTHOPHTHALMUS
b'' Roux en dessous.
ba Tête et gorge noires, sourcils blancs longs et larges. CH. CASTANEICOLLIS
bb Tête cendrée au sommet, noire sur les côtés. CH. BERLEPSCHI

TRIBU ARREMONINÆ

A Queue plus longue que l'aile.
A' Queue fort étagée, plumage blanc et noir. CISSOPIS

A'' Couleur du dessous jaune, blanche ou cendrée; sommet de la tête roux; bec court. CARENOCHROUS

B Queue moins longue que l'aile.

B' Plumage général vert vif. PSITTOSPIZA

B'' Coloration modeste.

BA Bec conique, à mâchoire courbée légèrement au bout.

Ba Aile plus longue que la queue. ARREMON

Bb Aile aussi longue que la queue; bec médiocre; pattes fortes. BUARREMON

BB Bec robuste, élevé.

Ba Bords de la mâchoire droits jusqu'à l'extrémité courbée, non armés d'une dent.

Bα Taille forte, quatrième rémige la plus longue. SALTATOR

Bβ Taille médiocre, troisième rémige la plus longue. ORCHESTICUS

Bb Bords de la mâchoire découpés au milieu en une dent.

Bα Taille forte; dent forte; échancrure terminale bien prononcée. PITYLUS

Bβ Taille médiocre; dent faible; échancrure terminale presque nulle. CONOTHRAUPIS

GENRE **CARENOCHROUS**

a Dessous du corps jaune.

a' Gorge jaune.

aa Miroir alaire blanc, dos et queue ardoisés; sommet de la tête et nuque largement roux. C. LATINUCHUS

ab Miroir alaire nul; dos et queue olive sale, milieu de la tête et de la nuque d'un jaune sale. C. TRICOLOR

a'' Gorge noire; dos fuligineux noirâtre, aile sans miroir; sommet de la tête et nuque largement roux vif. C. MELANOLÆMUS

b Dessous du corps blanc ou blanc roussâtre.

b' Miroir alaire blanc volumineux; front longuement noir, bordé des deux côtés de blanc, grosse tache cervicale fauve. C. DRESSERI

b'' Miroir alaire nul, front longuement noir, bordé des deux côtés de blanc, le reste du sommet de la tête marron foncé. C. SEEBOHMI

c Dessous du corps cendré plombé, gorge large-

ment blanche, à longues moustaches noires; milieu du front noir, côtés blancs; sommet de la tête et nuque roux; miroir nul. C. TACZANOWSKII

GENRE ARREMON

a Dos olive brunâtre; sommet de la tête noir, à raie médiane cendrée; devant de l'aile orangé; bec rouge. A. ERYTHRORHYNCHUS
b Dos olive verdâtre, sommet de la tête tout noir; bec noir. A. NIGRICEPS
c Dos ardoisé; sommet de la tête tout noir; bec noir. A. ABEILLEI

GENRE BUARREMON

a Olive en dessus.
  a' Sommet de la tête roux, demi-collier noir. B. BRUNNEINUCHUS
  a'' Sommet de la tête cendré au milieu, noir sur les côtés.
    aa Demi-collier noir. B. TORQUATUS
    ab Point de demi-collier noir. B. AFFINIS
  a''' Toute la tête avec la gorge fauve roussâtre. B. FULVICEPS
b Ardoisé en dessus.
  b' Toute la tête avec la gorge blanche et une grosse tache noire cervicale. B. ALBICEPS
  b'' Tête noirâtre, gorge largement avec le bas des joues d'un blanc isabelle, moustaches noires courtes. B. NATIONI

GENRE SALTATOR

a Dos plus ou moins olive.
  a' Sourcils blancs.
    a[a] Gorge blanche par-devant, ocreuse en bas, bordée des deux côtés d'une large moustache noire. S. MAGNUS
    a[b] Sourcil fin, gorge blanche bordée des deux côtés d'une moustache grise foncé. S. SUPERCILIARIS
    a[c] Sourcil très large lavé de jaunâtre, gorge blanche sans moustaches, poitrine enduite de jaune. S. FLAVIDICOLLIS
  a'' Point de sourcil blanc, milieu de la gorge blanc bordé largement de gris olivâtre, poitrine et abdomen fortement striés. S. ALBICOLLIS

b Dos plombé.
b' Gorge blanche bordée de moustaches noires, poitrine et abdomen gris cendré, queue unicolore. S. CÆRULESCENS
b'' Gorge fauve blanchâtre bordée de moustaches noires, poitrine et abdomen fauve grisâtre, queue unicolore. S. AZARÆ
b''' Gorge blanche au milieu même, côtés de la tête, de la gorge et le devant du cou noirs, poitrine cendrée ou fauve grisâtre, du blanc à l'extrémité des deux rectrices externes. S. LATICLAVIUS

FAMILLE FRINGILLIDÆ

A Bec épais.
A' Ligne dorsale du bec arquée.
AA Ligne dorsale du bec fort arquée, narines latérales. NEORHYNCHUS
AB Dos du bec bossu à la base, à courbure très faible après avoir dépassé les narines; narines voisines du sommet. GNATHOSPIZA
AC Ligne dorsale du bec en arc faible.
Aa Narines voisines du sommet.
Aα Extrémité de la mâchoire courbée en bas, à échancrure profonde; couleur générale jaune avec du noir. PHEUCTICUS
Aβ Extrémité de la mâchoire à peine inclinée, à échancrure faible; couleur générale bleue chez les mâles. GUIRACA
Aγ Bec bossu à la base, puis abaissé en ligne droite. SPOROPHILA
Ab Narines petites situées dans la moitié de la hauteur de la mâchoire; courbure du dos médiocre. PIEZORHINA
A'' Bec très court.
AA Pyrrhulacé, à dos en courbe régulière. SPERMOPHILA
AB Bec bossu à la base, puis à courbe très faible. CATAMENIA
AC Bec comprimé, à arête dorsale largement aplatie, dans toute sa longueur, les côtés creusés. CATAMBLYRHYNCHUS
B Bec conique.
B' Queue fort arrondie à l'extrémité.
BA Plumage du dos strié de foncé sur un fond clair.

Ba Bec plus haut que large, comprimé sur les côtés. HÆMOPHILA
Bb Bec presque aussi large que haut. COTURNICULUS
BB Plumage noir métallique.
Ba Noir en entier. VOLATINIA
Bb Blanc en dessous, tête rouge. PAROARIA
BC Plumage cendré uniforme; bec sylviforme. XENOSPINGUS
B'' Queue peu arrondie à l'extrémité.
BA Queue unicolore; huppe rouge chez les mâles. CORYPHOSPINGUS
BB Barbe interne des rectrices blanche. POOSPIZA
B''' Queue légèrement entaillée.
BA Troisième rémige la plus longue.
Ba Aucune trace d'échancrure maxillaire, extrémité de la mâchoire non courbée. DIUCA
Bb Extrémité de la mâchoire courbée légèrement, quelquefois une trace de l'échancrure. PHRYGILUS
Bc Ailes courtes. ZONOTRICHIA
BB Deuxième et troisième rémiges les plus longues.
Ba Queue jaune à la base, ou blanche en partie. CHRYSOMITRIS
Bb Queue unicolore. SYCALIS
C Queue à rectrices presque égales, bec semblable à ceux des Conirostres, mais un peu plus gros, à dos légèrement enfoncé devant les narines. SPODIORNIS

GENRE **PHEUCTICUS**

a La tête, le cou et tout le dessus noirs.
a' Croupion noir. PH. AUREIVENTRIS
a'' Croupion jaune. PH. UROPYGIALIS
b La tête, le cou et tout le dessous jaunes. PH. CHRYSOGASTER

GENRE **SPERMOPHILA**

a Noir en dessus et sur la tête, dessous blanc.
a' Tout le cou avec la gorge, la poitrine et les côtés de l'abdomen blancs, le miroir alaire blanc. S. LUCTUOSA
a'' Milieu de la gorge et de la poitrine noir bordé de blanc, plumes des flancs ocellées, miroir alaire blanc, petit. S. OCELLATA
b Dos cendré.
b' Gorge, milieu de la poitrine et une raie le long du milieu de l'abdomen roux. S. CASTANEIVENTRIS

b'' Dos strié de noirâtre; gorge marron foncé, reste du dessous blanc. S. TELASCO

c Gris olivâtre en dessus.

c' Le front, les joues, la gorge et le haut de la poitrine noirâtres; abdomen jaune soufré pâle. S. GUTTURALIS

c'' Dessous du corps blanc jaunâtre, miroir alaire et deux bandes transalaires blancs. S. SIMPLEX

c''' Dessous du corps gris foncé. S. OBSCURA

c'''' Dessous du corps gris pâle. S. PAUPER

GENRE CATAMENIA

a Queue traversée d'une large bande blanche.

a' Plus fort; bordures blanches aux rémiges primaires non dilatées à la base pour former un miroir alaire, très peu de blanchâtre au milieu du bas-ventre. C. ANALIS

a'' Moins fort; bordures blanches aux rémiges primaires dilatées à la base en formant un miroir alaire, milieu du ventre blanc. C. ANALOÏDES

b Queue sans bande blanche.

b' Dos strié de noir. C. RUFIROSTRIS

b'' Dos non strié. C. HOMOCHROA

GENRE CORYPHOSPINGUS

a Noir en dessus, à huppe et le dessous rouge intense. C. CRUENTA

b Dos gris brunâtre lavé de rouge, huppe d'un rouge vif, dessous du corps rouge carminé. C. CRISTATA

c Dos cendré ardoisé, huppe rouge intense bordée de noir, dessous cendré clair, à milieu blanc. C. PILEATUS

GENRE POOSPIZA

a Cendré bleuâtre en dessus, à dos lavé de fauve, tache pectorale noire, barbe interne des rectrices en grande partie blanche. P. BONAPARTEI

b Ardoisé brunâtre en dessus, la poitrine et le haut des côtés de l'abdomen roux. P. CÆSAR

GENRE PHRYGILUS

a La tête avec la gorge et le cou supérieur cendré plombé.

a' Dos olive verdâtre, dessous du corps jaune sans nuance rousse. PH. ALDUNATI
a'' Dos olive jaunâtre et dessous du corps jaune avec une nuance rousse. PH. GAYI
b La tête avec la gorge et le cou supérieur noir ou noirâtre, dos roux, ventre jaune au milieu, poitrine et flancs roux. PH. ATRICEPS
c Plumage général gris ou cendré.
c' Queue traversée d'une large bande blanche. PH. ALAUDINUS
c'' Queue sans bande.
*c*ᵃ La gorge, le cou antérieur et le milieu de la poitrine et de l'abdomen noirs squamulés de blanc. PH. FRUTICETI
*c*ᵇ Tout le corps cendré bleuâtre plus clair en dessous qu'en dessus. PH. RUSTICUS
*c*ᶜ Dessus du corps gris strié de noir, dessous du corps et bande sourcilière gris blanchâtre.
cα Longueur de l'aile, 71-76 millimètres. PH. PLEBEJUS
cβ Longueur de l'aile, 60-65 millimètres. PH. OCULARIS

GENRE **CHRYSOMITRIS**

a Plumage général noir, à bande transalaire et la région anale jaunes. CH. ATRATA
b Tout le dessus noir, tout le dessous jaune, miroir alaire blanc. CH. COLUMBIANA
c Tête noire, dos olive.
c' Croupion et le dessous du corps jaune sulfureux. CH. CAPITALIS
c'' Croupion et le dessous du corps jaune orangé. CH. SIEMIRADZKII
d La tête et tout le cou antérieur noirs, dos noirâtre frangé d'olive, le croupion, le dessous du corps et une bande transalaire jaune sulfureux. CH. UROPYGIALIS

GENRE **SYCALIS**

a Olive jaunâtre en dessus, sommet de la tête orangé. S. FLAVEOLA
b Tout le corps jaune tirant au verdâtre en dessus. S. LUTEA
c Dos gris verdâtre, sommet de la tête olive jaunâtre, croupion jaune verdâtre uniforme. S. CHLORIS
d Dos cendré, tête jaune, croupion olive jaunâtre. S. UROPYGIALIS
e Dos gris strié de noirâtre.
e' Dessous du corps avec les flancs jaunes. S. LUTEIVENTRIS
e'' Dessous du corps jaune à flancs gris. S. ARVENSIS
f Dos roux, dessous cendré. S. ERYTHRONOTA

Famille PICIDÆ

A Queue courte, à rectrices non raides, arrondie au bout. — Picumnus

B Queue fort étagée, à rectrices raides, les médianes les plus longues, fort atténuées à l'extrémité, à baguette épaisse.

B' Sillons sus-nasaux saillants, prolongés jusque près du bout de la mâchoire.

BA Bec droit, robuste; queue longue; plumage général noir et rouge.

Ba Doigt antérieur externe plus long que le postérieur externe. — Dryocopus

Bb Doigt antérieur externe moins long que le postérieur externe. — Campephilus

BB Bec moins robuste; queue médiocre; ailes rayées en travers de blanc ou de blanchâtre. — Picus

B'' Sillons sus-nasaux moins saillants et moins prolongés.

BA Ailes non rayées en travers, rémiges à baguette brune. — Chloronerpes

BB Ailes rayées en travers, rémiges à baguette jaune. — Chrysoptilus

B''' Sillons nasaux peu prononcés; arête dorsale fort arquée. — Celeus

B'''' Sillons nasaux presque nuls ou peu marqués.

BA Arête dorsale du bec saillante. — Hypoxanthus

BB Arête dorsale du bec arrondie peu saillante.

Ba Bec moins long que la tête. — Melanerpes

Bb Bec plus long que la tête. — Colaptes

Genre PICUMNUS

a Dessous du corps immaculé.

a' Dessous d'un cannelle foncé. — P. rufiventris

a'' Dessous roussâtre. — P. Castelnaudi

b Dessous du corps rayé ou maculé.

b' Dessus varié de macules bien distinctes.

b[a] Dessous jaunâtre rayé sur toute la surface de brun noirâtre. — P. Buffoni

b'' Dessus à bordures claires dans les plumes, peu prononcées.

b[b] Dessous jaunâtre rayé en travers sur toute

la surface de brun noirâtre, front du mâle ponctué de jaune doré. P. PUNCTIFRONS

b^c Dessous blanchâtre, à gorge et poitrine rayés en travers de noir, l'abdomen longitudinalement de noir, front du mâle parsemé de gros points blancs à la base et jaunes au sommet. P. SCLATERI

b^d Poitrine noire maculée de blanc, abdomen rayé en travers de noir et de blanc, front strié longuement de rouge cinabarin. P. STEINDACHNERI

b^e Poitrine blanche rayée en travers de noir, abdomen blanchâtre maculé de noir, front du mâle strié de rouge. P. JELSKII

GENRE CAMPEPHILUS

a Poitrine et abdomen rayés en travers de noir sur un fond blanc roussâtre.

a' Croupion tout noir. C. MELANOLEUCUS

a'' Croupion rayé de fauve. C. SCLATERI

b Dessous du corps non rayé.

b' Poitrine et abdomen d'un roux cannelle, enduit de rouge sur le devant, barbe externe des rémiges primaires cannelle en partie. C. TRACHELOPYRUS

b'' Poitrine, abdomen et croupion rouge sang. C. HÆMATOGASTER

GENRE PICUS

a Dessous non maculé, gorge et cou antérieur jaune, front longuement blanc. P. CACTORUM

b Dessous maculé de brun, front concolore au sommet de la tête. P. LIGNARIUS

GENRE CHLORONERPES

a Tout le corps presque unicolore sans taches ni raies. CH. FUMIGATUS

b Dessus rouge, dessous blanc ondulé de gris, côtés de la tête blanchâtres avec tache brune auriculaire. CH. CALLONOTUS PERUVIANUS

c Dessus du corps olive.

c' Dessous rayé en travers de brun.

c^a Des raies sur tout le dessous jusqu'à l'extrémité des sous-caudales, du rouge sur les tectrices alaires. CH. HILARIS.

*c*ᵇ Le ventre et les sous-caudales non rayés, milieu du front et du vertex ordinairement sans rouge. — CH. CANIPILEUS

c'' Dessous à grosses macules claires sur la poitrine et des raies transversales foncées sur le ventre et les sous-caudales.

*c*ᵃ Gorge et côtés de la tête jaunes. — CH. FLAVIGULARIS

*c*ᵇ Gorge blanchâtre, côtés de la tête olive jaunâtre, avec une raie jaune orangée au-dessus du rouge malaire. — CH. LEUCOLÆMUS

GENRE CHRYSOPTILUS

a Gorge et devant du cou noirs. — CH. ATRICOLLIS

b Gorge noire tachetée de blanc, poitrine ponctuée de noir. — CH. PUNCTIPECTUS

GENRE COLAPTES

a Région jugulaire variée de lignes transversales noires. — C. STOLZMANNI

b Région jugulaire variée de taches cordiformes noires. — C. PUNA

GENRE CELEUS

a Plumage du corps rayé de noir sur un fond roux brunâtre.

a' Le devant du cou et la poitrine noirs. — C. TINNUNCULUS

a'' La gorge et le devant du cou de la couleur uniforme tachetée de noirâtre. — C. GRAMMICUS

b Plumage du corps uniforme sans taches.

b' Roux foncé, à croupion et les flancs de l'abdomen jaune sale. — C. JUMANA

b'' Roux rougeâtre très foncé, croupion jaune citron roussâtre. — C. CITREOPYGIUS

b''' Plumage du corps jaune peu intense. — C. CITRINUS

Famille ALCEDINIDÆ

Bec long, comprimé, assez élevé, à arête dorsale aplatie en dessus et pénétrant profondément entre les plumes frontales; queue longue, large, à rectrices externes considérablement plus courtes, les autres égales. — Ceryle

Genre CERYLE

a Couleur du dessus non métallique.
Dos cendré bleuâtre tacheté de blanc. — C. torquata

b Couleur du dessus vert foncé métallique.

b' Dessous roux en entier, une bande pectorale verte chez le ♂. — C. inda

b'' Dessous roux, à milieu de l'abdomen blanc, bande pectorale verte chez la ♀. — C. superciliosa

b''' Dessous blanc, à bande pectorale rousse chez le ♂, aile non maculée de blanc ou à peine. — C. amazona

b'''' Dessous blanc, à bande pectorale rousse chez le ♂, verte chez la ♀, aile plus ou moins maculée de blanc. — C. Cabanisi

b''''' Dessous blanc, bande pectorale large rousse chez le ♂, deux vertes chez la ♀, tectrices alaires non maculées de blanc. — C. americana

Famille MOMOTIDÆ

A Bec ordinaire non dilaté.

A' La partie antéapicale de la baguette des deux rectrices médianes dénudée.

*a*ᵃ Couronne céphalique bleue. — Momotus

*a*ᵇ Point de couronne céphalique bleue. — Urospatha

A'' Rectrices médianes barbées en entier. — Baryphthengus

B Bec dilaté et aplati. — Prionirhynchus

Genre MOMOTUS

a Toute la partie postoculaire de la couronne céphalique saphirée, du roux sur la nuque. — M. brasiliensis

b Partie postérieure de la couronne céphalique concolore à la frontale avec une bordure saphirée, point de roux à la nuque.
- *b'* Une bordure bleue sous le noir des joues. M. MICROSTEPHANUS
- *b''* Point de bordure bleue sous le noir des joues. M. ÆQUATORIALIS

FAMILLE GALBULIDÆ

A Bec fin, presque droit, graduellement rétréci vers l'extrémité.
- *A'* Queue médiocre graduée. GALBULA
- *A''* Queue longue fort étagée, à rectrices médianes très longues et atténuées. UROGALBA
- *A'''* Queue coupée carrément. BRACHYGALBA

B Bec élargi, à extrémité fort atténuée, l'arête dorsale arquée. JACAMEROPS

C Bec fort comprimé, élevé, à arête dorsale tranchante. GALBACIRHYNCHUS

GENRE GALBULA

a Bec tout noir.
- *a'* Vert doré en dessus, à sommet de la tête vert bleuâtre, gorge et poitrine vertes. G. TOMBACEA
- *a''* Rouge en dessus et sur la poitrine, sommet de la tête vert bronzé. G. ERYTHROTHORAX

b Bec jaune, à moitié terminale de la mâchoire noire.
- *b'* Sommet de la tête pourpré très obscur passant au violâtre dans certaines directions de la lumière. G. ALBIROSTRIS
- *b''* Sommet de la tête noir rougeâtre tirant au bleu sous certain jour. G. CHALCOCEPHALA

GENRE BRACHYGALBA

a Gorge concolore à la poitrine, à peine striée de blanchâtre. B. INORNATA

b Gorge blanche. B. ALBIGULARIS

Famille BUCCONIDÆ

A Queue dépassant beaucoup le bout des ailes.
- *A'* Bec droit, voûté, à dos de la mâchoire courbé fortement dans sa partie terminale, dessous de la mandibule arqué vers le haut. — Bucco
- *A''* Bec comprimé non voûté, droit, courbé à l'extrémité; l'extrémité de la mandibule courbée en bas.
  - *A*[a] Plumes de la base de la mandibule allongées, lancéiformes, formant de chaque côté une moustache saillante. — Malacoptila
  - *A*[b] Plumes de la gorge longues, à barbes désunies recourbées en avant; aile armée d'une courte épine cornée. — Monasa
  - *A*[c] Bec faible, à extrémité de la mandibule à peine courbée, plumes de la base de la mandibule criniformes recourbées sur les côtés. — Nonnula

B Ailes longues atteignant l'extrémité de la queue. — Chelidoptera

Genre BUCCO

a Parties supérieures du corps noires.
- *a'* Tête immaculée au sommet.
  - *a*[a] Devant du front finement blanc, sous-alaires noires. — B. macrorhynchus
  - *a*[b] Front longuement blanc, sous-alaires noires traversées d'une raie oblique blanche. — B. hyperrhynchus
- *a''* Tête maculée au sommet de blanc.
  - *a*[a] Longueur de l'aile, 8,5 centimètres. — B. picatus
  - *a*[b] Longueur de l'aile, 7 centimètres. — B. collaris

b Parties supérieures du corps brunes, à sommet de la tête plus ou moins roussâtre.
- *b'* Bec noir.
  - *b*[a] Demi-collier nucal fauve roussâtre, une large bande noire au-dessous de la gorge. — B. macrodactylus
  - *b*[b] Demi-collier nucal blanc prolongé jusqu'à la naissance du bec, grosses taches noires sur la poitrine et l'abdomen. — B. pulmentum
  - *b*[c] Dessous blanc crème varié de stries noires en forme de pinceau. — B. lanceolatus
- *b''* Bec jaune.
  Collier nucal blanc, rectrices rayées en travers de fauve. — B. chacuru

Genre **MALACOPTILA**

a Plumage du corps non strié ni tacheté.
Dessus du corps roux brunâtre, tête gris plombé strié très finement de blanc. M. RUFA
b Plumage du corps plus ou moins strié.
b' Brun strié de fauve. M. FUSCA
b'' La poitrine et le haut de l'abdomen noirs striés de blanc. M. FULVOGULARIS

Genre **MONASA**

a Bec jaune. M. FLAVIROSTRIS
b Bec rouge.
b' Front blanc, menton blanc très finement. M. PERUANA
b'' Front noir. M. NIGRIFRONS

Genre **NONNULA**

a Sommet de la tête roux marron. N. RUFICAPILLA
b Sommet de la tête concolore au dos, dessous roux, à milieu du ventre ocreux. N. BRUNNEA

Famille **CAPITONIDÆ**

Genre **CAPITO**

Bec comprimé, dilaté à la base, à dos élevé entre les narines, pointu à l'extrémité, mâchoire dépassant un peu l'extrémité de la mandibule, première rémige très courte.
a Dessus noir tacheté de jaune, dessous jaune.
a' Gorge orangée, sommet de la tête olive jaunâtre. C. AURATUS
a'' Gorge rouge orangée, front longuement lavé de rouge. C. AMAZONICUS
b Dessus brun olivâtre, sommet de la tête rouge

vermillon, gorge largement jusqu'au milieu de la poitrine orangée. C. AUROVIRENS
c Vert ou vert olive en dessus.
c' Demi-collier nucal jaune verdâtre. C. AURANTHICOLLIS
c'' Demi-collier nucal bleu.
cᵃ Bas des joues largement bleu. C. VERSICOLOR
cᵇ Bas des joues jaune.
cα Haut de la gorge rouge, bas de cette partie bleu. C. GLAUCOGULARIS
cβ Gorge rouge sans rien de bleu. C. STEERI

FAMILLE RHAMPHASTIDÆ

A Bec énorme, à narines percées dans la face postérieure de l'élévation basale, queue à rectrices égales. RHAMPHASTOS
B Narines basales percées au sommet du bec, queue étagée, à rectrices peu larges.
B' Bec long et gros, à sommet aplati à la base, narines percées sur la face dorsale du bec, queue assez longue. PTEROGLOSSUS
B'' Bec et queue beaucoup moins longs, une grosse tache jaune sur les oreilles. SELENIDERA
B''' Bec médiocre plus ou moins sillonné sur les côtés, à narines basales situées plus bas que le sommet du bec, et ordinairement dans une fosse, couleur générale du plumage vert pre. AULACORHAMPHUS
B'''' Bec médiocre et large comparativement, non sillonné, à base dorsale un peu élevée entre les narines. ANDIGENA

GENRE RHAMPHASTOS

a Sus-caudales jaunes.
a' Poitrine blanche, bec noir, à côtés convexes. RH. CUVIERI
a'' Poitrine blanche, bec noir, à côtés plats. RH. CULMINATUS
a''' Poitrine blanc jaunâtre bordée de rouge, bec noir varié de jaune et de rouge. RH. INCA
b Sus-caudales blanches, poitrine jaune soufre bordée en dessous de rouge, bec à moitié oblique jaune. RH. TOCARD
c Sus-caudales rouges, poitrine orangée bordée de soufré, joues blanches, bec noir. RH. VITELLINUS

Genre PTEROGLOSSUS

a Plumes du sommet de la tête frisées, transformées à l'extrémité en une lamelle cornée. — Pt. Beauharnaisii
b Plumes du sommet de la tête normale.
  b' Une large bande jugulaire rouge.
    b^a Bec blanc d'ivoire, à bord noir dans la mâchoire. — Pt. flavirostris
    b^b Bec jaunâtre avec une raie gris olivâtre sur le bas des côtés de la mâchoire. — Pt. Azaræ
  b'' Une large bande rouge en travers de l'abdomen. — Pt. castanotis
  b''' Une large bande pectorale noire, l'abdominale rouge. — Pt. pluricinctus
  b'''' Point de rouge en dessous. — Pt. Humboldti

Genre SELENIDERA

a Bec noir, à base rougeâtre, flancs de l'abdomen safranés variés de rougeâtre. — S. Reinwardti
b Bec noir, à base cornée, flancs de l'abdomen jaune orangé. — S. Langsdorffi
c Bec à mandibule olive à la base même, puis d'un blanc d'ivoire, à tache antéapicale noirâtre, l'extrémité blanc jaunâtre. — S. Gouldi

Genre ANDIGENA

a Bec jaune à la base, avec une bande transversale noire, tout le dos et l'extrémité de la mâchoire rouge, l'extrémité de la mandibule noire. — A. hypoglaucus
b Bec rouge à la base, noir au dos et à l'extrémité, avec une lamelle latérale blanc d'ivoire. — A. lamellirostris

Genre AULACORHAMPHUS

a Du rouge au croupion.
  a' Base du bec à bordure blanche. — A. hæmatopygius
  a'' Bec corné bleuâtre à la base sans bordure basale. — A. cæruleicinctus
b Croupion sans rouge.
  b' Gorge noire, sous-caudales marron. — A. atrigularis
  b'' Gorge blanche, sous-caudales vertes. — A. derbianus

Famille TROGONIDÆ

A Front lisse, tectrices sus-caudales courtes. Trogon
B Front à plumes tournées vers le devant, formant souvent une crête plus ou moins développée, sus-caudales fort prolongées. Pharomacrus

Genre TROGON

a Dessous du corps rouge.
  a' Queue noire, à rectrices médianes vertes en dessus, externes mouchetées très faiblement de blanchâtre. T. melanurus
  a'' Queue rayée en travers de blanc sur les rectrices latérales.
    a^a Raies blanches de la queue et des tectrices alaires aussi larges que les noires. T. collaris
    a^b Raies blanches fines sur la queue et les tectrices alaires.
      $a\alpha$ Le vert de la tête, de la poitrine et du croupion bleuâtre. T. heliothrix
      $a\beta$ Le vert de la tête et de la poitrine fort doré. T. propinquus
      $a\gamma$ Le vert du dos doré, le sommet de la tête et la poitrine d'un saphiré passant au violet. T. variegatus
b Dessous du corps jaune.
  b' Dos vert, tête et poitrine saphirés.
    b^a Tectrices alaires d'un noir uniforme. T. viridis
    b^b Tectrices alaires vermiculées finement de blanc. T. ramonianus
  b'' Dessus du corps vert.
    b^a Sommet de la tête concolore au dos, poitrine verte. T. atricollis
    b^b Tête toute noire, poitrine saphirée. T. caligatus

Genre PHAROMACRUS

a Une longe crête élevée au front, deux rectrices de chaque côté blanches. Ph. antisiensis
b Point de crête proéminente, rectrices latérales noires.
  b' Les grandes sus-caudales dépassant l'extrémité des rectrices. Ph. auriceps
  b'' Les grandes sus-caudales n'atteignant pas l'extrémité des rectrices. Ph. pavoninus

Famille CUCULIDÆ

A Bec très haut, fort comprimé, à arête dorsale fort élevée, les narines percées dans la moitié inférieure des faces latérales. — Crotophaga

B Bec fort, ailes courtes arrondies au bout, à septième, huitième et neuvième rémiges égales et les plus longues, tarse élevé. — Neomorphus

C Bec court ou médiocre légèrement arqué, à dos arrondi, tarse plus long que le doigt le plus long.

C' Bec court comprimé, quatrième rémige la plus longue, dessus du corps tacheté. — Diplopterus

C'' Bec médiocre, cinquième ou sixième rémige la plus longue, queue longue fort étagée, à rectrices larges. — Piaya

C''' Bec médiocre, troisième rémige la plus longue, queue longue, à rectrices peu larges. — Coccyzus

Genre CROTOPHAGA

a Bec plus court que la tête.

a' Bec à côtés non sillonnés. — C. ani

a'' Bec à côtés sillonnés. — C. sulcirostris

b Bec plus long que la tête. — C. major

Genre PIAYA

a Sommet de la tête cendré bleuâtre. — P. melanogastra

b Sommet de la tête concolore au dos.

b' Abdomen cendré clair, bas-ventre noirâtre, taille forte. — P. cayana nigricrissa

b'' Abdomen gris roussâtre, taille petite. — P. minuta

Genre COCCYZUS

a Bande sous-oculaire noire. — C. melanocoryphus

b Bande sous-oculaire nulle. — C. erythrophthalmus

Famille PSITTACIDÆ

A Queue étagée, à rectrices atténuées aiguës à l'extrémité.
- *A'* Tour de l'œil et joues dénudés, ailes moins longues que la queue. — Ara
- *A''* Lores emplumés, tour de l'œil dénudé, ailes aussi longues ou moins longues que la queue. — Conurus
- *A'''* Toute la tête emplumée, deuxième rémige la plus longue, troisième à peine plus courte.
  - *AA* Queue plus courte que l'aile, bec comprimé. — Brotogerys
  - *AB* Queue un peu plus courte que l'aile, bec voûté, à dos arrondi. — Bolborhynchus
  - *AC* Queue faiblement arrondie, courte, mesurant à peine la moitié de la longueur de l'aile, à rectrices aiguës au bout. — Psittacula

B Queue courte, large, à rectrices plus ou moins arrondies à l'extrémité.
- *B'* Bec gros, à dos un peu aplati à la base même et enfoncé en une gouttière très courte, les rectrices subaiguës au bout. — Pachynus
- *B''* Bec aussi élevé à la base que long, rectrices subaiguës à l'extrémité, les trois premières rémiges les plus longues. — Urochroma
- *B'''* Bec à dos aplati traversé par une longue gouttière.
  - *BA* Deuxième et troisième, ou deuxième, troisième et quatrième rémiges les plus longues, sous-caudales rouges. — Pionus
  - *BB* Dans l'aile deuxième et quatrième rémiges les plus longues, sous-caudales vertes. — Chrysotis
  - *BC* Queue un peu plus longue que la moitié de l'aile, sommet de la tête le plus souvent noir, sous-caudales jaunes ou vertes. — Caïca

Genre ARA

- *a* Couleur principale rouge, grandes tectrices alaires jaunes. — A. macao
- *b* Dessus bleu, dessous jaune. — A. ararauna
- *c* Couleur principale verte.
  - *c'* Front rouge.
    - *c*[a] Tout le dessous vert uniforme. — A. militaris

c^b Sommet de la tête vert bleuâtre, à front rouge brunâtre foncé. A. SEVERA
c'' Tout le sommet de la tête céladon grisâtre. A. COULONI

GENRE CONURUS

a Couleur principale verte.
a' Toute la tête verte, sous-alaires rouges. C. GUIANENSIS
a'' Toute la tête brun grisâtre enduite de bleu. C. WEDDELLI
a''' Du rouge sur la tête.
a^a Front rouge.
a_α Pli de l'aile rouge, grandes sous-alaires gris enduit de jaunâtre. C. FRONTATUS
a_β Pli de l'aile vert, lores et tour de l'œil rouge. C. MITRATUS
a^b Front et côtés de la tête rouges. C. ERYTHROGENYS
b Queue d'un rouge obscur.
b' Tectrices du bord de l'aile d'un rouge vermillon.
b^a Queue d'un rouge brun foncé en dessus. C. SOUANCEI
b^b Queue verte en dessus. C. RUPICOLA
b'' Tectrices du bord de l'aile d'un rouge vermillon, à extrémités jaunes. C. MELANURUS
b''' Tectrices du bord de l'aile vertes ou bleues.
b^a Tache auriculaire jaune isabelle, devant du front rosé. C. ROSEIFRONS
b^b Joues rouge brunâtre. C. LUCIANI

GENRE BROTOGERYS

a Grandes tectrices alaires vertes.
a' Côtés de la tête gris blanchâtres, sous-alaires miniacées. B. PYRRHOPTERA
a'' Côtés de la tête verts, front jaunâtre, tache mentonnière orangée roussâtre. B. JUGULARIS
a''' Le devant de la tête et une strie sous-oculaire jaunes. B. TUI
b Quelques-unes des grandes tectrices alaires blanches ou jaunes.
b' Grandes tectrices secondaires jaunes, rémiges vertes. B. XANTHOPTERA
b'' Grandes tectrices secondaires jaunes, rémiges médianes blanches. B. VIRESCENS

GENRE BOLBORHYNCHUS

a Devant du visage et dessous du corps plus ou moins jaune. B. AURIFRONS

b Tout le plumage vert, queue peu étagée, à rectrices peu atténuées à l'extrémité. B. ANDICOLA

GENRE **PSITTACULA**

a Croupion vert, bec épais. P. CRASSIROSTRIS
b Croupion bleu.
b' Point de bleu sur la tête.
b[a] Dans les rémiges secondaires le bleu de ciel prolongé jusque près de l'extrémité des pennes. P. PASSERINA
b[b] Dans les rémiges secondaires le bleu saphir s'arrêtant à une grande distance du bout des pennes. P. SCLATERI
b'' Bande bleue postoculaire. P. CŒLESTIS

GENRE **PIONUS**

a Tête bleue. P. MENSTRUUS
b Tête d'un rouge sale, squamulé de foncé sur les côtés. P. TUMULTUOSUS

GENRE **CHRYSOTIS**

a Sommet et côtés de la tête verdâtres.
a' Point de rouge sur la barbe interne des rectrices, le vert comme poudré de farine, à bordures des plumes violâtres. CH. FARINOSA
a'' Du rouge sur les rectrices, bordures noirâtres sur les plumes du cou. CH. MERCENARIA
b Croupion rouge, point de rouge sur les rémiges. CH. FESTIVA
c Front bleu, côtés de la tête jaunes, du rouge aux rectrices. CH. AMAZONICA
d Tête verte avec une grosse tache jaune au milieu du sommet. CH. OCHROCEPHALA

GENRE **CAICA**

a Sommet d'un rouge brique, côtés de la tête, cou antérieur, flancs et sous-caudales jaunes. C. XANTHOMEROS
b Du noir sur la tête.
b' Toute la tête noire. C. HISTRIO
b'' Tête noire avec une grosse tache génale jaune. C. BARRABANDI
b''' Sommet de la tête noirâtre, une ligne verte au-dessous des yeux. C. MELANOCEPHALA

Famille COLUMBIDÆ

A Première rémige non atténuée.
- *A'* Tarse court emplumé dans la moitié supérieure, deuxième et troisième rémiges égales et les plus longues, queue ample arrondie. — Columba
- *A''* Taille petite, queue courte arrondie.
  - *Aa* Orbites dénuées.
    - *Aα* Deuxième rémige la plus longue, queue non terminée de blanc. — Metriopelia
    - *Aβ* Deuxième et troisième rémiges les plus longues et égales, rectrice externe terminée longuement de blanc. — Gymnopelia
  - *Ab* Orbites non dénuées, des bandes et des taches métalliques sur l'aile. — Chamæpelia
- *A'''* Ailes assez longues, queue plus ou moins allongée.
  - *Aa* Orbites dénuées, queue arrondie. — Melopelia
  - *Ab* Queue cunéiforme, à rectrices médiocrement étagées, deuxième rémige la plus longue. — Zenaïda
- *A''''* Tarse élevé, robuste, dénué; ailes courtes, à deuxième, troisième et quatrième rémiges égales et les plus longues, queue courte. — Geotrygon

B Première rémige atténuée dans sa partie terminale.
- *B'* Troisième et quatrième rémiges les plus longues, point de taches métalliques sur l'aile. — Leptoptila
- *B''* Troisième rémige la plus longue, des taches métalliques sur l'aile. — Peristera

Genre COLUMBA

- *a* Tout le cou et le dessous du corps squamulé de foncé. — C. speciosa

  Cou non squamulé.
  - *b'* Demi-collier nucal blanc, cou postérieur métallique brillant. — C. albilinea
  - *b''* Des taches fauves subarrondies au cou postérieur. — C. plumbea
  - *b'''* Point de taches ni bandes au cou postérieur.
    - *bᵃ* Tectrices alaires bordées à l'extérieur de blanc. — C. albipennis
    - *bᵇ* Dessus fuligineux foncé; tête, cou et dessous vineux. — C. vinacea

b[c] Tout le plumage vineux, bec court. C. SUBVINACEA
b[d] Dos roux rougeâtre, à éclat violet; le cervix, la nuque et le cou postérieur métallique brillant, gorge et joues cendrées. C. RUFINA

GENRE METRIOPELIA

a Tectrices supérieures de la queue atteignant l'extrémité des rectrices, une tache métallique sur l'aile. M. AYMARA
b Tectrices sus-caudales beaucoup plus courtes que les rectrices, point de tache métallique sur l'aile. M. MELANOPTERA

GENRE CHAMÆPELIA

a Sous-alaires rousses.
a' Poitrine squamulée. CH. PASSERINA
a'' Poitrine non squamulée ni tachetée. CH. GRISEOLA
b Sous-alaires internes noires, externes grises.
b' Dessus du corps gris.
b[a] Bande antérieure de l'aile rouge obscur, les autres taches alaires noir bleuâtre. CH. CRUZIANA
b[b] Toutes les taches alaires noir bleuâtre. CH. BUCKLEYI
b'' Plumage général cannelle rougeâtre. CH. TALPACOTI

GENRE PERISTERA

a Rectrices externes blanches à l'extrémité.
a' Les deux bandes alaires postérieures marron violâtre. P. GEOFFROYI
a'' Toutes les trois bandes alaires saphirées. P. MONDETOURA
b Rectrices noires jusqu'à l'extrémité. P. CINEREA

GENRE LEPTOPTILA

a Tout le côté de la tête ocreux, une nuance vinacée assez forte sur la poitrine, éclat rouge violâtre au bas du cou postérieur. L. RUFAXILLA
b Éclat vert tirant au bleuâtre au bas du cou postérieur. L. OCHROPTERA
c Point d'ocreux sur les joues, la nuque étant d'une nuance rosée, point de vineux sur la poitrine. L. VERREAUXI

Genre GEOTRYGON

a Tout le dessus roux violet, poitrine vineuse. G. MONTANA
b Dessus brun roussâtre, joues rosées bordées en dessous d'une ligne noire.
b' Sommet de la tête cendré bleuâtre. G. BOURCIERI
b'' Sommet de la tête gris lavé de rosé. G. FRENATA

Famille OPISTHOCOMIDÆ

Bec épais, côtés de la tête dénués, plumes cervicales et nucales longues, linéaires, raides, légèrement courbées en avant formant une huppe élevée; queue longue arrondie. OPISTHOCOMUS

Famille CRACIDÆ

A Bec plus ou moins épais, le plus souvent muni à la base d'un tubercule frontal.
A' Oiseaux à tubercule frontal.
AA Tubercule médiocre couvert d'une cire, plumes du sommet de la tête et de la nuque élevées, à extrémité courbée en avant. CRAX
AB Tubercule corné énorme, tête non huppée. PAUXIS
A'' Point de tubercule frontal.
AA Bec fort élevé, comprimé au sommet, tête non huppée. MITUA
AB Bec non élevé au sommet, une huppe de plumes allongées non recourbées disposées le long de tout le sommet de la tête. URUMUTUM
B Bec médiocre plus allongé, sans tubercule frontal, gorge et devant du cou le plus souvent plus ou moins dénués.
B' Les côtés de la tête, la gorge et le haut du devant du cou dénués et parsemés de plumules criniformes rares; un pli cutané plus ou moins développé le long du milieu du cou.
BA Plumes du milieu du sommet de la tête larges et arrondies. PENELOPE

BB Plumes du sommet de la tête allongées, presque linéaires, aiguës au bout, blanchâtres. PIPILE

B'' Gorge et devant du cou emplumés.

BA Les lores et les joues déplumés, point de fanon jugulaire. CHAMÆPETES

BB Tout le côté de la tête emplumé, excepté une bordure au-dessous de l'œil, sur son devant et en arrière, un fanon cylindrique sur le milieu du cou supérieur. ABURRIA

B''' Côtés de la tête et côtés de la gorge dénués, les plumes du cou supérieur aiguës à l'extrémité. ORTALIDA

GENRE **PENELOPE**

a Rémiges primaires blanches. P. ALBIPENNIS

b Rémiges primaires non blanches.

b' Tête sans stries blanches.

b[a] La peau des côtés de la tête parsemée de petites plumules; point de roux sur l'abdomen. P. JACUCACA

b[b] Côtés de la tête parfaitement dénués; des bordures fines blanches sur les plumes frontales. P. BOLIVIANA

b'' Des bordures blanches sur toutes les plumes de la tête. P. SCLATERI

GENRE **CHAMÆPETES**

a Peau nue des côtés de la tête aussi large et aussi longue que dans les pénélopes vraies, le roux du dessous commençant sur la région jugulaire. CH. TSCHUDII

b Peau nue des côtés de la tête étendue en dessous jusqu'au niveau du milieu de l'œil, puis entourant finement l'œil; le roux du dessous ne commençant qu'au bas de la poitrine. CH. RUFIVENTRIS

Famille THINOCORIDÆ

A Queue cunéiforme, à rectrices terminées de blanc. Thinocorus
B Queue arrondie, à rectrices non terminées de blanc. Attagis

Genre THINOCORUS

a Chez le mâle, cou cendré plombé séparé du blanc de la poitrine par une bande noire, une bordure noire sur les côtés et au-dessous du blanc de la gorge. Th. orbignyanus
b Chez le mâle, devant du cou cendré pâle séparé en dessous du blanc de la poitrine par une bande noire réunie avec la bordure gulaire par une bande noire passant le long du milieu du cou. Th. rumicivorus

Famille TETRAONIDÆ

Bec court, épais, comprimé, à dos fort arqué; doigts longs, à ongles longs aigus et peu courbés; queue courte et arrondie; lores et tour des yeux plus ou moins dénués. Odontophorus

Genre ODONTOPHORUS

a Gorge et côtés de la tête noirs; dessous du corps roux. O. speciosus
b Gorge non noire.
b' Gorge et côtés de la tête roux. O. pachyrhynchus
b'' Gorge et côtés de la tête cendrés. O. stellatus
b''' Une raie noire transoculaire bordée des deux côtés d'une raie roux intense parcourant au-dessus et au-dessous des yeux. O. Balliviani

Famille TINAMIDÆ

A Pouce distinct.
- *A'* Bec presque droit ou à peine courbé, à extrémité de la mâchoire fort courbée en le faisant très obtus; ongles courts et larges.
  - *AA* Queue courte, à rectrices larges, couvertes par les tectrices jusqu'à leur extrémité ou les dépassant un peu. — Tinamus
  - *AB* Queue nulle ou courte, les tectrices dépassant toujours l'extrémité des rectrices lorsqu'elles existent. — Crypturus
- *A''* Bec courbé et atténué graduellement jusqu'à son extrémité qui est subaiguë ou arrondie au bout; queue nulle; ongles assez longs et médiocrement courbés. — Nothoprocta

B Pouce nul. — Tinamotis

Genre TINAMUS

- *a* Sommet de la tête roux, fond du plumage olive. — T. ruficeps
- *b* Sommet de la tête noirâtre, fond du plumage cendré. — T. Kleei
- *c* Sommet de la tête cendré strié de noir, dos brun olive, à région interscapulaire rougeâtre. — T. guttatus
- *d* Sommet de la tête noir, une grosse tache brun roussâtre derrière l'œil. — T. atrocapillus

Genre CRYPTURUS

- *a* Rémiges secondaires immaculées.
  - *a'* Dessus du corps brun rougeâtre; sommet de la tête fuligineux foncé, pâle sur la gorge; dessous roux, plumes des côtés du bas-ventre bordées de fauve. — C. obsoletus
  - *a''* Dessus brun foncé un peu rougeâtre; tête fuligineuse, à gorge blanche; plumes du bas-ventre bordées de blanc. — C. tataupa
  - *a'''* Dessus roux brunâtre; tête plombée, à gorge blanche; dessous gris, à plumes du bas-ventre bordées de blanc. — C. parvirostris
  - *a''''* Dessus brun roussâtre; tête ardoisé foncé lavé de rougeâtre au sommet, gorge blanche;

poitrine cendré grisâtre, abdomen blanchâtre, le tout varié d'une vermiculation brune. C. BALSTONI

b Rémiges secondaires variées d'une série de taches claires.

b' Dessus du corps non rayé en travers.

ba Brun fuligineux en entier, taches aux rémiges secondaires peu prononcées. C. CINEREUS

bb Brun rougeâtre pâle tirant au violet, varié de quelques petites bordures noirâtres au milieu du dos et les scapulaires postérieures. C. RUBRIPES

b'' Dessus du corps plus ou moins rayé en travers.

ba Dos brun ocreux rayé en travers de noir; tectrices alaires plus noires, à raies ocreuses moins nombreuses. C. BARTLETTI

bb Bas du dos et croupion rayés en travers de noir et de roux. C. NOCTIVAGUS

GENRE NOTHOPROCTA

a Région jugulaire et poitrine cendré immaculé. N. BRANICKII

b Rémiges secondaires roux cannelle rayé de noir. N. CURVIROSTRIS

c Taille forte, poitrine maculée.

c' Ocelles jugulaires fauves entourées de noir sur un fond cendré. N. TACZANOWSKII

c'' Taches jugulaires brun noirâtres subcordiformes bordées de fauve pâle et de roussâtre sur un fond gris roussâtre sale. N. GODMANI

FAMILLE PALAMEDEIDÆ

Aile armée de deux fortes épines cornées, front surmonté d'une longue baguette cornée. PALAMEDEA

Famille RALLIDÆ

A Doigt médian avec l'ongle plus court que le tarse. Aramides
B Doigt médian avec l'ongle plus long que le tarse.
B' Arête dorsale de la mâchoire non élargie en plaque cutanée frontale.
BA Bec plus long que la tête. Rallus
BB Bec plus court que la tête. Porzana
B'' Arête dorsale de la mâchoire élargie en une plaque frontale cutanée couvrant le front au moins jusqu'au milieu des yeux.
BA Doigts pourvus sur les côtés d'un rebord étroit et continu.
Ba Plaque frontale atténuée et acuminée en arrière. Porphyriops
Bb Plaque frontale large, arrondie ou coupée carrément en arrière. Gallinula
BB Doigts garnis sur les côtés d'une membrane large partagée en festons. Fulica

Genre ARAMIDES

a Poitrine et abdomen roux. A. cayennensis
b Poitrine et abdomen plombé bleuâtre. A. saracuru

Genre RALLUS

a Dessus du corps varié de grosses flammèches foncées.
a' Dessous du corps plombé.
a[a] Tectrices alaires olives. R. peruvianus
a[b] Tectrices alaires rousses. R. semiplumbeus
a'' Dessous du corps roussâtre.
a[a] Tectrices alaires grises. R. cypereti
a[b] Tectrices alaires rousses. R. virginianus
b Dessus du corps immaculé.
b' Une tache rouge sur les côtés du bec. R. cæsius
b'' Point de rouge à la base du bec. R. nigricans

Genre PORZANA

a Dos et ailes tachetés de blanc.
a' Taches blanches fines longitudinales; le de-

vant du visage, une raie gulaire et une autre céphalique noirs. P. CAROLINA

a'' Taches blanches transversales; point de noir au visage et à la gorge. P. JAMAÏCENSIS

b Dos et ailes non tachetés de blanc.

b' Du roux sur la tête.

b[a] Nuque et cou postérieur largement roux. P. CINEREA

b[b] Le sommet de la tête et tout le dessous du corps roux. P. CAYENNENSIS

b[c] Tête, cou entier et poitrine roux rougeâtre. P. HAUXWELLI

b[d] Une large strie rousse de chaque côté du front. P. FACIALIS

b'' Point de roux sur la tête ni ailleurs, dessous du corps plombé. P. ERYTHROPS

GENRE **FULICA**

a Taille forte, scutelle frontale fort renflée jaune, bec rouge. F. GIGANTEA

b Taille médiocre, scutelle frontale renflée jaune pâle, bec jaune rougeâtre. F. ARDESIACA

FAMILLE **PARRIDÆ**

Pli de l'aile armé d'une épine aiguë cornée, doigts très longs et grêles, à ongles très longs et fins. PARRA

FAMILLE **ŒDICNEMIDÆ**

Pattes élevées, à trois doigts; tête grosse, à œil gros de couleur claire; bec à arête dorsale proéminente arrondie, couvert à la base d'une cire jusqu'aux narines. ŒDICNEMUS

Ba Bec droit ou peu courbé, à extrémité lisse.
Bα Pattes courtes.
*B** Membranes interdigitales rudimentaires. TRINGA
*B*** Membranes interdigitales plus développées. EREUNETES
Bβ Pattes élevées, membranes interdigitales, surtout l'externe, bien développées. MICROPALAMA
Bb Bec au moins deux fois aussi long que la tête, légèrement courbé en haut dans sa partie terminale. LIMOSA
Bc Bec beaucoup plus long que la tête, plus ou moins arqué. NUMENIUS
Bd Bec couvert d'une membrane molle, se plissant dans la partie terminale après la mort.
Bα Bec plus ou moins courbé à l'extrémité. RHYNCHÆA
Bβ Bec droit.
B1 Doigt médian avec l'ongle plus court que le tarse. MACRORHAMPHUS
B2 Doigt médian avec l'ongle plus long que le tarse; une ligne fauve le long du milieu du sommet de la tête. GALLINAGO
BC Bec fort aminci à l'extrémité, fort recourbé en haut, membranes interdigitales fort développées, dépassant beaucoup dans leur milieu la première phalange. RECURVIROSTRA
B'' Membranes interdigitales fort développées, le reste des doigts bordé de lobes cutanés. PHALAROPUS

GENRE **TOTANUS**

a Fond du manteau gris, tacheté de blanchâtre et de noir.
a' Taille forte, pattes olives. T. MELANOLEUCOS
a'' Taille médiocre, pattes jaunâtres. T. FLAVIPES
b Fond du manteau noir olivâtre tacheté de blanc. T. SOLITARIUS

GENRE **TRINGA**

a Dessous roux en noces, blanc en hiver; taille forte. T. CANUTUS

b Abdomen constamment blanc.
b' Sus-caudales médianes largement noires.
ba Rectrices médianes considérablement plus longues que les autres et atténuées à l'extrémité.
bα Taille médiocre. T. MACULATA
bβ Taille petite. T. MINUTILLA
bb Rectrices médianes dépassant peu les autres. T. BAIRDI
b'' Sus-caudales blanches. T. FUSCICOLLIS

GENRE **GALLINAGO**

a Ventre blanc pur; taille petite. G. ANDINA
b Ventre rayé de foncé; taille forte. G. JAMESONI

FAMILLE **PSOPHIIDÆ**

Bec plus court que la tête, à narines ovalaires percées en travers; pattes élevées, à doigts courts; ongles courts et fort courbés; queue courte; tête et cou couverts de plumules veloutées et érigées. PSOPHIA

GENRE **PSOPHIA**

a Plumes longues du dos inférieur gris cendré. P. CREPITANS
b Plumes longues du dos inférieur blanches. P. LEUCOPTERA

FAMILLE **ARAMIDÆ**

Bec deux fois aussi long que la tête, comprimé, droit, à extrémité de la mâchoire légèrement courbée; pattes élevées, à tarse plus long que le doigt médian; narines étroites percées en travers. ARAMUS

FAMILLE **EURYPYGIDÆ**

Bec droit, comprimé, fendu jusqu'au-dessous des yeux, cou long et mince; pattes peu élevées; plumage nuancé par bandes et par lignes, imitant les beaux papillons de nuit. EURYPYGA

Famille ARDEIDÆ

A Bec comprimé, aigu au bout; tibias dénués jusqu'à la moitié de la hauteur; côté postérieur du cou emplumé.
- *A'* Cou long et fin; pattes élevées, à doigt médian moins long que le tarse. — Ardea
- *A''* Cou gros; pattes médiocrement élevées, à doigt médian avec l'ongle plus long que le tarse. — Butorides

B Cou gros, doigt médian moins long que le tarse, à doigt médian avec l'ongle plus long que le tarse. — Nycticorax

C Partie dénuée des tibias très courte; cou couvert de plumes longues, couvrant le côté postérieur qui n'est que parsemé de duvet.
- *C'* Tarse plus long que le doigt médian avec l'ongle; doigt interne plus long que l'externe; ongles fort courbés. — Tigrisoma
- *C''* Tarse moins long que le doigt médian avec l'ongle; ongles faibles et peu courbés. — Ardetta

Genre ARDEA

a Plumage blanc.
- *a'* Point de huppe, taille forte. — A. egretta
- *a''* Huppe cervicale abondante, taille petite. — A. candidissima

b Plumage général ardoisé bleuâtre, à tête plus ou moins vineuse; jeune oiseau blanc. — A. cærulea

c Ardoisé bleuâtre en dessus, à abdomen et poitrine blancs. — A. leucogastra

d Cendré en dessus, à sommet de la tête noir. — A. Cocoi

e Bec très long, huppe longue et abondante cendré bleuâtre, plumes collaires fort atténuées et frisées. — A. agami

Genre TIGRISOMA

a Tête et cou roux vif. — T. brasiliense

b Tête et cou non roux.
- *b'* Gorge toute nue. — T. Cabanisi
- *b''* Gorge largement emplumée au milieu. — T. Salmoni

Genre NYCTICORAX

a Tout le plumage blanchâtre, à sommet de la tête noir. — N. pileatus

b Dos et ailes cendré bleuâtre, à grosses stries noires. N. VIOLACEUS
c Sommet de la tête et dos noir verdâtre métallique.
c' Plumes longues de la huppe blanches, à extrémité noire. N. AMERICANUS
c'' Plumes longues de la huppe blanches jusqu'au bout. N. OBSCURUS

FAMILLE CICONIIDÆ

Bec énorme, élevé, tête et cou nus. MYCTERIA

FAMILLE CANCROMIDÆ

Bec très gros, large, terminé par un onglet, pattes médiocres, à pouce égal à la moitié des doigts antérieurs. CANCROMA

FAMILLE PLATALEIDÆ

Bec long, très plat et fort élargi près de l'extrémité. PLATALEA

FAMILLE TANTALIDÆ

A Bec long, gros à la base, légèrement courbé à l'extrémité, glabre; pattes très élevées. TANTALUS
B Bec long, plus ou moins courbé avec des sillons latéraux dans toute sa longueur.
B' Tibias dénués jusque près de la moitié de leur longueur.
BA Tarse couvert de scutelles dans sa partie médiane.
B[a] Couleur des ailes et de la queue métallique. FALCINELLUS
B[b] Unicolores sans rien de métallique. EUDOCIMUS

BB Tarse réticulé dans toute sa longueur, moins long que le doigt médian avec l'ongle. HARPIPRION
B'' Tibias très peu dénués au-dessus du talon, pattes et doigts courts, queue longue cunéiforme. THERISTICUS

GENRE **HARPIPRION**

a Huppé. H. CÆRULESCENS
b Non huppé. H. CAYENNENSIS

FAMILLE **PHŒNICOPTERIDÆ**

Pattes très élevées, à doigts antérieurs palmés en entier, bords du bec garnis de lamelles cornées. PHŒNICOPTERUS
a Lamelles de la mâchoire verticales. PH. IGNIPALLIATUS
b Lamelles de la mâchoire horizontales, mâchoire fort atténuée. PH. ANDINUS

FAMILLE **FREGATIDÆ**

Membranes interdigitales courtes, ailes très longues, queue longue profondément fourchue. FREGATA

FAMILLE **PELECANIDÆ**

Bec très long et plat, terminé d'un onglet fort, sac gulaire très dilaté, non plumé. PELECANUS

FAMILLE **PHALACROCORACIDÆ**

Bec droit, comprimé, terminé par un crochet fort courbé, rectrices longues plates. PHALACROCORAX
a Queue à douze rectrices.
a' Noir en entier avec une bordure blanche autour de la partie dénuée de la gorge et des joues. PH. BRASILIENSIS

a'' Gorge, milieu de la poitrine et abdomen blancs. — PH. BOUGAINVILLEI
b Queue à quatorze rectrices; gris, grosse tache blanche de chaque côté du cou. — PH. GAIMARDI

FAMILLE SULIDÆ

Bec subconique, comprimé sur les côtés, à dos de la mâchoire arqué à l'extrémité, terminé en pointe. — SULA

FAMILLE PLOTIDÆ

Bec droit comprimé, aigu à l'extrémité; queue longue et plate, à surface des rectrices ondulée. — PLOTUS

FAMILLE PHAETHONIDÆ

Bec comprimé, aigu au bout, deux rectrices médianes fort prolongées et très étroites. — PHAËTHON

FAMILLE LARIDÆ

A Bec fort comprimé en lame tranchante, à mandibule terminée en coin tranchant, dépassant beaucoup la mâchoire. — RHYNCHOPS
B Partie postnasale du bec plus longue que la basale, à extrémité terminée en pointe; queue plus ou moins fourchue.
BA Membranes interdigitales échancrées au milieu. — STERNA
BB Membranes interdigitales non échancrées. — NÆNIA
C Partie postnasale du bec plus courte que la basale, à dos arqué, l'extrémité plus ou moins courbée.
CA Queue coupée carrément. — LARUS
CB Queue fourchue. — XEMA
D Partie postnasale du bec fort raccourcie, à dos fort arqué, une cire basale jusqu'à l'extrémité des narines; queue à deux rectrices médianes plus longues que les autres. — STERCORARIUS

Genre STERNA

a Bec fin.
- *a'* Rectrices externes fort prolongées et atténuées à l'extrémité.
  - *a*ᵃ D'un cendré perlé en dessous.
    - *aα* Sommet de la tête noir. — S. MACRURA
    - *aβ* Sommet de la tête noir, à front et sourcils blancs. — S. EXILIS
  - *a*ᵇ D'un blanc pur en dessous. — S. HIRUNDINACEA
- *a''* Rectrices externes dépassant peu les subexternes.
  - *a*ᵃ Sommet de la tête blanc sans huppe noire, ligne transoculaire noire. — S. TRUDEAUI
  - *a*ᵇ Bec noir, front et sourcils blancs. — S. SUPERCILIARIS

b Bec élevé, plus ou moins épais.
- *b'* Cendré perlé clair en dessus.
  - *b*ᵃ Bec jaune. — S. MAXIMA
  - *b*ᵇ Bec rouge. — S. ELEGANS
- *b''* Dos et bras fuligineux. — S. MAGNIROSTRIS

Genre LARUS

a Tout le plumage fuligineux presque uniforme. — L. MODESTUS
b Tête blanche en été, dos et ailes noirâtres. — L. DOMINICANUS
c Un capuchon foncé sur la tête en été.
- *c'* Capuchon fuligineux, dos et ailes noirâtres, une bande noire antéapicale en travers du bec. — L. BELCHERI
- *c''* Capuchon noir. — L. SERRANUS
- *c'''* Capuchon brun, rémiges primaires blanches jusqu'au bout. — L. GLAUCODES
- *c''''* Capuchon plombé fuligineux plus foncé que le dos. — L. ATRICILLA
- *c'''''* Partie postérieure de la tête fuligineuse. — L. FRANKLINI
- *c''''''* Capuchon cendré perlé plus clair que le dos. — L. CIRRHOCEPHALUS

Genre XEMA

a Capuchon céphalique plombé bordé en dessous de noir. — X. SABINII
b Capuchon céphalique plombé, à bordure frontale blanche. — X. FURCATUM

Genre STERCORARIUS

a Miroir alaire blanc. — S. CHILENSIS
b Point de miroir alaire. — S. POMATORHINUS

Famille PROCELLARIIDÆ

A Narines séparées entre elles, pouce nul. — Diomedea
B Les deux narines dans un tube commun.
BA Pouce plus ou moins distinct.
B' Orifices nasaux situés au fond du tube.
*B*ᵃ Bec large déprimé dans la partie basale. — Daptrion
*B*ᵇ Bec médiocre, plus long et plus faible. — Thalassœca
*B*ᶜ Bec court comprimé, ongles petits comprimés.
Bα Queue faiblement échancrée. — Oceanites
Bβ Queue profondément fourchue. — Cymochorea
B'' Orifices nasaux ouverts à l'extrémité du tube, séparés entre eux. — Nectris
BB Pouce nul, narines basales. — Halodroma

Genre DIOMEDEA

a Queue noire, à base des rectrices blanche. — D. irrorata
b Queue blanche, à rectrices terminées de brun foncé sur leur barbe externe et sur les deux barbes dans les médianes. — D. exulans

Famille ANATIDÆ

A Tarse plus long que le doigt médian avec l'ongle.
A' Dentelure de la mâchoire non visible à l'extérieur.
AA Bec élevé à la base, deux fois moins long que la tête. — Bernicla
AB Bec moins de deux fois plus court que la tête. — Chenalopex
B Tarse moins long que le doigt médian avec l'ongle.
B' Les lores et le tour des yeux non emplumés, couverts de caroncules charnues. — Cairina
B'' Toute la tête emplumée.
BA Pli de l'aile armé d'une épine cornée. — Merganetta
BB Aile sans armure.
Ba Membrane du pouce étroite.
Bα Bec graduellement élargi vers l'extrémité. — Spatula

Bβ Bec non élargi vers l'extrémité.
*B*1 Tarse élevé, doigts longs, point de miroir métallique. DENDROCYGNA
*B*2 Doigts courts, miroir alaire métallique.
Bx Queue assez longue, à rectrices médianes plus ou moins atténuées. DAFILA
Bxx Queue à rectrices peu inégales. ANAS, QUERQUEDULA
Bb Membrane du pouce élargie.
Bα Queue courte à rectrices normales. FULIGULA
Bβ Queue à rectrices atténuées et raides. ERISMATURA

GENRE **DENDROCYGNA**

a Tout l'abdomen noir, poitrine grise ondulée de fauve. D. DISCOLOR
b Milieu de l'abdomen noir, devant de la tête blanchâtre. D. VIDUATA
c Abdomen roux. D. FULVA

GENRE **QUERQUEDULA**

a Tectrices alaires bleues, miroir vert. Q. CYANOPTERA
b Tectrices alaires grises.
b' Sommet de la tête noir, côtés et gorge blancs. Q. PUNA
b'' Toute la tête ondulée finement de noir et de fauve. Q. OXYPTERA

GENRE **DAFILA**

a Côtés de la tête et gorge blancs, queue blanchâtre. D. BAHAMENSIS
b Côtés de la tête fauves striés finement de brun; rectrices brunes bordées de fauve. D. OXYURA

GENRE **MERGANETTA**

a Mâle, à poitrine et abdomen blanchâtres striés de noir. M. LEUCOGENYS
b Mâle, à région jugulaire et flancs noirs, poitrine et abdomen gris vermiculés de foncé. M. TURNERI

Famille HELIORNITHIDÆ

Doigts garnis de membranes festonnées; queue longue et plate, fort arrondie à l'extrémité. — Heliornis

Famille PODICEPITIDÆ

A Ailes normales.
- *A'* Bec plus ou moins faible.
  - *A.A* Tête huppée.
    - *Aa* Taille forte. — Æchmophorus
    - *Ab* Taille petite. — Podiceps
  - *AB* Tête non huppée, taille petite. — Tachybaptus
- *A''* Bec élevé, à dos fort arqué. — Podilymbus

B Ailes petites. — Centropelma

Genre PODICEPS

- *a* Dessous du corps roux, tête noire, avec une grosse tache auriculaire blanche variée de noir. — P. Rollandi
- *b* Tout le dessous blanc, dessus de la tête gris, à nuque plus foncée, des plumules straminées sur la région auriculaire. — P. calliparæus

Famille APTENODYTIDÆ

Ailes impropres au vol couvertes de plumules squamiformes; bec élevé comprimé, à dos de la mâchoire fort arqué à l'extrémité. — Spheniscus

Famille RHEIDÆ

Pattes élevées, à trois doigts; ailes impropres au vol. — Rhea

Dans le texte, la Palamédée est omise. Comme l'oiseau est généralement connu, il nous suffit d'indiquer la notice suivante :

1350. — **Palamedea cornuta**

L., *S. N.*, I, p. 232 — Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 200; 1873, p. 304.

Ucayali supérieur. Huallaga (Bartlett).

Dans le deuxième volume, p. 296, 29e et 30e lignes, *au lieu de* 55 millimètres, *lisez* 15 millimètres.

TABLE ALPHABÉTIQUE (*)

DES ESPÈCES ET DES SYNONYMES

A

Aburria *carunculata*	Tomes III	Pages 277
Acanthylis brachycerca	I	229
brachyura	I	229
cinereicauda	I	229
collaris	I	231
rutila	I	229
Accipiter bicolor	I	165
erythrocnemis	I	163
haliaëtus	I	127
pileatus	I	166
sexfasciatus	I	165
Acestrura micrura	I	308
Mulsanti	I	306
Acestura Mulsanti	I	306
Acroleptes saturata	II	443
Actidromas brevirostris	III	371
Actinodromus Bairdi	III	359
Actitis bartramius	III	371
macularia	III	369
macularius	III	369
Actiturus *bartramius*	III	371
nævius	III	371
rufescens	III	371
Adelarus Belcheri	III	448
Adelomyia *chlorospila*	I	360
inornata	I	359
maculata	I	361

(*) *Les noms spécifiques adoptés dans le texte sont imprimés en italiques.*

Adelomyia *melanogenys*	Tomes I	Pages 361
Æchmophorus *major*	III	492
Ægialitis *collaris*	III	344
nivosa	III	346
semipalmata	III	345
semipalmatus	III	345
vocifera	III	342
vociferus	III	342
Wilsonia	III	343
Agamia picta	III	396
Agapornis cœlestis	III	214
cyanopterus	III	212
guianensis	III	212
Agelæus thilius	II	424
Agelaius melanicterus	II	426
thilius	II	424
xanthocarpus	II	424
Aglæactis *Castelnaudi*	I	343
Castelnaui	I	343
caumatonota	I	342
caumatonotus	I	342
cupripennis	I	340
olivaceo-cauda	I	342
parvula	I	340
Aglaia cæruleocephala	II	472
chilensis	II	457
cyanicollis	II	472
cyanocephala	II	490
gyrola	II	463
gyroloïdes	II	463
melanotis	II	459
mexicana	II	464
nigricincta	II	471
nigriventris	II	482
peruviana	II	463
Schranki	II	459
striata	II	488
Vassori	II	454
Wilsoni	II	471
yeni	II	457
Aglaiactis æquatorialis	I	340
cupripennis	I	340
Agrilorhinus olivaceus	I	417
personatus	I	421
Agriornis *albicauda*	II	184
insolens	II	186
maritima	II	183
pollens	II	185

Agriornis *solitaria* ..... Tomes II Pages 183
Agyrtria *Bartletti* ..... I 403
fluviatilis ..... I 404
media ..... I 414
meliphila ..... I 414
phœbe ..... I 414
Ajaja rosea ..... III 412
Alauda bonariensis ..... I 460
cunicularia ..... II 93
erythropterus ..... II 93
fissirostris ..... II 93
rufa ..... I 460
tenuirostris ..... II 96
Alcedo amazona ..... III 102
americana ..... III 104, 105
bicolor ..... III 103
brasiliensis ..... III 105
Cabanisi ..... III 104
cinerea ..... III 100
cyanea ..... III 100
grandis ..... III 122
inda ..... III 103
maculata ..... III 103
rubescens ..... III 102
stellata ..... III 100
superciliosa ..... III 106
surinamensis ..... III 103
torquata ..... III 100
vestita ..... III 102
viridis ..... III 105
viridirufa ..... III 103
Amazilia amazicula ..... I 407
latirostris ..... I 406
Lessoni ..... I 406
leucophæa ..... I 407
pristina ..... I 406
Amazona icterocephala ..... III 225
Amazonis bicolor ..... III 103
Amblycercus Prevosti ..... II 415
Amblyrhamphus nigerrimus ..... II 415
Ampelio *arcuatus* ..... II 379
cinctus ..... II 380
Ampelion rufaxilla ..... II 383
Ampelis arcuatus ..... II 379
carnifex ..... II 374
cayana ..... II 384
cincta ..... II 380
cineracea ..... II 368

Ampelis elegans	Tomes II	Pages 378
maynana	II	385
Merremi	II	374
Riefferi	II	375
rubrocristata	II	381
rufaxilla	II	383
ruficristata	II	381
umbellata	II	391
Anabates auritus	II	145
Boissonneaui	II	145
erythrocercus	II	155
lineaticeps	II	147
melanorhynchus	II	148
montanus	II	153
ochralæmus	II	150
pulvericolor	II	126
pyrrhodes	II	151
rufifrons	II	143
ruficaudatus	II	155
ruficaudus	II	155
Sclateri	II	151
squamiger	II	164
striaticollis	II	153
subulatus	II	149
Anabazenops Cabanisi	II	157, 158
rufosuperciliatus	II	157
rufosuperciliatus Cabanisi	II	158
ruficollis	II	160
temporalis	II	159
Anæretes *agilis*	II	242
albocristatus	II	241, 555
nigricristatus	II	555
parulus	II	239
Anas bahamensis	III	482
bicolor	III	471
cæruleata	III	475
cristata	III	473
caudacuta	III	481
cyanoptera	III	474
fimbriata	III	483
fulva	III	470
ilathera	III	483
leucogenys	III	486
moschata	III	472
oxyptera	III	476
oxyura	III	481
platalea	III	480
puna	III	478

Anas pyrrhogaster	Tomes III		Pages 473
Rafflesi	III		475
rubrirostris	III		483
specularoïdes	III		473
spinicauda	III		481
urophasianus	III		483
viduata	III		471
virgata	III		470
Ancisthrops *lineaticeps*	II		147
Andigena cucullatus	III		157
hypoglaucus	III		157
laminirostris	III		158
Androglossa amazonica	III		224
farinosa	III		220
festiva	III		223
mercenaria	III		221
ochrocephala	III		225
Anisognathus lacrymosus	II		481
Anous *inca*	III		446
Anser anticola	III		467
jubatus	III		468
melanopterus	III		467
montanus	III		467
Anthus *bogotensis*	I		457
brevirostris	I		459
calcaratus	I		458
chii	I	460,	III 506
correndera	I		458
furcatus	I		459
parvus	I		460
peruvianus	I	460,	III 506
rufescens	I		457
rufus	I	458, 460,	III 506
Antrostomus æquicaudatus	I		222
corpatao	I		219
maculicaudus	I		216
nigrescens	I		218
ocellatus	I		215
parvulus	I		217
rufus	I		219
rutilus	I		219
Anumbius frontalis	II		143
rufifrons	II		143
striaticeps	II		144
Aphantochroa *gularis*	I		277
hyposticta	I		276
Aphobus Chopi	II		433
Aphriza borealis	III		348

Ampelis elegans	Tomes II	Pages 378
maynana	II	385
Merremi	II	374
Riefferi	II	375
rubrocristata	II	381
rufaxilla	II	383
ruficristata	II	381
umbellata	II	391
Anabates auritus	II	145
Boissonneaui	II	145
erythrocercus	II	155
lineaticeps	II	147
melanorhynchus	II	148
montanus	II	153
ochralæmus	II	150
pulvericolor	II	126
pyrrhodes	II	151
rufifrons	II	143
ruficaudatus	II	155
ruficaudus	II	155
Sclateri	II	151
squamiger	II	164
striaticollis	II	153
subulatus	II	149
Anabazenops Cabanisi	II	157, 158
rufosuperciliatus	II	157
rufosuperciliatus Cabanisi	II	158
ruficollis	II	160
temporalis	II	159
Anærctes *agilis*	II	242
albocristatus	II	241, 555
nigricristatus	II	555
parulus	II	239
Anas bahamensis	III	482
bicolor	III	471
cæruleata	III	475
cristata	III	473
caudacuta	III	481
cyanoptera	III	474
fimbriata	III	483
fulva	III	470
ilathera	III	483
leucogenys	III	486
moschata	III	472
oxyptera	III	476
oxyura	III	481
platalea	III	480
puna	III	478

Ardea	buccinator	Tomes III	Pages 385
	Cabanisi	III	404
	cærulea	III	394, 397
	cærulescens	III	390, 394
	callocephala	III	405
	candidissima	III	393
	carolinensis	III	393
	cayanensis	III	405
	chalybea	III	394
	Cocoi	III	390
	cyanopus	III	394
	cyanura	III	397
	egretta	III	391
	erythromelas	III	399
	fasciata	III	401
	flava	III	401
	fusca	III	396
	fuscicollis	III	398
	galathea	III	391
	Gardeni	III	407
	helias	III	388
	involucris	III	399
	jamaïcensis	III	405
	leuce	III	391
	leucogastra	III	395
	lineata	III	401
	major	III	390
	maguari	III	390
	marmorata	III	401
	nivea	III	393
	obscura	III	406
	ohula	III	393
	palliata	III	390
	pileata	III	408
	plumbea	III	390, 394
	scapularis	III	398
	scolopacea	III	387
	sexsetacea	III	405
	soco	III	390, 401
	tigrina	III	401
	tula	III	393
	violacea	III	405
	virescens	III	397
Ardeola	erythromelas	III	399
Ardetta	erythromelas	III	399
	humilis	III	399
	involucris	III	399

Arremon Abeillei	Tomes II	Pages 534
affinis	II	530
assimilis	II	531
erythrorhynchus	II	535
frontalis	II	529
nigriceps	II	535
rufinucha	II	525
superciliaris	II	517
Arundinicola *leucocephala*	II	207
Asio accipitrinus	I	193
mexicanus	I	192
sandwichensis	I	193
Asthenurus rufiventris	III	63
Astragalinus columbianus	III	51
Astur cachinnans	I	145
leucorrhous	I	119
macrorhynchus	I	120
magnirostris	I	120, 123
Mirandollei	I	159
poliogaster	I	118
Asturina Azaræ	I	129
cyanopus	I	144
diadema	I	118
leucorrhoa	I	119
magnirostris	I	120, 123
Nattereri	I	123
schistacea	I	109
superciliaris	I	117
Athene cunicularia	I	174
ferruginea	I	178
hypogæa	I	174
melanota	I	180, 184
minutissima	I	178
socialis	I	174
Atricilla Catesbyi	III	450
megalopterus	III	450
micropterus	III	450
Attagen aquila	III	427
Attagis *Gayi*	III	284
Atticora *cinerea*	I	243
cyanoleuca	I	244
fasciata	I	244
murina	I	243
tibialis	I	242
Attila *citriniventris*	II	371
thamnophiloïdes	II	372
torridus	II	372
Aulacops hæmatopygus	III	161

Aulacorhamphus *atrogularis*	Tomes III	Pages 159
cæruleocinctus	III	160
derbianus	III	158
hæmatopygius	III	161
Aulacorhynchus atrogularis	III	159
cæruleocinctus	III	160
derbianus	III	158
Aulia *lateralis*	II	369
Automolus echinatus	II	155
montanus	II	153
ochrolæmus	II	150
Sclateri	II	151
striaticeps	II	148
subulatus	II	149
Avocettinus carolus	I	337

B

Barbican de Cayenne	II	298
Bartramia laticauda	III	371
Baryphonus cyanocephalus	III	108
cyanogaster	III	112
ruficapillus	III	112
semirufus	III	111
Baryphthengus *ruficapillus*	III	112
Basileuterus *bivittatus*	I	472, 473
castaneiceps	I	474
coronatus	I	476
chrysogaster	I	473
diachlorus	I	474
luteoviridis	I	477
nigricapillus	I	477
nigricristatus	I	477
semicervinus	I	478
trifasciatus	I	473
tristriatus	I	472
uropygialis	I	478
Bathmiderus albogriseus	II	361
atricapillus	II	365
Bernicla *melanoptera*	III	467
Bethylus medius	II	538
minor	II	536
picatus	II	536
Bidens albiventer	I	157
aurantius	I	150
dominicensis	I	154
rufiventer	I	157
sparverius	I	154

Biziura ferruginea	Tomes III	Pages 485
Blasipus Bridgesi	III	449
Bolborhynchus *andicola*	III	211
aurifrons	III	210
orbignesius	III	211
Bourcieria *cœligena*	I	390
inca	I	388
insectivora	I	389
Brachycex albogularis	III	119
Brachygalba *albigularis*	III	119
albiventer	III	120
inornata	III	120
Brachyotus Cassini	I	194
palustris americanus	I	194
Brotogerys *jugularis*	III	208
passerina	III	209
pyrrhoptera	III	205
tui	III	209
virescens	III	207
xanthoptera	III	208
Buarremon *albiceps*	II	533
assimilis	II	531
brunneinuchus	II	529
fulviceps	II	532
latinuchus	II	524
melanolæmus	II	525
mystacalis	II	526
Nationi	II	533
specularis	II	524
Taczanowskii	II	526
torquatus	II	530
tricolor	II	525
Bubo clamator	I	192
crassirostris	I	189
griseatus	I	188
magellanicus	I	189
virginianus	I	189
virginianus [*v.*] magellanicus	I	189
Bucco auratus	III	138
aurovirens	III	140
capensis	III	123
chacuru	III	129
collaris	III	123
fuscus	III	131
hyperrhynchus	III	125
lanceolatus	III	127
macrodactylus	III	128
macrorhynchus	III	123

Bucco nigrifrons	Tomes III	Pages 133
peruvianus	III	138
picatus	III	124
pulmentum	III	126
rufus	III	130
strigillatus	III	129
Busarellus nigricollis	I	111
Buteo aguia	I	134
albicaudatus	I	115
brachyurus	I	118
busarellus	I	111
erythronotus	I	115
Kaupi	I	117
latissimus	I	113
macropterus	I	169
melanoleucus	I	118
minutus	I	118
nigricollis	I	111
pennsylvanicus	I	113
polyosoma	I	115
tricolor	I	115
varius	I	115
Buteogallus busarellus	I	111
nigricollis	I	111
Buteola *brachyura*	I	118
Buthraupis *cucullata*	II	483
Butorides *cyanurus*	III	397
scapularis	III	398
scapulatus	III	398
virescens	III	398

C

Cabure	I	177
Cacicus Alfredi	II	407
atrovirens	II	406
chrysonotus	II	413
cristatus	II	404
holosericeus	II	415
persicus	II	411
solitarius	II	415
viridis	II	410
yuracares	II	403
Cactæraugus cactorum	III	77
Caïca *Barrabandi*	III	229
histrio	III	228

Caïca *melanocephala*	Tomes III	Pages 226
xanthomeros	III	226
Cairina Marianæ	III	472
moschata	III	472
sylvestris	III	472
Calidris *arenaria*	III	353
grisea minor	III	353
tringoïdes	III	353
Caliparcus kaliparcus	III	493
Calligenia dichroura	I	377
osculans	I	376
Calliphlox *amethystina*	I	317
amethystoïdes	I	317
Calliparæa Bourcieri	II	452
Callirhynchus *peruvianus*	III	512
Calliste *argentea*	II	446
argentea viridicollis	II	468
argyrophenges	II	468
atricærulea	II	456
atrocærulea	II	456
boliviana	II	464
castaneoventris	II	451
chilensis	II	457
chrysotis	II	475, III 511
cœlicolor	II	458
cyaneicollis	II	472
cyanicollis	II	472
cyanolæma	II	463
cyanoventris	II	463
cyanotis	II	473
frugilegus	II	488
fulvicervix	II	465
gyroloïdes	II	463
Hannahiæ	II	472
lamprotis	II	476
melanotis	II	473
nigricincta	II	471
nigriviridis	II	469
nigriviridis Berlepschi	II	469
Parzudakii	II	474
pulchra	II	462
punctata	II	460
ruficervix	II	465
Schranki	II	459
thalassina	II	471
Vassori	II	454
venusta	II	476
xanthocephala	II	475, 476

Calliste *xanthogastra* ..... Tomes II Pages 461
yeni ..... II 457
Callospiza boliviana ..... II 464
gyrola ..... II 463
pulchra ..... II 462
punctata ..... II 460
Schranki ..... II 459
xanthocephala ..... II 475
yeni ..... II 457
Calothorax Fanny ..... I 312
micrura ..... I 308
Mulsanti ..... I 306
Yarelli ..... I 311
Yarrelli ..... I 311
Calurus auriceps ..... III 175
pavoninus ..... III 175, 176
Camarhynchus cinereus ..... III 23
cinerea ..... III 23
Camarophagus leucoptera ..... II 504
Campephilus albirostris ..... III 71
hæmatogaster ..... III 74
melanoleucus ..... III 71
rubricollis ..... III 73
Sclateri ..... III 72
trachelopyrus ..... III 73
Campylorhynchus *balteatus* ..... I 503
fasciatus ..... I 505
hypostictus ..... I 506
cinnamomeus ..... II 102
Campylopterus æquatorialis ..... I 275
largipennis ..... I 275
obscurus ..... I 275
Cancroma cancrophaga ..... III 409
cochlearia ..... III 409
Cancrophaga bahamensis ..... III 405
Canecias leucotis ..... III 121
Capito *amazonicus* ..... III 139
aurantiicollis ..... III 141
auratus ..... III 138
aurifrons ..... III 138
aurovirens ..... III 140
collaris ..... III 123
cyphos ..... III 128
erythrocephalus ..... III 142
glaucogularis ..... III 142
lanceolatus ..... III 127
leucotis ..... III 129
macrorhynchus ..... III 123

Capito melanotis	Tomes III	Pages 129, 141
peruvianus	III	138
punctatus	III	138
senilis	III	130
Steeri	III	143
Tschudii	III	142
versicolor	III	141
Caprimulgus acutipennis	I	212
acutus	I	212
æquicaudatus	I	222
albicollis	I	226
americanus	I	226
andinus	I	221
bifasciatus	I	221
brasilianus	I	215
brasiliensis	I	215
campestris	I	208
conterminus	I	221
cornutus	I	207
decussatus	I	221
diurnus	I	208
exilis	I	212
grallarius	I	226
grandis	I	204
guianensis	I	226
hirundinaceus	I	212
jamaïcensis	I	207
laticaudatus	I	226
longicaudatus	I	205
longirostris	I	221
minor	I	217
nacunda	I	208
nigrescens	I	218
ocellatus	I	215
parvulus	I	217
pruinosus	I	210
rufus	I	219
rupestris	I	214
sapiti	I	212
semitorquatus	I	212, 218
Capsiempis *orbitalis*	II	250
Carbo albigula	III	430
Bougainvillei	III	430
brasilianus	III	429
gracilis	III	431
Cardinalis purpureus	II	491
Carduelis atrata	III	53
columbianus	III	51

Carenochrous *Dresseri*	Tomes II	Pages 528
latinuchus	II	524
melanolæmus	II	525
Seebohmi	II	527
Taczanowskii	II	526
tricolor	II	525
Carina moschata	III	472
Cariornis erythrurus	II	301
phœnicurus	II	302
Carnifex naso	I	160
Carpornis arcuata	II	379
rubricristata	II	381
Cassiculus leucorhamphus	II	413
Prevosti	II	415
solitarius	II	415
Cassicus *affinis*	II	414
Alfredi	II	407
angustifrons	II	410
ater	II	435
atrovirens	II	406
chrysonotus	II	412
crassirostris	II	414
cristatus	II	404
Devillei	II	403
flavicrissus	II	411
hæmorrhous	II	414
holosericeus	II	415
icteronotus	II	411
latirostris	II	402
leucorhamphus	II	413
luteus	II	411
niger	II	435
nigerrimus	II	415
Oseryi	II	402
palliatus	II	435
persicus	II	411
Prevosti	II	415
ruber	II	414
solitarius	II	415
viridis	II	405
vitellinus	II	411
yuracares	II	403
Yuracarium	II	403
Cassidix ater	II	435
mexicanus	II	435
oryzivora	II	435
Catamblyrhynchus *diadema*	III	24
Catamenia *analis*	III	19, 20

Catamenia *analoïdes*	Tomes III		Pages 20
homochroa	III		22
inornata	III		21
rufirostris	III		21
Catarracta parasita [*v.*] camtschatica	III		458
Catharista aura	II		551
urubu	I		84
Catharistes *atratus*	I		84
Cathartes aura	I	84, 89, 91	II 551
atratus	I		84
brasiliensis	I		84
fœtens	I		84
gryphus	I		75
jota	I		89
papa	I		81
Ricordi	II		551
ruficollis	II		551
septentrionalis	II		551
urbicola	II		551
urubitinga	I		89, 91
Catharus *dryas*	I		484
fuscater	I		483
maculatus	I		484
Celeopicus exalbidus	III		99
grammicus	III		96
jumana	III		98
tinnunculus	III		96
Celeus *citrinus*	III		99
citreopygius	III		98
flavus	III		99
grammicus	III		96
jumana	III		98
tinnunculus	III		96
Ceniciento	I		171
Centrites *oreas*	II		222
Centropelma microptera	III		497
micropterum	III		497
Centurus gradatus	III		78
Cephalopterus *ornatus*	II		391
Ceratopipra cornuta	II		337
Cercomacra *cinerascens*	II		55
tyrannina	II		54
Cerchneis *cinnamomina*	I		154
Certhia americana atricapilla	I		435
armillata	I		436
brasiliensis cærulea	I		436
cærulea	I		437
cyanea	I		436

Certhia cyanogastra	Tomes I	Pages 436
flavipes	I	436
ochrochlora	I	437
spiza	I	435
surinamensis	I	437
Certhilauda cunicularia	II	93
Frobeni	II	95
maritima	II	101
tenuirostris	II	96
Certhiola *chloropyga*	I	441
luteola	I	442
magnirostris	I	441
peruviana	I	439
Ceryle *amazona*	III	102
amazonia	III	102
americana	III	105
bicolor	III	103
Cabanisi	III	104
inda	III	103
superciliosa	III	106
torquata	III	100
Chacaru	III	129
Chætocercus *bombus*	I	309
Chætura brunneitorques	I	229
poliura	I	229
rutila	I	229
Sclateri	I	230
zonaris	I	231
Chalcothraupis argentea	II	466
atrocærulea	II	456
nigricincta	II	471
Chamæpelia amazilia	III	244
aymara	III	240
Buckleyi	III	245
cruziana	III	248
gracilis	III	248
griseola	III	244
passerina	III	242
Talpacoti	III	246
Chamæpetes Goudoti	III	273
rufiventris	III	273
Tschudii	III	275
Chamæza *nobilis*	II	79
olivacea	II	80
Charadrius apricarius	III	339
Azaræ	III	344
brevirostris	III	345
cayanus	III	335

Charadrius cinclus	Tomes III	Pages 349
collaris	III	344, 349
crassirostris	III	343
hiaticula	III	345
hypomelanus	III	339
hypomelas	III	339
jamaïcensis	III	342
larvatus	III	344
nævius	III	338
pardella	III	339
pluvialis	III	340
resplendens	III	336
rubidus	III	353
ruficollis	III	347
semipalmatus	III	345
spinosus	III	335
squatarola	III	339
stolatus	III	335
subtridactylus	III	338
torquatus	III	342
virginianus	III	340
virginicus	III	340
vociferus	III	342
wilsonius	III	343
Winterfeldi	III	348
Chaunornis pulmentum	III	126
Chelidoptera *tenebrosa*	III	137
Chenalopex *jubata*	III	468
Chiromacheris *manacus*	II	349
Chiroxiphia *regina*	II	348
Chloëphaga melanoptera	III	467
Chloroceryle bicolor	III	103
Chlorochrysa *calliparæa*	II	452
Chlorænas albilinea	III	232
plumbea	III	234
subvinacea	III	236
vinacea	III	235
Chloronerpes callonotus	III	80
callonotus peruvianus	III	80
canipileus	III	82
chlorocephalus	III	84
flavigula	III	84
flavigularis	III	84
fumigatus	III	79
hæmatostigma	III	81
hilaris	III	81
leucolæmus	III	85
Chlorophanes *atricapilla*	I	435

Chlorophonia *Torrejoni*	Tomes II	Pages 438
viridis	II	438
Chloropicus chlorocephalus	III	84
Isidori	III	85
leucolæmus	III	85
Chloropipo *unicolor*	II	335
Chlorospingus *albitemporalis*	II	513
auricularis	II	519
Berlepschi	II	521
castaneicollis	II	520
chrysogaster	II	515
cinereocephalus	II	515
flavigularis	II	514
frontalis	II	517
leucogaster	II	518
oleagineus	II	516
postocularis	II	513
superciliaris	II	517
xanthophthalmus	II	522
Chlorospiza Aldunati	III	34
erythronota	III	62
Gayi	III	32
Chlorostilbon angustipennis	I	415
assimilis	I	415
brevicaudatus	I	414
melanorhynchus	I	415
napensis	I	414
peruanus	I	414
prasinus	I	414
pumilus	I	415
smaragdina	I	415
Chordeiles *acutipennis*	I	212
acutus	I	210, 212
peruvianus	I	210
rupestris	I	214
Chroicocephalus atricilla	III	450
cirrhocephalus	III	455
cucullatus	III	451
Franklini	III	451
Kittlitzi	III	451
personatus	III	452
Schimperi	III	451
serranus	III	450
Chrysobronchus leucorrhous	I	373
Chrysomirus angustipennis	I	415
prasinus	I	414
Chrysomitris *atrata*	III	53
capitalis	III	49

Chrysomitris *columbiana*	Tomes III	Pages 51
magellanica	III	49
Siemiradzkii	III	50
uropygialis	III	54
xanthogastra	III	51
Chrysopicus atricollis	III	86
peruvianus	III	86
Chrysoptilus *atricollis*	III	86
punctigularis	III	88
punctipectus	III	88
speciosus	III	88
Chrysothraupis chrysotis	II	475
frugilegus	II	488
Parzudakii	II	474
pulchra	II	462
xanthocephala	II	476
Chrysotis *amazonica*	III	223
chloronota	III	222
farinosa	III	220
festiva	III	222
mercenaria	III	221
ochrocephala	III	224
pœcilorhynchus	III	225
Chrysuronia cæruleicapilla	I	409
Josephinæ	I	409
Ciccaba cayennensis	I	182
melanonota	I	184
perspicillata	I	180
virgata	I	182
Cichlocolaptes adspersus	II	157
ochroblepharus	II	157
Ciconia jabiru	III	411
mycteria	III	411
Cillurus bifasciatus	II	111
montanus	II	108
nigrofumosus	II	110
palliatus	II	109
rivularis	II	112
Cinclodes *bifasciatus*	II	111
fuscus	II	112
montanus	II	108
nigrofumosus	II	110
palliatus	II	109
rivularis	II	112
Cinclus *leucocephalus*	I	501
morinellus	III	349
Cinnicerthia *peruana*	I	506
peruviana	I	506

Circaëtus solitarius	Tomes I	Pages 129
Circus albicollis	I	169
campestris	I	171
cinereus	I	171
histrionicus	I	171
leucocephalus	I	111
leucophrys	I	169
macropterus	I	169
maculosus	I	169
megaspilus	I	169
poliopterus	I	171
rufulus	I	110
superciliosus	I	169
Cirripipra filicauda	II	336
Cirrhocephalus plumbeiceps	III	445
Cissopis *medius*	II	536, 538
minor	II	536, 538
Cistothorus graminicola	I	527
Cladoscopus Devillei	II	175
Claïs Guimeti	I	364
Climacocercus concentricus	I	162
Clypeicterus *Oseryi*	II	402
Clytolæma *aurescens*	I	387
Mathewsi	I	295
Cnipodectes *minor*	II	294
subbrunneus	II	294
Cnipolegus *anthracinus*	II	208
Coccoborus aureiventris	III	1
chrysogaster	III	3
cyaneus	III	5
magnirostris	III	7
torridus	III	7
Coccothraustes cyanea	III	5
Coccyzus cayanus	III	186
cinereus	III	189
erythrophthalmus	III	189
melanocoryphus	III	189
minor	III	189
minutus	III	187
seniculus	III	189
rutilus	III	187
Cochlearius fuscus	III	409
nævius	III	409
Cœligena Warszewiczi	I	383
typica	I	390
Cœophleus lineatus	III	75
mesochrysus	III	75
Cœreba atricapilla	I	435

Cœreba brevipes	Tomes I	Pages 437
carneipes	I	437
cærulea	I	437
cyanea	I	436
eximia	I	437
melanocephala	I	435
nitida	I	438, 439
Cola tixera	I	137
Colaptes *puna*	III	94
rupicola	III	92, 94
Stolzmanni	III	92
Colibri crispus	I	370
hirundinaceus	I	304
Colopterus galeatus	II	229
Columba *albilineata*	III	232
albipennis	III	232
aurita	III	237
aymara	III	240
bicolor	III	235
cinerea	III	253
cruziana	III	248
cuprea	III	260
denisea	III	232
erythrothorax	III	249
fasciata	III	232
frenata	III	257
frontalis	III	254
Geoffroii	III	250
Geoffroyi	III	250
godofrida	III	250
infuscata	III	234
jamaïcensis	III	254
locutrix	III	234
maculata	III	237
maculosa	III	232
melancholica	III	251
melanoptera	III	239
meloda	III	241
minuta	III	244
montana	III	260
monticola	III	249
passerina	III	242
plumbea	III	234
rufa cayennensis	III	260
rufaxilla	III	254
rufina	III	236
souleyetiana	III	241
speciosa	III	231

Columba *subvinacea*	Tomes III	Pages 236
talpacoti	III	246
trifasciata	III	250
vinacea	III	235, 236
Columbina griseola	III	244
melanoptera	III	239
Columbula erythrothorax	III	249
Colymbus cayennensis	III	492
dominicus	III	495
fulica	III	490
major	III	492
Cometes caroli	I	337
phaon	I	336
Compsocoma *sumptuosa*	II	484
Compsothlypis inornata	I	463
Comptostoma flaviventre	II	255
Conirostrum *atrocyaneum*	I	426
cinereum	I	425
cæruleifrons	I	426
cyaneum	I	423
ferrugineiventre	I	424
flaviventre	I	431
sitticolor	I	423
Conopias *cinchoneti*	II	285
Conopophaga ardesiaca	II	88
castaneiceps	II	88
nævia	II	71
peruviana	II	90
Theresæ	II	72
torrida	II	89
Conothraupis *speculigera*	II	546
Contopus *ardesiacus*	II	317
borealis	II	316
plebejus	II	319
punensis	II	319
virens	II	318
Conurus agilis	III	210
cayanensis	III	199
cyanopterus	III	203
erythrogenys	III	198
frontatus	III	197
gregarius	III	212
griseocephalus	III	205
guianensis	III	199
jugularis	III	208
Illigeri	III	195
leucophthalmus	III	199

Conurus *Luciani*	Tomes III	Pages 203
melanurus	III	202
mitratus	III	196
pavua	III	199
propinquus	III	199
roseifrons	III	204
rubrifrons	III	205
rubrolarvatus	III	198
rupicola	III	201
sitophagus	III	210
Souancei	III	200
Weddelli	III	200
xanthopterus	III	207
Cooperastur pileatus	I	166
Coprotretes Jelskii	II	106
Copurus *colonus*	II	209
Coracina cephaloptera	II	391
granadensis	II	392
gymnodera	II	390
ornata	II	391
Corvus flavigaster	II	286
flavus	II	286
leucogaster	II	286
mystacalis	II	398
nudicollis	II	390
nudus	II	390
peruvianus	II	396
yncas	II	396
Corydalla chilensis	I	458
Coryphospingus *cristatus*	III	28
cruentus	III	30
pileatus	III	28
Corythopis anthoïdes	II	91
anthoïdes humivagans	II	91
humivagans	II	91
Cotinga *cayana*	II	384
cendré	II	368
guereiva	II	384
mayana	II	385
maynana	II	385
maynanensis	II	385
pyrrholæma	II	386
rufaxilla	II	383
Coturniculus *peruanus*	III	43
Cotyle flavigastra	I	246
riparia	I	245
uropygialis	I	247
Craugasus flavigula	III	84

Crax alector	Tomes III	Pages 514
cumanensis	III	276
galeata	III	266
globicera	III	264
globulosa	III	264
mitu	III	266
pauxi	III	266
Temmincki	III	514
tuberosa	III	267
urumutum	III	265
Craxirex pennsylvanicus	I	113
Creagrus furcatus	III	457
Creurgops *verticalis*	II	501
Crex facialis	III	324
femoralis	III	326
galeata	III	327
Crithagra brasiliensis	III	55
brevirostris	III	61
chloropsis	III	56
flaveola	III	55
Pentlandi	III	58
Crotophaga americana	III	181
ani	III	180, 181
Casassi	III	181
lævirostra	III	180
major	III	180
minor	III	180
rugirostra	III	180
semisulcata	III	181
sulcirostris	III	181
Crotophagus major	III	180
Crybelus Martii	III	111
Crypticus platyrrhynchus	III	113
Crypturus adspersus	III	299
atrocapillus	III	294
Balstoni	III	299
Bartletti	III	301
cinereus	III	300
guttatus	III	295
Kleei	III	293
noctivagus	III	302
obscurus	III	296
obsoletus	III	296
parvirostris	III	298
pileatus	III	298
rubripes	III	303
tataupa	III	297
Cuculus cayanus	III	187, 188

Cuculus cayennensis minor	Tomes III	Pages 187
cayennensis nævius	III	184
erythrophthalmus	III	189
galeritus	III	184
melanogaster	III	188
monachus	III	187
nævius	III	184
punctulatus	III	184
ruficapillus	III	184
rutilus	III	187
septorum	III	184
tenebrosus	III	136
Culicivora bilineata	III	505
budytoïdes	II	238
parulus	II	239
Cultrites Pucherani	III	183
Cyanocitta *joliæa*	II	401
viridicyanea	II	400
Cyanocorax *mystacalis*	II	398
incas	II	396
peruanus	II	396
violaceus	II	399
viridicyaneus	II	400
yncas	II	396
Cyanoloxia cyanea	III	5
Cyanomyia cyanicollis	I	397
Cyanophonia musica	II	439
Cyanospiza cyanicollis	II	472
sp.?	III	42
Cyanotis *Azaræ*	II	243
Cyanurus joliæa	II	401
Cyclorhis *Contrerasi*	I	450
guianensis	I	448
poliocephala	I	448
virenticeps	I	449
Cyclorhynchus fulvipectus	II	279
ruficauda	II	284
sulphurescens	II	280
Cymbops cochlearia	III	409
Cymbilaimus lineatus	II	1
Cymbilanius *lineatus*	II	1
Cymindis cayennensis	I	144
buteonides	I	144
megarhynchus	I	141
Cymochorea *Markhami*	III	462
Cynanthus bifurcatus	I	333
griseiventris	I	334
mocoa	I	334

Cynanthus smaragdicaudus	Tomes I	Pages 335
Cyphorhinus griseicollis	I	512
leucostictus	I	513
marginatus	I	511
modulator	I	508
phæocephalus	I	508
prostheleucus	I	512
Salvini	I	509
thoracicus	I	507
Cyphos macrodactylus	III	128
macrorhynchus	III	124
Cypseloïdes *fumigatus*	I	232
Cypselus *andecolus*	I	232
andicola	I	232
collaris	I	231
montivagus	I	233
pelasgius	I	229
poliourus	I	229
squamatus	I	234

D

Dacnidea albiventris	II	518
leucogastra	II	518
Dacnis albiventris	I	427
analis	I	432
angelica	I	429
archangelica	I	429
atricapillus	I	435
cayana	I	428
cayanus	I	428
cyanaster	I	428
flaviventer	I	431
flaviventris	I	431
melanotis	I	429
modesta	I	429
plumbea	I	433
pulcherrima	I	432
xanthophthalma	II	522
Dafila *bahamensis*	III	482
cæsioscapulata	III	480
oxyura	III	481
pyrrhogaster	III	473
spinicauda	III	481
urophasianus	III	481
Daptrion *capensis*	III	465
Daptrius ater	I	103
Dasycephala albicauda	II	184
leucophrys	II	67

Dasycephala thamnophiloïdes	Tomes II	Pages 372
Dendrocincla *fumigata*	II	168
merula	II	169
Dendrocolaptes chunchotambo	II	179
cuneatus	II	167
Devillei	II	175
fumigatus	II	168
longirostris	II	171
merula	II	169
ocellatus	II	179
pallescens	II	170
radiolatus	II	170
Souleyeti	II	174
validus	II	169
Dendrocops fumigatus	II	168
merula	II	169
validus	II	170
Dendrocopus fuliginosus	II	168
longirostris	II	171
Dendrocygna autumnalis	III	469
discolor	III	469
fulva	III	470
major	III	471
viduata	III	471
Dendrœca *æstiva*	III	506
aureola	I	467
Blackburniæ	I	464
canadensis	I	468
cærulea	I	465
Dendromanes merula	II	169
Dendrornis chunchotambo	II	179
elegans	II	178
guttata	II	176
multiguttata	II	180
ocellata	II	179
palliata	II	179
rostripallens	II	176
triangularis	II	177
Dendroxetastes *Devillei*	II	175
Diallactes melanurus	II	3, 4
transandeanus	II	3
Diglossa albilatera	I	418
albilateralis	I	418
alerrima	I	419
brunneiventris	I	420
melanopsis	I	421
pectoralis	I	419
personata	I	421

Diglossa *sittoïdes*	Tomes I	Pages 417
Diglossopis *cærulescens*	I	422
Diodon bidentatus	I	157
brasiliensis	I	157
Diomedea adusta	III	461
albatrus	III	461
exulans	III	461
irrorata	III	461
spadicea	III	461
Diphlogæna aurora	I	383
iris	I	384
Warszewiczi	I	383
Diphlogène aurore	I	383
Diplopterus *nævius*	III	184
Diuca *speculifera*	III	41
Diucopis atra	II	547
speculigera	II	546
Diva albiventris	I	427
atrocærulea	II	456
Branickii	II	455
Vassori	II	454
Dives *Warszewiczi*	II	433
Dixiphia coracina	II	342
Docimastes *ensiferus*	II	375
Schliephaekei	I	375
Dolichonyx agripennis	II	421
oryzivorus	II	421
Doliornis *Sclateri*	II	384
Donacobius *atricapillus*	I	502
brasiliensis	I	502
Doryfera Euphrosinæ	I	285
Johannæ	I	285
rectirostris	I	284
Doryphora Euphrosinæ	I	285
Johannæ	I	285
rectirostris	I	284
Dryocopus albirostris	III	72
lineatus	III	75
Sclateri	III	72
trachelopyrus	III	73
Dryopicus lineatus	III	75
Dubusia lacrymosa	II	481
Dysithamnus *ardesiacus*	II	32
olivaceus	II	28
schistaceus	II	31
semicinereus	II	29, 30
tambillanus	II	30
Dysporus variegatus	III	433

E

Egretta agami	Tomes III	Pages 396
americana	III	392
leuce	III	392
leucogastra	III	395
nivea	III	394
Elænea miles	II	276
similis	II	276
Elainea *albiceps*	II	263, 264, 265
albicollis	II	273
brevirostris	II	272
caniceps	II	269
cayanensis	II	275
elegans	II	266
gigas	II	265
gracilis	II	271
leucospodia	II	267
lineata	II	351
luteiventris	II	278
modesta	II	263
obscura	II	270
pagana	II	262
pallatangæ	II	264
placens	II	268
subplacens	II	268
stictoptera	II	201
Elainia viridiflava	II	261
Elanoïdes furcatus	I	137
yetapa	I	137
Elanus torquatus	I	140
Emberiza atriceps	III	34
brasiliensis	III	55
fulviceps	II	532
Gayi	III	32
guttata	III	35
luctuosa	III	37
lutea	III	56
matutina	III	45
oryzivora	II	421
pileata	III	45
rustica	III	38
speculifera	III	41
unicolor	III	38
uropygialis	III	58
Embernagra brunneinucha	II	529
torquata	II	530

Empidagra brevirostris..... Tomes II Pages 272
Empidochanes fuscatus..... II 313
olivus..... II 313
pœcilurus..... II 314
Empidonax andinus..... II 319
minimus..... II 315
Empidonomus *varius*..... II 326
Eos cervicalis..... III 197
Ephialtes cristatus..... I 188
Eremita griseigularis..... I 270
Ereunetes *petrificatus*..... III 362
semipalmata..... III 362
Eriocnemis *affinis*..... I 396
derbiana..... I 395
derbianus..... I 395
derbyanus..... I 395
Derbyi..... I 395
Dybowskii..... I 394
sapphiropygia..... I 397
Erionotus capitalis..... II 11
murinus..... II 12
nævius..... II 8
Eriopus Derbyi..... I 395
Erismatura cyanorhyncha..... III 485
ferruginea..... III 484
leucogenys..... III 486
vittata..... III 485
Erythrocnema unicincta..... I 106
Esparvero calzado..... I 135
Eubucco aurantiicollis..... III 141
Hartlaubi..... III 141
Eucephala *cærulea*..... I 410
Euchloris Riefferi..... II 375
Eucinetus Barrabandi..... III 229
histrio..... III 228
Euclosia Gayi..... I 283
Eucometis *penicillata*..... II 499
Eudacnis flaviventer..... I 431
Eudocimus *albus*..... III 415
Eulidia Yarrelli..... I 311
Eupetomena *hirundo*..... I 274
Euphona aureata..... II 439
nigricollis..... II 439
Euphone chlorotica..... II 444
musica..... II 439
Euphonia bicolor..... II 448
brevirostris..... II 444
chalcopasta..... II 449, III 510

Euphonia *chrysopasta*	Tomes II	Pages 448
crassirostris	II	445
hypoxantha	II	445
melanura	II	447
mesochrysa	III	510
minuta	II	440, 442
nigricollis	II	439
olivacea	II	442
pumila	II	442
rufiventris	II	447
saturata	II	443
serrirostris	II	440
stictifrons	II	442
xanthogastra	II	444
Euprepiste boliviana	II	465
Eupsilostoma pusillum	II	254
Eurypyga *helias*	III	388
Euscarthmus agilis	II	242
cinereus	II	236
fulviceps	II	235
pileatus	II	230
pyrrhops	II	232
reguloïdes	II	241
ruficeps	II	235
rufigularis	II	231
rufipes	II	233
spicifer	II	229
squamicristatus	II	230
Wuchereri	II	233
Euschemon cyanolæma	II	463
Euspiza alaudina	III	35
fulviceps	II	532
Euthlypis canadensis	I	468
Euthraupis analis	II	479
Eutoxeres Condaminei	I	259
Condamini	I	259
Condaminii	I	259

F

Falcinellus Ordi	III	416
Ridgwayi	III	416
Falco aguia	I	124
albifrons	I	118
albigularis	I	150
americanus	I	103
anatum	I	147
aquilinus	I	103

Falco arundinaceus ..... Tomes I Pages 127
aterrimus ..... I 103
aurantius ..... I 149, 150
Beskii..... I 166
bidentatus..... I 157
brachypterus ..... I 160
brasiliensis..... I 92
busarellus..... I 111
cachinnans ..... I 145
calquin..... I 131
caracca ..... I 131
carolinensis..... I 127
Cassini..... I 147
cayennensis ..... I 127, 144
cinnamominus..... I 154
coronatus ..... I 129
cristatus ..... I 131
crotaphagus ..... I 99
cucullatus..... I 150
degener..... I 99
deiroleucus ..... I 149
delicatus ..... I 133
destructor..... I 131
femoralis..... I 151
formosus..... I 103
furcatus..... I 137
fusco-cærulescens ..... I 151
gracilis..... I 154
guianensis..... I 133
haliætus..... I 127
harpyia ..... I 131
Harrisii..... I 106
histrionicus..... I 171
imperialis ..... I 131
insectivorus ..... I 120
Jacquini..... I 131
latissimus ..... I 113
leucomelas..... I 160
leucorrhous ..... I 119
magnirostris..... I 120, 123
Mauduyti..... I 135
melanobronchus ..... I 111
meridionalis..... I 110
nigriceps..... I 147
nigricollis..... I 111
nisus..... I 163
nudicollis ..... I 103
ornatus ..... I 135

Falco palliatus	Tomes	I	Pages 144
palustris		I	169
pennsylvanicus		I	113
percontator		I	160
pileatus		I	166
plancus		I	92
plumbeus		I	138
regalis		I	131
rufifrons		I	140
rufigularis		I	150
rutilans		I	110
Sonnini		I	133
sparverius		I	154
superbus		I	135
tharus		I	92
thoracicus		I	150, 151
tyrannus		I	134
unicinctus		I	106
urubitinga		I	104
Wilsoni		I	113
zonurus		I	104
Faxado		I	160
Floricola *albicrissa*		I	393
longirostris		I	391
Florisuga flabellifera		I	297
mellivora		I	297
Fluvicola albiventris		II	205
atripennis		II	206
bicolor		II	205
œnanthodis		II	192
pica		II	205
rufipectoralis		II	194
Formicarius *analis*		II	78
erythropterus		II	553
lugubris		II	68
nigrifrons		II	77
nigromaculatus		II	76
Formicivora ardesiaca		II	65
atra		II	56
bicolor		II	50
cærulescens		II	55
callinota		II	52
caloptera		II	202
cinerascens		II	55
hæmatonota		II	40
Hauxwelli		II	44
melæna		II	48
Menetriesii		II	45

Formicivora pygmæa	Tomes	II	Pages	37
quadrivittata		II		38
quixensis		II		51
rufatra		II		49
rufimarginata		II		34
Fregata *aquila*		III		427
Fringilla alaudina		III		35
araguira		III		28
arvensis		III		61
aureiventris		III		1
australis		III		45
brasiliensis		III		55
campestris		III		35
capensis		III		45
chilensis		III		45
cristata		III		28
cucullata		III		28
cyanomelas		I		437
gutturalis		III		13
flammea		III		28
flava		III		55
flaveola		III		55
fruticeti		III		37
Gayi		III		32, 33
luteiventris		III		59
melanocephala		III		13
nitens		III		25
pileata		III		28
splendens		III		25
Fulica *ardesiaca*		III		328
cayennensis		III		318
gigantea		III		329
Fuligula *Nationi*		III		484
Furnarius *cinnamomeus*		II		102
cunicularius		II		93
griseiceps		II		102
leucopus		II		104
longirostris		II		102
minor		II		105
torridus		II		104

G

Galbacirhynchus *leucotis*	III	121
Galbula albigularis	III	119
albirostris	III	116
chalcocephala	III	117

Galbula chalcoptera	Tomes III	Pages 120
chalcothorax	III	118
cyanescens	III	115
flavirostris	III	116
inornata	III	120
jacamarici	III	122
leucogastra	III	118
lugubris	III	120
tombacea	III	115
Gallinago *andina*	III	375
frenata	III	375
Jamesoni	III	376
Gallinula carolina	III	320
cayanensis	III	318
crassirostris	III	326
galeata	III	327
pileata	III	323
plumbea	III	319
ruficeps	III	318
saracura	III	319
Gambetta flavipes	III	367
melanoleuca	III	366
Gampsonyx *Swainsoni*	I	140
Garrulus peruvianus	II	396
viridicyaneus	II	400
Garzetta candidissima	III	393
ohula	III	393
Gavia roseiventris	III	454
Geositta anthoïdes	II	93
crassirostris	II	95
cunicularia	II	93
cunicularia juninensis	II	93
Frobeni	II	95
maritima	II	101
peruviana	II	100
saxicolina	II	98
tenuirostris	II	96
Geothlypis æquinoctialis	I	471
æquinoctialis peruviana	I	471
auricularis	I	470
poliocephala	I	470
velata	I	469
Geotrygon *Bourcieri*	III	259
frenata	III	257, 259
montana	III	260
Geranoaëtos aguia	I	124
melanoleucus	I	124
Geranospiza *cærulescens*	I	168

Geronticus cayanensis	Tomes III	Pages 420
Glareola cuneicauda	III	281
Glaucidium *ferox*	I	178
phalænoïdes	I	178
Glaucis affinis	I	261
cervinicauda	I	260
hirsuta	I	261
hirsutus	I	261
mazeppa	I	261
melanura	I	261
Glottis semipalmata	III	364
Glyphidiura perlata	I	195
Glyphorhynchus Castelnaudi	II	167
cuneatus	II	167
cuneatus Castelnaudi	II	167
ruficaudus	II	167
Gnathospiza *Raimondii*	III	6
Golondrina domestica	I	236
Gouldia *Langsdorffi*	I	304
melanosternum	I	304
Popelairi	I	302
Popelairii	I	302
Gracula chrysoptera	II	416
fœtida	II	390
longirostris	I	502
Graculus Bougainvillei	III	430
brasilianus	III	429
Gaimardi	III	431
Grallaria *albiloris*	II	82
andicola	II	85
brevicauda	II	86
brevicauda minor	II	86
erythroleuca	II	87
fusca	III	512
minor	II	86
Przewalskii	II	84
regulus	II	80
rufula	II	88
squamigera	II	81
Grus psophia	III	385
Grypus Vieilloti	I	370
Guiraca cinerea	III	23
cyanea	III	5
cyanoïdes	III	5
cayennensis	II	390
Gymnoderus *fœtidus*	II	390
Gymnomystax *melanicterus*	II	426
mexicanus	II	426

Gymnopelia *erythrothorax*	Tomes III	Pages 249
Gymnops aterrimus	I	103
strigillatus	I	99
Gypagus condor	I	75
gryphus	I	75
papa	I	81
Gyparchus papa	I	81
Gyrinorhynchus rufirostris	III	21
Gyrola gyroloïdes	II	464

H

Hadrostomus *audax*	II	356
homochrous	II	357
minor	II	358
Hæmophila *Stolzmanni*	III	47
Hæmatopus arcticus	III	351
ater	III	351
brasiliensis	III	351
ostralegus	III	351
palliatus	III	350
Townsendi	III	351
Haladroma Berardi	III	466
Garnoti	III	465
Haliaëtus erythronotus	I	115
melanoleucus	I	124
Haliæus albigula	III	430
brasilianus	III	429
Gaimardi	III	431
Halodroma Garnoti	III	465
Hapalocercus *acutipennis*	II	236
fulviceps	II	235
Harpagus *bidentatus*	I	157
rufipes	I	157
Harpiprion *cærulescens*	III	419
cayennensis	III	420
Harpyhaliaëtus *coronatus*	I	129
Harpyia bracchata	I	134
coronata	I	129
destructor	I	131
ferox	I	50, 131
maxima	I	131
ornata	I	135
Heliangelus *amethysticollis*	I	381
micraster	I	380
viola	I	379
Helianthea aurora	I	383

Helianthea cupripennis	Tomes	I	Pages	340
dichroura		I		377
iris		I		384
osculans		I		376
Helias phalænoïdes		III		388
Heliochera *rubrocristata*		II		381
rufaxilla		II		383
Heliodoxa Leadbeateri		I		287
otero		I		287
Heliomaster albicrissa		I		393
longirostris		I		391
pallidiceps		I		392
Sclateri		I		392
Stuartæ		I		394
Heliomastes albicrissa		I		393
longirostris		I		392
Heliothrix auritus		I		363
longirostris		I		363
Heliornis *fulica*		III		490
fulicarius		III		490
Heliotrypha *micraster*		I		380
micrastur		I		380
viola		I		379
Helymus micraster		I		380
Hemidacnis *albiventris*		I		427
Hemipalama himantopus		III		363
minor		III		362
multistriata		III		363
Hemipipo Tschudii		II		334
Hemiprogne fumigata		I		232
zonaris		I		231
Hemispingus auricularis		II		519
superciliaris		II		517
Hemistephania Euphrosinæ		I		285
Johannæ		I		285
rectirostris		I		284
Hemithraupis flavicollis		II		511
guira		II		510
melanoxantha		II		511
nigricollis		II		510
Henicorhina *leucophrys*		I		512
leucosticta		I		513
Herodias cærulea		III		394
egretta		III		392
leucogaster		III		395
pileata		III		408
Herpetotheres *cachinnans*		I		145

Herpsilochmus argentatus	Tomes II	Pages	59
axillaris	II		35
motacilloïdes	II		35
puncticeps	II		35
rufimarginatus	II		34
Heterocercus lineatus	II		351
lineatus	III		510
Heterocnemis *argentata*	II		59
bicolor	I		510
marginatus	I		511
Heteropelma *Amazonum*	II		350
Wallacii	II		351
Heteropygia Bonapartei	III		360
Heterospizias *meridionalis*	I		110
Hiaticula Wilsoni	III		343
Himantopus mexicanus	III		383
nigricollis	III		383
Hirundinea bellicosa	II		297
Sclateri	II		297
Hirundo æquatorialis	I		239
albicollis	I		231
albilinea	III		503
albilineata	III		503
albiventris	I		239
americana	I	238, III	502
andecola	I		242
cahirica	III		502
cayanensis	I		237
chalybæa	I	236,	237
cinerea	I		243
cærulea	I		236
collaris	I		231
cyanoleuca	I		244
erythrogastra	I		238
fasciata	I		244
flavigastra	I		246
flaviventer	I		246
freti Hudsonis	I		236
hortensis	I		246
jugularis	I		246
kamtschatica	III		502
leucoptera	I		239
leucopygia	I	240, III	503
leucorrhoa	I		241
ludoviciana	I		236
melampyga	I		244
minuta	I		244
oxyura	I		229

Hirundo pascuum	Tomes	I	Pages	236
peruviana		I		243
purpurea		I		236
riparia		I		245
Robini		I		229
ruficollaris		III		503
ruficollis		I		246
rustica saturata		III		502
rutila		I		229
saturata		III		502
subis		I		236
tapera		I		236
Tytleri		III		502
versicolor		I		236
violacea		I		236
zonaris		I		231
Homophania inca		I		388
insectivora		I		389
Hoplopterus *cayanus*		III		335
Hydropsalis climacocercus		I		224
lyra		I	225, III	501
segmentata		I		223
trifurcata		I		224
trifurcatus		I		224
Hylocharis *cyanea*		I		411
cyaneus		I		411
sapphirina		I		412
sapphirinus		I		412
Hylolophus leucauchen		II		15
Hylophilus cæruleus		II		513
cyanoleucus		II		513
ferrugineifrons		I		445
flaviventris		I		446
frontalis		II		517
olivaceus		I		447
Hypochrysia aurora		I		383
Hypocnemis cantator		II		61
cantator peruvianus		II		61
elegans		II		65
flavescens		II		62
hemileuca		II		70
leucophrys		II		67
lepidonota		II		64
lugubris		II		68
melanolæma		II		65
melanosticta		II		65
melanopogon		II		70
melanura		II		76

Hypocnemis *myotherina*	Tomes II	Pages 65, III 509
nævia	II	71
pœcilonota	II	64, 75
schistacea	II	69
subflava	II	63
Theresæ	II	72
Hypolia otero	I	287
Hypolophus leucauchen	II	15
Hypomorphnus ardesiacus	I	109
leucurus	I	115
rutilus	I	110
unicinctus	I	106
urubitinga	I	104
Hypothlypis callophrys	III	510
iridina	II	453
Hypotriorchis aurantius	I	149, 150, 151
deiroleucus	I	149
femoralis	I	151
rufigularis	I	150
Hypoxanthus brevirostris	III	90
Rivolii brevirostris	III	90
Hypsibamon andicola	II	85

I

Ibiyau acanelado	I	219
Ibis alba	III	415
cærulescens	III	419
cayennensis	III	420
dentirostris	III	420
falcinellus	III	416
longirostris	III	415
nandapou	III	414
plumbea	III	419
sylvatica	III	420
Ibycter *americanus*	I	103
ater	I	103
chimachima	I	99
chimango	I	97
megalopterus	I	101
Icterus atrigularis	II	417
cayanensis	II	417
chrysocephalus	II	416
chrysopterus	II	424
citrinus	II	426
croconotus	II	420
grace-annæ	II	419

Icterus guianensis..... Tomes II Pages 427
Hauxwelli..... III 510
icterocephalus..... II 425
jamacai..... II 420
mesomelas..... II 417
sericeus..... II 422
tanagrinus..... II 433
Ictinia *plumbea*..... I 138
Inca mystacalis..... III 446
Iodopleura Emiliæ..... II 388
guttata..... II 388
Isabellæ..... II 388
Ipoborus montanus..... II 149
stictoptilus..... II 153
Iridornis *analis*..... II 479
Jelskii..... II 478
Reinhardti..... II 477
Iridosornis analis..... II 479
Reinhardti..... II 477
Ischnoscelis cærulescens..... I 168
Ispida americana viridis..... III 106
brasiliensis..... III 105
Ixothraupis chrysogaster..... II 461
punctata..... II 460

J

Jacamaralcyonides leucotis..... III 121
Jacamarici..... III 122
Jacamerops *grandis*..... III 122
Isidori..... III 122
Japu negro..... II 415
Japus Azaræ..... II 435
bursarius..... II 415
Jolæma *Schreibersii*..... I 289
whitelyana..... I 291
Jonolaima Schreibersii..... I 289

K

Klaïs Guimeti..... I 364

L

La correndera..... I 458
Lafresnaya *Gayi*..... I 283

Lafresnaya Saulæ	Tomes I	Pages 283
Lampornis iridescens	I	281
mango	I	281
violicauda	I	281
Lampraster *Branickii*	I	286
Lamprolita platyrhyncha	III	122
Lampropsar guianensis	II	433
tanagrinus	II	433
Warszewiczi	II	433
Lampropygia cœligena	I	390
Lamprotes albocristatus	II	387
Laniagra guianensis	I	448
Lanio *versicolor*	II	500
Lanius atricapillus	II	365
cayanensis	II	8
cayanus	II	354
cayanus [*v.*] nævius	II	354
cayennensis striatus	II	19
doliatus	II	19
funebris	II	57
lineatus	II	1
mitratus	II	360
nævius	II	8
palliatus	II	17
pitangua	II	294
punctatus	II	8
rubiginosus	II	19
sulphuratus	II	286
superciliosus	I	448
Larus albipennis	III	454
antipodus	III	447
atricilla	III	450, 451
Azaræ	III	447
Belcheri	III	448
Bonapartii	III	453
Bridgesi	III	449
cirrhocephalus	III	455
dominicanus	III	447
Franklini	III	451
Fritzei	III	447
Frobeenii	III	448
Frobeni	III	448
fuliginosus	III	448
furcatus	III	457
glaucodes	III	454
glaucotes	III	454
glaucotis	III	453, 454
modestus	III	449

Larus parasiticus	Tomes III	Pages 458
poliocephalus	III	455
ridibundus	III	450
Sabini	III	456
serranus	III	452
Verreauxi	III	447
vociferus	III	447
Lathria *cineracea*	III	368
cinerea	III	368
Latirallus facialis	III	324
Leadbeatera otero	I	287
Warszewiczi	I	383
Legatus *albicollis*	II	273
Leistes albipes	II	429
americanus	II	427
guianensis	II	427
Leobia caroli	I	337
Lepidœnas speciosa	III	231
Lepidothrix cyaneocephala	II	343
Isidori	II	342
Leptasthenura *ægithaloïdes*	II	120
andicola	II	118
pileata	II	119
striata	II	121
Leptaxyura cinnamomea	II	127
Leptodactylus Mitchelli	III	372
Leptodon cayennensis	I	144
megarhynchus	I	141
Leptopelecanus Molinæ	III	424
Leptopogon amarocephalus	II	248
auritus	II	246
minor	II	247
peruvianus	II	248
rufipectus	II	249
superciliaris	II	246
viridiflavus	II	261
Leptoptila *ochroptera*	III	255
rufaxilla	III	254, 256
Verreauxi	III	256
Leptopus	III	372
Lepturus	III	436
Lepturus brevicauda	II	223
fulviceps	II	235
Lesbia *gracilis*	I	330
nuna	I	333
Lessonia orcas	II	222
Lestris antarctica	III	458
antarcticus [v.] β chilensis	III	458

	Tome	Pages
Lestris pomarinus	II	[illegible]
Leucopolis [illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
Leucorrhinia Bouganvillei	II	[illegible]
Leucania [illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
Leucopharus [illegible]	II	[illegible]
Leucopharus modestus	II	[illegible]
Leucopterus [illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
Limosa [illegible]	II	[illegible]
[illegible]	II	[illegible]
[illegible]	II	[illegible]
[illegible]	II	[illegible]
Linaria [illegible]	II	[illegible]
[illegible]	II	[illegible]
Linaugris [illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
Linocentris [illegible]	II	[illegible]
Linotes [illegible]	II	[illegible]
Lioniqesia [illegible]	I	[illegible]
Lioniqorrus [illegible]	I	[illegible]
Liqnorus [illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
Liqnosoiza [illegible]	II	[illegible]
Liqnostrix [illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
Liqnotrichus [illegible]	II	[illegible]
[illegible]	II	[illegible]
Loxia [illegible]	III	[illegible]
Loxia [illegible]	III	[illegible]
[illegible]	III	[illegible]
[illegible]	III	[illegible]
[illegible]	III	[illegible]
[illegible]	III	[illegible]
[illegible]	III	[illegible]
[illegible]	II	[illegible]
Lurocalis [illegible]	I	[illegible]
[illegible]	I	[illegible]
Lypornis [illegible]	III	130, 131

Lypornix ruficapilla..... Tomes III Pages 136
torquata..... III 131
unicolor..... III 133

M

Macabra melanonota..... I 184
Macagua..... I 145
cachinnans..... I 145
Macas meñor..... III 495
Machæropterus *pyrocephalus*..... II 346
striolatus..... II 347
Macrocercus arararuna..... III 193
militaris..... III 191
Macropsalis lyra..... I 225
segmentatus..... I 223
Macropus caixana..... III 187, 188
Macrorhamphus *griseus*..... III 373
Malacocichla dryas..... I 484
maculata..... I 484
Malacoptila *fulvogularis*..... III 132
fusca..... III 131
rufa..... III 130
Manacus..... II 349
aurocapillus..... II 340
Edwardsi..... II 349
niger..... II 349
rubrocapillus..... II 338
Maracana Luciani..... III 203
verde..... III 199
Weddelli..... III 200
Margarornis *brunnescens*..... II 166
perlatus..... II 164
squamigera..... II 164
Mecocerculus *caloptera*..... II 202
gratiosus..... II 199
pœcilocerca..... II 203
stictoptera..... II 201
tæniopterus..... II 201
Megalophus Castelnaudi..... II 295
Megapicus albirostris..... III 71
hæmatogaster..... III 74
Sclateri..... III 72
trachelopyrus..... III 73
Megarhynchus audax..... II 289
pitangua..... II 294
Melampicus hirundinaceus..... III 89
Melanerpes *cruentatus*..... III 89

Melanodiglossa albilatera	Tomes I	Pages 418
aterrima	I	419
Melanomitris atrata	III	53
uropygialis	III	54
Mellisuga Merrittii	I	364
ruficeps	I	348
smaragdinis	I	334
surinamensis	I	297
Melopelia *meloda*	III	241
Merganetta columbiana	III	486
leucogenys	III	486, 488
Turneri	III	488
Merula *chiguanco*	I	494
gigantodes	I	495
leucops	I	496
Reevii	I	490
serrana	I	496
Mesopicus fumigatus	III	79
Metallura *æneicauda*	I	355
cupreicauda	I	353, 354
eupogon	I	352
Hedvigæ	I	352
Jelskii	I	354
opaca	I	353
quitensis	I	358
smaragdinicollis	I	356
tyrianthina	I	358
Metopothrix *aurantiacus*	II	348
Metriopelia *aymara*	III	240
melanoptera	III	239
Micrastur concentricus	I	162
dynastes	I	165
gilvicollis	I	162
guerilla	I	166
macrorhynchus	I	159
Mirandollei	I	159
Pelzelni	I	161
semitorquatus	I	160
Microcerculus *bicolor*	I	510
leucostictus	I	513
marginatus	I	510, 511
Microchelidon tibialis	I	242
Micropalama *himantopus*	III	363
Micropogon amazonicus	III	139
flavicollis	III	138
Micropogon glaucogularis	III	142
Micropus andicola	I	232
Microrhopias callinota	II	52

Microrhopias quixensis	Tomes II	Pages 51
Microsittace Luciani	III	203
rupicola	III	202
Souancei	III	201
Microspingus *trifasciatus*	II	523
Milvago *chimachina*	I	99
chimango	I	97
megalopterus	I	101
ochrocephalus	I	99
Milvulus tyrannus	II	332
violentus	II	332
Milvus cenchris	I	138
furcatus	I	137
Mimus *longicaudatus*	I	498
thilius	II	424
Mionectes *oleagineus*	II	245
poliocephala	II	244
striaticollis	II	244
Mitrephorus *ochraceiventris*	II	315
Mitu braziliensis	III	266
Mitua *tuberosa*	III	266
Molothrus *purpurascens*	II	422
Molybdophanes cærulescens	III	419
Momotus *æquatorialis*	III	110
brasiliensis	III	108, 109
Dombeyi	III	112
Martii	III	111
microstephanus	III	109
momota	III	108
platyrhynchus	III	113
ruficapillus	III	112
semirufus	III	111
Monasa axillaris	III	133
flavirostris	III	132
nigrifrons	III	133
peruana	III	134
peruviana	III	134
tenebrio	III	136
tenebrosa	III	136
unitorques	III	131
Morinella collaris	III	349
Morphnus cristatus	I	133
guianensis	I	133
harpyia	I	131
urubitinga	I	104
Motacilla æstiva	III	506
aurantia	I	464
Blackburniæ	I	464

Motacilla canadensis	Tomes III	Pages 506
cayana	I	428
chrysocephala	I	464
cyanocephala	I	428
flavicauda	III	507
guira	II	510
magellanica	I	529
multicolor	III	507
rubiginosa	III	506
tricolora	III	507
Mouette à queue fourchue	III	457
Mulsantia mirabilis	I	318
Muscicapa agilis	II	313
albiceps	II	263
audax	II	289
aurantia	II	360
aurora	II	321
barbata	II	298
bicolor	II	205
bimaculata	II	313
Bonapartei	I	468
canadensis	I	468
cayanensis	II	275
chloronotus	II	245
cinerascens	II	370
cinerea	I	468
colon	II	209
colonus	II	209
Cooperi	II	316
coronata	II	307
cruenta	II	389
dominicana	II	207
eques	II	360
erythrura	II	301
fasciata	II	305
filicauda	II	209
flammiceps	II	305
furcata	II	327
inornata	II	316
legatus	II	273
leucocephala	II	207, 275
marginata	II	364
megacephala	II	283
melanops	II	506
melanoxantha	II	225
nævia	II	305
nigriceps	II	359
oleaginea	II	245

Muscicapa oliva	Tomes	II	Pages 313
olivacea		I	443
pagana		II	262
parulus		II	239
phænoleuca		II	332
pica		II	205
plumbea		II	368
porphyrobroncha		II	389
purpurata		II	389
pygmæa		II	37
rubinea		II	307
rubra		II	394
rubricollis		II	389
rufina		II	326
rustica		II	370
ruticilla		III	507
similis		II	276
simplex		II	370
striaticollis		II	244
sulphurea		II	277
thamnophiloïdes		II	372
trivirgata		II	276
tyrannulus		II	321
tyrannus		II	332
tyrannus brasiliensis		II	294
virens		II	318
virgata		II	305
vociferans		II	368
Muscicapara oleaginea		II	245
striaticollis		II	244
Muscigralla *brevicauda*		II	223
Muscipeta albiceps		II	263
albicollis		II	273
armillata		I	454
cayennensis		II	276
chloronotus		II	245
cinnamomea		II	299
citrina		II	273
Guillemini		II	270
leucocilla		II	209
monarcha		II	209
obscura		II	270
ralloïdes		I	454
ruficauda		II	326
Vieilloti		II	299
virgata		II	305
Muscisaxicola *albifrons*		II	209
albimentum		II	212

Muscisaxicola	*cinerea*	Tomes II	Pages 212
	flavinucha	II	211
	flavivertex	II	211
	fluviatilis	II	220
	grisea	II	213
	juninensis	II	214
	maculirostris	II	219
	mentalis	II	218
	rubricapilla	II	215
	rufipennis	II	221
	rufivertex	II	216
Muscivora	*Castelnaudi*	II	295
	cristata	II	295
Mycteria	*americana*	III	411
Myiadestes	*leucotis*	I	455
	ralloïdes	I	454
Myiarchus	atropurpureus	II	311
	cephalotes	II	322
	coronatus	II	310
	erythrocercus	II	320
	fasciatus	II	208
	ferox	II	322
	ferrugineus	II	297
	nigricans	II	204
	nigriceps	II	324
	phæocephalus	II	323
	semirufus	II	325
	tyrannulus	II	321
Myiobius	ardesiacus	II	317
	aureiventris	II	302
	auriceps	II	305
	barbatus	II	298
	borealis	II	316
	cinnamomeus	II	299
	crypterythrus	II	304
	erythrurus	II	301
	luteoventer	II	290
	nævius	II	305
	Nationi	II	303
	nigricapillus	II	257
	olivus	II	313
	phœnicurus	II	302
	pyrrhopterus	II	300
	pulcher	II	302
	rufescens	II	303
	sulphureus	II	277
	superciliaris	II	306
	villosus	II	299

Myiobius virens	Tomes II	Pages 318
xanthopygius	II	299
Myioborus melanocephalus	I	479
verticalis	I	481
Myiodioctes *canadensis*	I	468
tristriatus	I	472
Myiodynastes *atrifrons*	II	291
audax	II	289
chrysocephalus	II	293
luteiventris	II	290
luteoventer	II	290
solitarius	II	288
Myiopatis pusilla	II	255
tumbezana	II	252
Wagæ	II	253
Myiophobus crypterythrus	II	304
pœcilurus	II	314
Myiothera analis	II	78
ardesiaca	II	65
fuliginosa	II	47
nigrimaculata	II	76
rufimarginata	II	34
superciliaris	II	49
thamnophiloïdes	II	65
Myiotheretes *erythropygius*	II	187
striaticollis	II	187
Myiothlypis luteoviridis	I	477
nigricristatus	I	477
Myioturdus fuscater	I	483
Myiozeta cayennensis	II	275
Myiozetetes *cayennensis*	II	275
granadensis	II	276
luteiventris	II	278
similis	II	276
sulphureus	II	277
Myrmeciza argentata	II	59
hemimelæna	II	59
leucaspis	II	74
margaritata	II	27
maynana	II	60
Myrmelastes *nigerrimus*	II	25
plumbeus	II	24
Myrmia *micrura*	I	308
Myrmoborus leucophrys	II	67
Myrmonax ardesiacus	II	65
leucophrys	II	67
lugubris	II	68
Myrmothera axillaris	II	47

Myrmothera Menetriesii	Tomes II	Pages 45
minuta	II	37
thamnophiloïdes	II	65
Myrmotherula *atrogularis*	II	41
axillaris	II	47, 48
cinereiventris	II	43
gutturalis	II	42, III 509
hæmatonota	II	40
Hauxwelli	II	44
melæna	II	48
Menetriesii	II	45
multistriata	II	39
pygmæa	II	37
surinamensis	II	38, 39
Myrtis *Fanny*	I	312
Yarrelli	I	311

N

Nacunda	I	208
Nacurutu	I	189
chorreado	I	192
Nænia *inca*	III	446
Nasica albicollis	II	171
longirostris	II	171
multiguttata	II	180
nasalis	II	171
triangularis	II	177
Nauclerus forcipatus	I	137
furcatus	I	137
Nectarinia luteola	I	442
mitrata	I	435
Nectris *amaurosoma*	III	463
chilensis	III	463
Negriblanco	I	160
Neinei	II	294
Nemosia auricollis	II	511
flavicollis	II	511
fulvescens	II	508
guira	II	510, 554
guirina	II	554
gularis	III	27
inornata	II	509
nigricollis	II	510
ornata	II	507
pectoralis	II	508
peruana	II	512

Nemosia *pileata*	Tomes II	Pages 513
sordida	II	508
torquata	I	432
Neocheiidon tibialis	I	242
Neomorphus *Pucherani*	III	183
Neopipo *cinnamomea*	II	346
rubicunda	II	346
Neops spirurus	II	167
Neorhynchus *nasesus*	III	9
Nephocætes fumigatus	I	232
Nertus rufifrons	I	140
Nisus concentricus	I	162
leucorrhous	I	119
magnirostris	I	120
pileatus	I	166
striatus	I	163
variatus	I	165
Noctua dominicensis	I	174
ferruginea	I	178
ferox	I	178
melanonota	I	184
minor	I	194
urucurea	I	174
Noddi inca	III	446
Nonnula *brunnea*	III	135
frontalis	III	135
ruficapilla	III	136
Notherodius guarauna	III	387
Nothocercus atricapillus	III	294
Nothocrax *urumutum*	III	265
Nothoprocta *Branickii*	III	308
curvirostris	III	306
Godmani	III	305
Taczanowskii	III	304, 305
Nothriscus picatus	III	124
Numenius borealis	III	380
hudsonicus	III	380
intermedius	III	380
rufiventris	III	380
rufus	III	380
Nyctiardea pileata	III	408
Nyctibius *bracteatus*	I	206
cornutus	I	207
grandis	I	204
jamaïcensis	I	207
longicaudatus	I	205
rufus	I	206

Nyctibius urutau	Tomes I	Pages 207
Nycticorax americanus	III	407
Gardeni	III	407
nævia	III	407
obscurus	III	406
pileatus	III	408
violaceus	III	405
Nyctidromus *albicollis*	I	226
Nyctiphrynus ocellatus	I	215
Nyphocætes fumigatus	I	232

O

Oceanites *oceanica*	III	463
Ochthites brevicauda	II	223
Ochthodiæta *fumigata*	II	188
fuscorufus	II	190
signata	II	189
Ochthœca *fumicolor*	II	191
fumigata	II	188
gratiosa	II	199
Jelskii	II	198
Lessoni	II	195
leucometopa	II	193
leucophrys	II	193
nigrita	II	197
œnanthoïdes	II	192
polionota	II	193
rufimarginata	II	196
rufipectoralis	II	194
Salvini	II	200
stictoptera	II	201
thoracica	II	197
Ocyalus atrovirens	II	406
cristatus	II	404
latirostris	II	402
panayensis	II	402
viridis	II	405
Ocypetes torquatus	III	283
Odontophorus *Balliviani*	III	290
pachyrhynchus	III	287
speciosus	III	288
stellatus	III	289
Œdicnemus *superciliaris*	III	333
Œnops *aura*	II	551
pernigra	I	89
urubitinga	I	91

Onchorhynchus Castelnaudi	Tomes II	Pages 295
Onocrotalus fuscus	III	425
Hernandezi	III	425
thagus	III	424
Opisthocomus *cristatus*	III	262
hoazin	III	262
Opetiorhynchus ferrugineus	II	104
nigrofumosus	II	110
Orchesticus *ater*	II	547
Orchilus *ecaudatus*	II	234
pileatus	II	230
rufipes	II	233
Oreonympha *nobilis*	I	344
Oreophilus *ruficollis*	III	347
Oreotrochilus Estella	I	277
Estellæ	I	277
leucopleurus	I	278
melanogaster	I	279
Oriolus americanus	II	427
cayennensis	II	417
chrysocephalus	II	416
citreus	II	404
cristatus	II	404, 405
guianensis	II	427
japacani	I	502
icterocephalus	II	425
leucopterus	II	504
melaleucus	II	504
mexicanus	II	426
musicus	II	417
oryzivorus	II	435
persicus	II	411
rufirostris	II	405
viridis	II	405
Ornismya Allardi	I	358
amazili	I	406
amethystina	I	317
amethystoïdes	I	317
Audeberti	I	410
aurita	I	363
bicolor	I	411
chrysura	I	336
cora	I	314
cyanea	I	411
cyanopogon	I	306
cyanotis	I	369
Delattrii	I	299
delphinæ	I	371

Ornismya ensifera	Tomes I	Pages 375
Fanny	I	312
furcata	I	293
gigantea	I	373
Gouldi	I	333
Josephinæ	I	409
Langsdorffi	I	304
mellisuga	I	414
mellivora	I	297
microrhyncha	I	349
Mulsanti	I	306
neera	I	409
nigrotis	I	363
nuna	I	333
Nuna-Koali	I	333
Paulinæ	I	358
petasophora	I	370
prasina	I	414
sapphirina	I	412
superba	I	391
Temmincki	I	338
tristis	I	373
vesper	I	316
Ornithion imberbe	II	254
pusillum	II	254, 255
Sclateri	II	254
Orotrochilus Estellæ	I	277
leucopleurus	I	278
melanogaster	I	279
Ortalida adspersa	III	278
guttata	III	278
Orthorhynchus amazili	I	406
amethysticollis	I	381
smaragdinicollis	I	356
Ortygis *ocellata*	III	513
Ortygometra chilensis	III	321
facialis	III	324
jamaïcensis	III	321
Ortyx stellatus	III	289
Oryzoborus *melas*	III	8
torridus	III	7
Ostinops *Alfredi*	II	407
angustifrons	II	410
atrovirens	II	406
cristata	II	404
cristatus	II	404
decumanus	II	404
viridis	II	405

Ostinops *Yuracarium* ..... Tomes II Pages 403
Ostralega atra ..... III 351
palliata ..... III 351
Otus americanus ..... I 193
brachyotus ..... I 194
mexicanus ..... I 192
galopagoensis ..... I 194
Ourax galeata ..... III 266
mitu ..... III 266
pauxi ..... III 266
Oxyurus dorsomaculatus ..... II 116

P

Pachynus *brachyurus* ..... III 216
Pachyrhamphus *albogriseus* ..... II 361
atricapillus ..... II 360, 365
cinereus ..... II 360
leucogaster ..... II 360
niger ..... II 363
nigriventris ..... II 363
pectoralis ..... II 358
rufescens ..... II 368
spodiurus ..... II 362
squamatus ..... II 366
versicolor ..... II 366
viridis ..... II 359
Pachyrhynchus albifrons ..... II 365
melanocephalus ..... II 354
rufescens ..... II 368
semifasciatus ..... II 353
Swainsoni ..... II 365
Paille en queue de Cayenne ..... III 436
Pandion americanus ..... I 127
fluviatilis ..... I 127
fulvus ..... I 104
haliætus ..... I 127
Panoplites *Mathewsi* ..... I 295
Paroaria *gularis* ..... III 27
Parula brasiliana ..... I 463
pitiayumi ..... I 463
Parulus ruficeps ..... II 122
Parus auricapillus ..... II 340
luteus ..... III 506
pipra ..... II 341
Parra chilensis ..... III 335
jacana ..... III 331

Phalacrocorax brasiliensis	Tomes III	Pages 429
cirriger	III	431
Gaimardi	III	431
niger	III	429
Phalaropus angustirostris	III	382
australis	III	382
cinerascens	III	382
cinereus	III	382
fuscus	III	382
hyperboreus	III	381
ruficollis	III	382
vulgaris	III	382
Williamsi	III	382
Phalcobænus montanus	I	101
Pharomacrus *antisianus*	III	177
auriceps	III	175
pavoninus	III	176
Phasianus cristatus	III	262
hoazin	III	262
Phegornis *Mitchelli*	III	372
Pheucticus *aureiventris*	III	1
chrysogaster	III	3
chrysopeplus	III	3
uropygialis	III	2
Philydor *erythrocercus*	II	155
erythropterus	II	154
montanus	II	153
ochralæmus	II	150
pyrrhodes	II	151
ruficaudatus	II	155
striaticollis	II	153
subflavescens	II	156
subfulvus	II	152
turdinus	II	150
Phlœocryptes *melanops*	II	116
striaticeps	II	144
Phlogopsis *erythroptera*	II	553
nigromaculata	II	76
Phœnicocercus coccineus	II	374
nigricollis	II	374
Phœnicoparrus andinus	III	423
Phœnicopterus *andinus*	III	423
chilensis	III	422
ignipallialus	III	422
Phœnicosoma Azaræ	II	495
Phœnicothraupis *Carmioli*	II	499
peruvianus	II	498
rubica	II	498

Phœnisoma ardens	Tomes II	Pages 497
Azaræ	II	495
bivittata	II	497
Pholeoptynx *cunicularia*	I	174
hypogæa	I	174
Phonasca melanura	II	447
minuta	II	442
saturata	II	443
xanthogastra	II	444
Phrygilus *alaudinus*	III	35
Aldunati	III	34
atriceps	III	34
fruticeti	III	37
Gayi	III	32, 34
laciniata	III	35
plebejus	III	39
ocularis	III	39, 40
rusticus	III	38
unicolor	III	38
Phyllomanes flavoviridis	I	445
Phyllomyias *cinereocapilla*	II	251
tumbezana	II	252
Phytotoma Bloxhami	II	394
Molinæ	II	394
Raimondii	II	395
rara	II	394
silens	II	394
Piaya brachyptera	III	188
cayana	III	186
cayana nigricrissa	III	186
erythrophthalma	III	189
Mehleri	III	186
melanocorypha	III	189
melanogastra	III	188
minuta	III	187
nigricrissa	III	186
rutila	III	187
Pica chloronotus	II	396
luteola	II	396
Picolaptes cinnamomeus	II	102
lacrymiger	II	173
peruvianus	II	173
Souleyeti	II	174
Warszewiczi	II	173
Picumnus albosquamatus	III	68
aurifrons	III	65
Buffoni	III	70
Castelnau	III	64

Picumnus *Castelnaudi*	Tomes III	Pages 64
Jelskii	III	68
Lafresnayi	III	70
punctifrons	III	65
rufiventer	III	63
rufiventris	III	63
Sclateri	III	66
Steindachneri	III	67
Picus albirostris	III	71
albivittatus	III	78
atricollis	III	86
cactorum	III	77
canipileus	III	82
chlorocephalus	III	84
citrinus	III	99
comatus	III	71
cruentatus	III	89
exalbidus	III	99
flavigula	III	84
flavicans	III	99
flavipes	III	89
flavus	III	99
fumigatus	III	79
grammicus	III	96
hæmatogaster	III	74
hæmatostigma	III	81
hirundinaceus	III	89
icterocephalus	III	84
ischnorhynchus	III	89
jumana	III	97
Kaupi	III	78
Kingi	III	78
leucolæmus	III	85
lignarius	III	78
lineatus	III	75
melanocephalus	III	78
melanoleucus	III	71
meropirostris	III	89
occipitalis	III	89
passerinus	III	81
puncticeps	III	78
rubiginosus	III	82
tinnunculus	III	96
Piezorhina *cinerea*	III	23
Pileopsis cristata	II	499
Pilherodius pileatus	III	408
Pionias menstruus	III	218
tumultuosus	III	219

Pionus Barrabandi	Tomes III	Pages 229
menstruus	III	218
tumultuosus	III	219
Pipile *cumanensis*	III	276
pipile	III	276
Pipilo mystacalis	II	533
Pipilopsis flavigularis	II	514
fulviceps	II	532
superciliaris	II	517
Pipra atricapilla	II	360
auricapilla	II	340
chloris	II	334
chloromeros	II	339
cinerea	II	360
cinnamomea	II	346
coccinea	II	374
cæruleocapilla	II	344
coracina	II	342
cornuta	II	337
coronata	II	343
cristata	II	340
cyaneocapilla	II	343
cyanocephala	II	439
elata	II	256
erythrocephala	II	338, 340
fasciata	II	337
flicauda	II	336
filifera	II	336
Isidori	II	342
leucocapilla	II	341
leucocephala	II	207
leucocilla	II	341
manacus	II	349
nævia	II	71
nigricollis	II	374
peruviana	II	373
purpurea	II	340
pyrocephala	II	346
rubra	II	340
rubricapilla	II	338
rupicola [*v.*] β	II	373
strigillata	II	347
striolata	II	347
torquata	II	238
virescens	II	345
Pipræides castaneoventris	II	451
Pipreola aureipectus	II	378
elegans	II	378

Pipreola *Lubomirskii*	Tomes II	Pages 377
melanolæma	II	376
Riefferi	II	375
viridis	II	376
viridis intermedia	II	376
Pipridea albiventris	I	427
castaneiventris	II	451
melanonota	II	450
melanonota venezuelensis	II	450
venezuelensis	II	450
Piprites chlorion	II	334
Tschudii	II	334
Pitangus *sulphuratus*	II	286
Pithys albifrons	II	73
albifrons peruviana	II	73
leucaspis	II	74
leucophrys	II	67
lunulata	II	75
Pitylus *albociliaris*	II	549
aureiventris	III	1
chrysogaster	III	3
grossus	II	548
olivaceus	III	513
puteus	III	513
Placellodomus *frontalis*	II	143
striaticeps	II	144
Platalea *ajaja*	III	412
coccinea	III	412
incarnata	III	412
rosea	III	412
Platyrhynchus *albigularis*	II	225
bicolor	II	205
chrysoceps	II	305
coronatus	II	307
Duponti	II	359
nuchalis	II	280
paganus	II	262
platurus	II	209
ruficauda	II	284
senex	II	224
sulphurescens	II	280
Platyurus niger	I	529
Plotus *anhinga*	III	434
cayanensis	III	434
melanogaster	III	434
surinamensis	III	490
tupinambis	III	434
Plumipeda superba	I	135

Pluvialis dominicensis	Tomes III	Pages	342
torquata	III		342
virginiana	III		342
Podager *nacunda*	I		208
Podiceps antarcticus	III		498
bicornis	III		492
caliparæus	III		493
cayanus	III		492
chilensis	III		493
dominicanus	III		495
dominicus	III		495
leucotis	III		494
major	III		492
micropterus	III		497
occipitalis	III		493
Rollandi	III		494
Podilymbus *antarcticus*	III		498
Podoa surinamensis	III		490
Pœcilonetta bahamensis	III		483
Pœcilothraupis *ignicrissa*	II		482
igniventris	II		482
lacrymosa	II		480, 481
palpebrosa	II		480
Pœocephalus melanocephalus	III		227
xanthomerus	III		226
Pogonotriccus *ophthalmicus*	II		250
Polemistria Verreauxii	I		300
Polioptila *albiloris*	I	452, III	504
bilineata	III		505
Buffoni	I	453, III	505
nigriceps	I		453
parvirostris	III		505
Polyborus brasiliensis	I		92
caracara	I		92
chimachima	I		99
chimango	I		97
megalopterus	I		101
tharus	I		92
vulgaris	I		92
Polydacnis angelica	I		429
Polythmus hypoleucus	I		400
leucoproctus	I		373
leucorrhous	I		373
Polyxemus bombus	I		309
Poospiza *Bonapartei*	III		30
cæsar	III		32
torquata	III		30
Popelairia tricholopha	I		302

Porphyrio cinereus	Tomes III	Pages 322
Porphyriops *melanops*	III	326
leucopterus	III	326
Porzana *carolina*	III	320
cayanensis	III	323
cayennensis	III	323
cinerea	III	322
erythrops	III	325
exilis	III	322
facialis	III	324
fasciata	III	324
Hauxwelli	III	324
jamaïcensis	III	321
viridis	III	323
Prasites phœopyga	I	415
Premnocopus multiguttatus	II	180
Presbys peruanus	I	506
Prionites æquatorialis	III	110
dombeyanus	III	112
Levaillantii	III	112
Martii	III	111
microstephanus	III	109
momota	III	108
platyrhynchus	III	113
rubricapillus	III	112
ruficapillus	III	112
tutu	III	112
Prionirhynchus *platyrhynchus*	III	113
Procellaria brasiliana	III	429
capensis	III	465
glacialoïdes	III	464
nævia	III	465
oceanica	III	463
Wilsoni	III	463
Procnias *occidentalis*	II	437
ventralis	II	437
viridis	II	438
Procnopis argentea	II	466
atrocærulea	II	456
chrysotis	II	475
nigricincta	II	471
Parzudakii	II	474
xanthocephala	II	476
Progne *chalybæa*	I	236, 237
leucogastra	I	237
purpurea	I	236
tapera	I	236
Prymnacantha Langsdorffi	I	304

Psaris atricapillus	Tomes II	Pages 360
aurantius	II	360
cayanus	II	354
Cuvieri	II	359
guyanensis	II	354
niger	II	363
roseicollis	II	358
semifasciatus	II	353
versicolor	II	366
viridis	II	359
Psarocolius caudacutus	II	421
chrysopterus	II	417, 424
croconotus	II	420
gymnops	II	426
jamacai	II	420
icteronotus	II	411
mesomelas	II	417
nigerrimus	II	415
palliatus	II	435
Pseudocolaptes auritus	II	145
Boissonneaui	II	145
semicinnamomeus	II	145
Pseudomitris columbiana	III	51
Psittaca guianensis	III	199
Psittacara chloroptera	III	199
erythrogenys	III	198
melanura	III	202
mitrata	III	196
rubrilarvata	III	198
variegata	III	202
Psittacula andicola	III	211
brasiliensis icterocephalus	III	209
brasiliensis uropygio cyaneo	III	212
cœlestis	III	214
crassirostris	III	215
griseifrons	III	205
melanorhyncha	III	213
passerina	III	212
Sclateri	III	213
viridissima	III	212
Psittaculus Sancti-Thomæ	III	212
Psittacus æstivus	III	223
amazonicus	III	223
amazonicus brasiliensis	III	224
amazonicus pœcilorhynchus	III	224
ambiguus	III	191, 192
aourou	III	223
aracanga	III	192

Psittacus	arauna	Tomes III	Pages 193
	atricapillus	III	226
	aurifrons	III	210
	badiceps	III	226
	Barrabandi	III	229
	brachyurus	III	216
	brasiliensis cyanocephalus	III	223
	caïca	III	228
	capensis	III	212
	cayennensis	III	206
	chiriri	III	206
	cyanocephalus	III	218
	cyanogula	III	218
	erythrocyaneus	III	192
	farinosus	III	220
	festivus	III	222
	guianensis cyanocephalus	III	218
	histrio	III	228
	Hueti	III	217
	jamaïcensis	III	223
	leucophthalmus	III	199
	lunatus	III	197
	luteolus	III	223
	macao	III	192
	melanocephalus	III	226
	menstruus	III	218
	mercenarius	III	221
	militaris	III	191
	notatus	III	199
	ochrocephalus	III	224
	passerinus	III	209, 212
	pavua	III	199
	pileatus	III	228, 229
	pœkilorhynchus	III	225
	pulverulentus	III	220
	pumilio	III	216
	pumilio Spixi	III	216
	purpureus	III	218
	pyrrhopterus	III	205
	Sancti-Thomæ	III	209
	severus	III	194
	tovi	III	209
	tui	III	209
	tumultuosus	III	119
	versicolorus	III	206
	virescens	III	206
	viridissimus	III	216
Psittospiza elegans		II	538

Psittovius jugularis..... Tomes III Pages 208
Psophia *crepitans*.... ..... III 385
leucoptera..... III 385
Pteroglossus *Azaræ*..... III 149
atrogularis..... III 159
Beauharnaisii..... III 152
castanotis..... III 151
cæruleicinctus..... III 160
derbianus..... III 158
flavirostris..... .. III 148
Gouldi..... III 156
hæmatopygus..... III 161
Humboldti..... III 149
hypoglaucus..... .... III 157
Langsdorffi..... III 154
lepidocephalus..... III 152
Lichtensteini..... .... III 160
pluricinctus..... III 151
Pœppigi..... ... III 152
Reinwardti..... III 153
ulocomus..... III 152
Pterophanes *Temmincki*..... ..... I 338
Pteroptochus acutirostris..... I 532
femoralis..... ..... I 532
magellanicus..... I 529
Ptilogonys griseiventer..... ..... I 454
leucotis..... I 455
Ptyonura albifrons..... .. II 209
mentalis..... II 218
rufivertex..... II 216
Puffinaria Garnoti..... III 465
Pulsatrix *torquata*..... I 180
Pygmornis amaura..... I 272
griseogularis..... I 270
nigricincta:..... I 272
nigricinctus..... ... ... I 272
striigularis..... I 272
Pygoptila *maculipennis*..... II 26
margaritata..... ..... II 27
Pyranga *æstiva*..... II 494
ardens..... II 497
Azaræ..... II 495
leucoptera..... II 497
rubicus..... II 498
rubriceps..... II 496
versicolor..... II 500
Pyrgita peruviana.... ..... III 45

Pyriglena funebris	Tomes II	Pages 57
picea	II	56
tyrannina	II	54
serva	II	56
Pyrocephalus obscurus	II	311
rubineus	II	307, 310
rubineus coronatus	II	310
rubineus obscurus	II	311
Pyroderos *granadensis*	II	392
Pyrrhocoma fulviceps	II	532
Pyrrhodiglossa brunneiventris	I	420
Pyrrhomyias cinnamomeus	II	300
Pyrrhophæna leucophæa	I	407
Pyrrhorhynchus arcuatus	II	379
Riefferi	II	375
Pyrrhula cærulea brasiliana	III	5
leucomelas	III	10
telasco	III	14
Pyrrhulopsis Hueti	III	217
Luciani	III	203
Pyrrhura melanura	III	202
roseifrons	III	204
rupicola	III	201
Souancci	III	201

Q

Querquedula angustirostris	III	477
cæruleata	III	475
cyanoptera	III	475
oxyptera	III	476
puna	III	478
Querula *cruenta*	II	389
minor	II	358
rubricollis	II	390
Quiscalus æquatorialis	II	433
assimilis	II	431
peruvianus	II	431

R

Rallus ardeoïdes	III	387
cæsius	III	316
carolinus	III	320
cayennensis	III	323
chirocote	III	318
cypereti	III	315
exilis	III	322

Rallus gigas	Tomes III	Pages 387
jamaïcensis	III	321
kiolo	III	323
limicola	III	314
maximus	III	318
melanops	III	326
nigricans	III	317
peruvianus	III	313
plumbeus	III	319
rhytirhynchus	III	316
Salinasi	III	321
semiplumbeus	III	314
stolidus	III	320
virginianus	III	314
viridis	III	323
Ramphotrigon ruficauda	II	284
Recurvirostra *andina*	III	384
himantopus	III	383
Regerrhinus *cayennensis*	I	144
megarhynchus	I	141
Regulus Azaræ	II	243
byronensis	II	243
omnicolor	II	243
plumulosus	II	239
Rhamphastos ambiguus	III	145
Azaræ	III	149
culminatus	III	146
Cuvieri	III	147
inca	III	146
momota	III	108
tocard	III	145
Rhamphocænus *albiventris*	II	53
melanurus	II	53
Rhamphocelus aterrimus	II	493
atrosericeus	II	493
ignescens	II	491
jacapa	II	491
Luciani	II	494
nigrogularis	II	491
Rhamphodon anaïs	I	367
Rhamphomicron microrhyncha	I	349
microrhynchum	I	349
olivaceus	I	347
ruficeps	I	348
Stanleyi	I	345
Vulcani	I	345
Rhamphopis atrococcineus	II	491
atrosericeus	II	493

Rhamphopis jacapa	Tomes II	Pages 491
Luciani	II	493
nigrogularis	II	491
Rhea *americana*	III	500
Rhinoptynx mexicanus	I	193
Rhodopis vesper	I	316
Rhopias Hauxwelli	II	44
Rhopospiza fruticeti	III	37
Rhopothera guttata	II	71
punctulata	II	71
Rhyacophilus solitarius	III	368
Rhynchæa curvirostris	III	378
hilairea	III	378
Hilarii	III	378
occidentalis	III	378
semicollaris	III	378
Rhynchaspis maculatus	III	480
mexicana	III	480
Rhynchocyclus *fulvipectus*	II	279
megacephalus	II	283
peruvianus	II	281
poliocephalus	II	285
ruficauda	II	284
sulphurescens	II	280, 281
viridiceps	II	282
Rhynchops *melanura*	III	437
nigra	III	437
Rhynchotis perdix	III	306
Rollandia leucotis	III	494
Rupicola peruana	II	373
peruviana	II	373
Ruticilla americana	III	507

S

Saltator *albicollis*	II	541, 542
ater	II	547
aurantiirostris	II	545
Azaræ	II	540
bicolor	II	536
cærulescens	II	544
elegans	II	538
flavidicollis	II	543
icterophrys	II	540
laticlavius	II	545
magnus	II	539
melanopis	II	547

Saltator olivaceus	Tomes II	Pages 540
olivascens	II	543
Riefferi	II	538
similis	II	541
superciliaris	II	541, 544
Sappho *caroli*	I	337
phaon	I	336
Sarcorhamphus condor	I	75
gryphus	I	75
papa	I	75
Sarkidiornis jubata	III	468
Sarochalinus rufogularis	I	508
Sayornis ardesiaca	II	317
cineracea	II	204
Scapaneus Sclateri	III	72
Scaphidura barita	II	435
crassirostris	II	435
Scaphidurus ater	II	435
Scaphorhynchus audax	II	288, 289
chrysocephalus	II	293
sulphuratus	II	294
Schiffornis *major*	II	352
Schistes *Geoffroyi*	I	365
Schistochlamys speculigera	II	546
Schizœca palpebralis	II	130
Sclerurus *caudacutus*	II	114
mexicanus	II	115
olivascens	II	115
Scolopax alba	III	415
caudatus	III	417
fedoa	III	379
flavipes	III	367
frenata	III	375
grisea	III	373
leucophæa	III	373
marmorata	III	379
melanoleuca	III	365
novæboracensis	III	373
Paykulli	III	373
semipalmatus	III	364
solaris	III	388
vociferus	III	365
Scops brasilianus	I	185, 187
brasiliensis	I	185
choliba	I	185
cristatus	I	188
lophotes	I	185
portoricensis	I	185

Scops *usta*	Tomes I	Pages 187
ustus	I	187
Watsoni	I	185
Scytalopus *acutirostris*	I	532
femoralis	I	532
magellanicus	I	529
sylvestris	I	531
Selenidera *Gouldi*	III	156
Langsdorffi	III	154
Reinwardti	III	153, 155
Sericophila anthracina	II	208
Sericossypha *albocristata*	II	387
Serphophaga *cinerea*	II	236
hypoleuca	II	238
pœcilocerca	II	203
ruficeps	II	237
Serpophaga cinerea	II	236
grisea	II	236
hypoleuca	II	238
parulus	II	239
ruficeps	II	237
Serrirostrum sittoïdes	I	417
Setophaga *Bairdi*	I	480
budytoïdes	II	238
chrysogastra	I	473
coronata	I	476
melanocephala	I	479
nigricincta	I	468
ruticilla	III	507
verticalis	I	481
Sirystes *albogriseus*	II	287
Sitta surinamensis	II	38
Sittace ararauna	III	193
cærulea	III	193
coccinea	III	192
Illigeri	III	195
maracana	III	196
melanura	III	202
militaris	III	191
severa	III	194
Sittasomus *amazonus*	II	163
olivaceus	II	163
perlatus	II	164
stictolæmus	II	164
Sparvius bicolor	I	164
cærulescens	I	168
gilvicollis	I	162
platypterus	I	113

Sparvius semitorquatus	Tomes I	Pages 160
Spathura cissiura	I	329
peruana	I	327
rufocaligata	I	326
solsticialis	I	324
Spatula *platalea*	III	480
Speotyto cunicularia	I	174
Spermophila *castaneiventris*	III	12
gutturalis	III	13
luctuosa	III	10
masesus	III	9
obscura	III	17, 18
ocellata	III	15
olivaceo-flava	III	13
pauper	III	18
rufirostris	III	21
telasco	III	14
simplex	III	16
Spheniscus *Humboldti*	III	499
Sphenura frontalis	I	144
Spiza jacarina	III	25
Spizætus ater	I	104
fuscescens	I	124
Mauduyti	I	135
melanoleucus	I	124
niger	I	104
ornatus	I	135
Spixii	I	134
tyrannus	I	134
variegatus	I	133
Spodiornis *Jelskii*	III	42
Sporophila castaneiventris	III	12
gutturalis	III	13
luctuosa	III	10
rufirostris	III	21
telasco	III	14
Squatarola australis	III	339
cinerea	III	339
helvetica	III	338
rhynchomega	III	339
squatarola	III	339
Steatornis caripensis	I	199
caripensis peruviana	I	199
Steganura *addæ*	I	326
cissiura	I	329
peruana	I	324, 327
solstitialis	I	324
Steganurus cissiurus	I	329

Stèganurus peruanus	Tomes I	Pages 327
Stelgidopteryx *ruficollis*	I	246
uropygialis	I	247
Stenopsis *æquicaudata*	I	222
bifasciata	I	221
maculicaudus	I	216
nigrescens	I	218
Stercorarius *chilensis*	III	458
pomatorhinus	III	458
Sterna acutirostris	III	445
arctica	III	441
argentea	III	445
Bergii	III	439
Cassini	III	440
cayana	III	439
cayennensis	III	439
comata	III	442
cristata	III	439
elegans	III	442
erythrorhynchus	III	439
exilis	III	445
Frobeenii	III	443
galericulata	III	439, 442
hirundinacea	III	440
hirundo	III	440, 441
inca	III	446
lorata	III	445
macrura	III	441
magnirostris	III	438
maxima	III	439
meridionalis	III	440
paradisea	III	441
Pikei	III	441
portlandica	III	441
regia	III	439
superciliaris	III	444
Trudeauii	III	443
Sternula superciliaris	III	445
Stigmatura *budytoïdes*	II	238
Strepsilas collaris	III	349
interpres	III	349
melanocephalus	III	349
Strix accipitrina	I	194
ægolius	I	194
arctica	I	194
atricapilla	I	185
brachyotus	I	194
brachyura	I	194

Strix brasiliana	Tomes I	Pages 185
caspia	I	194
choliba	I	185
clamata	I	192
cristata	I	188
crucigera	I	185
cunicularia	I	174
decussata	I	185
dominicensis	I	174
ferox	I	178
ferruginea	I	178
flammea americana	I	196
flammea Guatemalæ	I	196
grallaria	I	174
infuscata	I	178
larvata	I	180
longirostris	I	192
maculata	I	192
mexicana	I	192
nacurutu	I	189
palustris	I	194
passerinoïdes	I	178
perlata	I	196
personata	I	180
perspicillata	I	180
phalænoïdes	I	178
pulsatrix	I	180
superciliosa	I	188
torquata	I	180
tripennis	I	194
ulula	I	194
undulata	I	185
Sturnella bellicosa	II	429
militaris	II	428, 429
Sturnus holosericeus	II	415
loyca	II	428
militaris	II	428
Sublegatus *griseocularis*	II	274
Suiriri cabeza blanca	II	207
Sula *variegata*	III	433
Sycalis *arvensis*	III	61
chloris	III	56, 57
chloropsis	III	58
erythronota	III	62
flaveola	III	55
lutea	III	56
luteiventris	III	59
Raimondii	III	61

Sycalis *uropygialis*	Tomes III	Pages 58
Sylbeocyclus chilensis	III	493
dominicus	III	496
Sylvania ruticilla	III	507
Sylvia æstiva	III	506
aureola	I	467
azurea	I	465
bicolor	I	433
bifasciata	I	465
bilineata	III	505
Blackburniæ	I	464
cærulea	I	465
cærulescens	I	433
canicapilla	I	469
carolinensis	III	506
cayana	III	506
Childreni	III	506
citrinea	III	506
concolor	III	26
cucullata	I	469
elata	II	256
flava	III	506
lateralis	I	464
magellanica	I	529
melanops	II	116
melanoxantha	II	511
minuta	I	463
olivacea	I	443
parus	I	464
pitiayumi	I	463
plumbea	I	433, 463
populorum	I	465
rara	I	465
rathbonia	III	506
rubrigastra	II	243
trochilus	III	506
velata	I	469
venusta	I	463
Sylvicola aureola	I	467
pardalina	I	468
Symphemia atlantica	III	364
semipalmata	III	364
Synallaxis ægithaloïdes	II	120
albescens	II	125
albicapilla	II	136
albigularis	II	125
alopecias	II	128
antisiensis	II	133

Synallaxis *Arequipæ*	Tomes	II	Pages 137
Azaræ		II	122
brunneicauda		II	124
brunneicaudalis		II	124
cinnamomea		II	127
cisandina		II	133
curtata		II	135
dorsomaculatus		II	116
elegans		II	122
elegantior		II	122
flammulata		II	139
frontalis		II	122, 123
fruticicola		II	123
furcata		II	134
graminicola		II	140
humilis		II	138
hyposticta		II	136
maculata		II	126
marañonica		II	130
melanops		II	116
multostriata		II	139
mustelina		II	127
Orbignyi		II	137
palpebralis		II	130
paucalensis		II	131
poliophrys		II	122
propinqua		II	126
pudibunda		II	142
ruficapilla		II	122, 124
rufifrons		II	143
rutilans		II	132
stictothorax		II	126
striata		II	121
terricolor		II	126
thelotis		II	120
tithys		II	129
virgata		II	141
vulpecula		II	128
vulpina		II	128
Syndactyla rufosuperciliata		II	157
Syrnium griseatum		I	188
lineatum		I	182
melanonotum		I	184
perspicillatum		I	180
squamulatum		I	182
virgatum		I	182
zonocercum		I	182

T

Tachornis andicola	Tomes I	Pages 232
Tachuris rubrigastra	II	243
Tachybaptus dominicanus	III	496
dominicus	III	495
Tachycineta albilinea	III	503
Tachypetes aquila	III	427
Tachyphonus albitempora	II	513
cirrhomelas	II	502
cristatellus	II	502
cristatus	II	502
gularis	III	27
flavinucha	II	484
fringilloïdes	III	28
lacrymosus	II	481
leucopterus	II	505
melanoleucus	II	504
napensis	II	503
nigerrimus	II	504
penicillatus	II	499
phœniceus	II	505
quadricolor	II	506
rubescens	III	28
rufiventris	II	503
saucias	II	505
serrirostris	II	504
Suchi	II	506
sumptuosus	II	484
surinamus	II	503
surinamus napensis	II	503
versicolor	II	500
Tænioptera erythropygia	II	187
Talpacotia cinnamomea	III	246
godina	III	246
Tamatia melanotis	III	129
Tanagra æstiva	II	494
albirostris	II	491
albocristata	II	387
analis	II	479
(Arremon) assimilis	II	531
atra	II	547
atrosericea	II	493
aureata	II	439
auricapilla	II	506
brunnea	II	502
brunneinucha	II	529

Tanagra *cana*	Tomes II	Pages 486
chilensis	II	457
chrysogastra	II	439, 447
coccinea	II	494
cœlestis	II	485
cœlicolor	II	458
cristata	II	502
cristatella	III	28
cucullata	II	483
cyanicollis	II	472
cyanocephala	II	490
cyanoptera	II	486
Darwini	II	488
decumana	II	544
flaviventris	II	464
frugilegus	II	488
fusca	III	27
gularis	III	27
guianensis	I	448
guira	II	510
gyrola	II	463
icterocephala	II	508
ignescens	II	491
igniventris	II	482
jacapa	II	491
jacarina	III	25
Luciani	II	494
magna	II	539
Maximiliani	II	490
melanopis	II	547
melanoptera	II	487
nigerrima	II	504
nigricollis	II	439, 510
nigrigula	II	510
nigrogularis	II	491
olivacea	II	442, 494
olivascens	II	486
olivina	II	547
palmarum melanoptera	II	486
palpebrosa	II	480
Parzudakii	II	474
pileata	II	513
pompadora	II	491
punctata	II	460
rufa	II	504
ruficollis	III	45
rufiventris	II	447, 503
sayaca	II	485

Tanagra Schranki	Tomes II	Pages 459
speculigera	II	511
striata	II	489
superciliaris	II	541, 544
variegata	II	494
yeni	II	457
Tanagrella *callophrys*	III	510
elegantissima	II	453
iridina	II	453
Tantalus albicollis	III	417
albus	III	415
brevirostris	III	414
cayennensis	III	420
coco	III	415
loculator	III	414
melanopis	III	417
plumicollis	III	414
Tanypeplus pavoninus	III	176
Tatao yeni	II	457
Tataupa	III	297
Terenura *callinota*	II	52
Tetrao cinereus	III	300
Thalasseus elegans	III	442
magnirostris	III	438
Thalassidroma Wilsoni	III	463
Thalassœca *glacialoïdes*	III	464
Thalassoïca glacialoïdes	III	464
polaris	III	464
tenuirostris	III	464
Thalurania *Jelskii*	I	295
nigrofasciata	I	293
Tschudii	I	293
viridipectus	I	293
Thamnophilus albicans	II	20
albinuchalis	II	14
amazonicus	II	10
atricapillus	II	13
axillaris	II	35
badius	II	17
Berlepschi	II	22
cæsius	II	57
capitalis	II	11
caudacutus	II	114
corvinus	II	5
doliatus	II	19, 20
fasciatus	II	17
fuliginosus	II	2, 31
griseus	II	49

Thamnophilus guianensis	Tomes I	Pages 448
guttatus	II	59
hyperythrus	II	24
leucauchen	II	15
leuconotus	II	5
lineatus	II	1, 17
loretoyacensis	II	13
luctuosus	II	7
major	II	4
melanchrous	II	11
melanocephalus	II	5
melanoceps	II	5
melanurus	II	4
mentalis	II	29
murinus	II	12
myotherinus	II	65, 67
nævius	II	8, 9
nævius albiventris	II	9
olivaceus	II	28
palliatus	II	17
plumbeus	II	24
quixensis	II	51
radiatus	II	20
rubiginosus	II	19
rufater	II	49
rufifrons	II	57
rufiventris	II	51
rufus	II	372
schistaceus	II	31
subandinus	II	6
subandinus major	II	7
subfasciatus	II	18
tenuifasciatus	II	21
tenuipunctatus	II	22
transandeanus	II	3
Tschudii	II	7
unduliger	II	2
Thamnistes *rufescens*	II	25
Thamnomanes *glaucus*	II	33
Thaumastura *cora*	I	314
Thaumatias Bartletti	I	403
fluviatilis	I	404
Taczanowskii	I	405
Thaumatoëssa mirabilis	I	318
Theristicus *caudatus*	III	417
melanopis	III	417
Thinocorus Escholtzii	III	283
Ingæ	III	281

Thinocorus *orbignyanus*	Tomes III	Pages 281
rumicivorus	III	283
Swainsonii	III	283
Thrasaëtos *harpyia*	I	131
Thraupis cana	II	486
cyanocephala	II	490
Darwini	II	488
striata	II	489
Threnetes cervinicauda	I	260
Thripadectes scrutator	II	146
Thriprobrotus Warszewiczi	II	173
Tripophaga aurita	II	145
Thryophilus fulvus	I	517
leucotis	I	516
superciliaris	I	514
Thryothorus *albiventris*	I	518
albipectus	I	514, 516
cantator	I	519
coraya	I	517
griseipectus	I	517
leucotis	I	516
modulator	I	508
prostheleucus	I	513
Sclateri	I	520
superciliaris	I	514
Thylopsis fulvescens	II	508
ornata	II	507
sordida	II	508
Tiaris cruenta	III	30
Tigrisoma *brasiliense*	III	401
Cabanisi	III	404
Salmoni	III	402
Tinactor fuscus	II	114
Tinamotis *Pentlandi*	III	310
Tinamus atricapillus	III	294
atrocapillus	III	294
cærulescens	III	296
cinereus	III	300
guttatus	III	295
Kleei	III	293
major	III	292
noctivagus	III	302
obsoletus	III	296
ruficeps	III	292
tataupa	III	297
Tinnunculus cinnamomeus	I	154
cinnamominus	I	154
sparverius	I	154

Tityra *albitorques*	Tomes II	Pages 355
cayana	II	354
cinerea	II	354
nigra	II	363
semifasciata	II	353
viridis	II	359
Todirostrum *cinereum*	II	225, 226
chrysocotaphum	II	227
ecaudatum	II	234
maculatum	II	228
pulchellum	II	227
Sclateri	II	226
signatum	II	228
spiciferum	II	229
squamæcristata	II	230
Todus cinereus	II	225
leucocephalus	II	207
marginatus	II	365
melanocephalus	II	225
poliocephalus	II	285
Totanus bartramius	III	371
caligatus	III	368
campestris	III	371
chloropygius	III	368
crassirostris	III	364
flavipes	III	367
fuscocapillus	III	367
guttatus	III	368
longicauda	III	371
leucopyga	III	367
macropterus	III	368
macularius	III	369
maculatus	III	366
melanoleucus	III	365
melanopygius	III	371
natator	III	367
punctatus	III	368
sasashuo	III	365
semipalmatus	III	364
solitarius	III	368
speculigerus	III	364
variegatus	III	371
Triccus cinereus	II	225
Trichas nigricristatus	I	477
Trichoglossus aurifrons	III	210
pyrrhopterus	III	205
Trichothraupis *quadricolor*	II	506

Tringa arenaria	Tomes III	Pages 353
atricapilla	III	378
Auduboni	III	363
australis	III	355
Bairdi	III	359
bartramia	III	371
Bonapartei	III	360
borealis	III	348
brevirostris	III	362
canutus	III	354
cinclus, var	III	360
cinerea	III	354
dominicensis	III	356
Douglasi	III	363
ferruginea	III	354
fuscicollis	III	356, 360
grisea	III	338, 354
helvetica	III	338
himantopus	III	363
hyperborea	III	382
interpres	III	349
islandica	III	354
lobata	III	382
macularia	III	369
maculata	III	356
minutilla	III	358
morinella	III	349
nævia	III	354
nana	III	358
ochropus	III	368
pectoralis	III	356
pusilla	III	358, 362
rufa	III	355
rufescens	III	370
semicollaris	III	378
semipalmata	III	362
solitaria	III	368
squatarola	III	338
subruficollis	III	370
tridactyla	III	353
undata	III	355
uniformis	III	355
varia	III	338
virgata	III	348
Wilsoni	III	358
Tringites *rufescens*	III	370
Tringoïdes macularius	III	369
Trochilus addæ	I	326

Trochilus æneicauda	Tomes	I	Pages 355
albus		I	281
amazilia		I	406
amethysticollis		I	381
amethystinus		I	317
anaïs		I	367
angustipennis		I	415
apicalis		I	268
Aspaziæ		I	270
atricapillus		I	281
atrimentalis		I	272
Audeberti		I	410
aurescens		I	387
auritus		I	363
Bourcieri		I	267
brachyrhynchus		I	349
brevicauda		I	317
brasiliensis		I	261
Cæciliæ		I	277
cæruleus		I	410
campestris		I	317
caroli		I	337
Castelnaudi		I	343
chionogaster		I	400
chrysogaster		I	415
chrysurus		I	336
cæruleus		I	410
Condamini		I	259
cora		I	314
cupreicauda		I	353
cupripennis		I	340
cyaneus		I	411
cyanicollis		I	397
cyanopterus		I	338
cyanotis		I	369
daphne		I	414
derbyanus		I	375
Derbyi		I	395
Emiliæ		I	268
Estella		I	277
fasciatus		I	281
ferrugineus		I	261
fimbriatus		I	297
fulvifrons		I	412
furcatus		I	293
Gayi		I	283
Geoffroyi		I	265
gigas		I	373

Trochilus Guimeti	Tomes I	Pages 364
hirsutus	I	261
hispidus	I	265
hypoleucus	I	400
inornatus	I	359
insectivorus	I	289
Johannæ	I	285
Labrador	I	312
(Lampornis) leucogaster	I	400
Langsdorffi	I	304
latirostris	I	412
lazulus	I	281
(Lesbia) gracilis	I	330
(Lesbia) smaragdinus	I	334
leucocrotaphus	I	363
longirostris	I	391
mango	I	281
Mathewsi	I	295
mazeppa	I	261
melanogenys	I	361
mellivorus	I	297
mirabilis	I	318
mocoa	I	334
nigricollis	I	281
nigrofasciatus	I	293
(Ocreatus) rufocaligatus	I	326
opacus	I	353
Oseryi	I	266
otero	I	287
petasophorus	I	370
phæopygus	I	415
platurus	I	327
Popelairi	I	302
punctatus	I	281
punctulatus	I	281
quadricolor	I	281
ruficeps	I	348
sabinæ	I	361
sapphirinus	I	412
Saulæ	I	283
Schreibersi	I	289
serrirostris	I	370
Stanleyi	I	345
superbus	I	391
superciliosus	I	261, 264
thalassinus	I	367
tyrianthinus	I	358
Turnieri	I	400

Trochilus Verreauxi	Tomes	I	Pages 300
violicauda		I	281
violifrons		I	285
Troglodytes arada		I	508
audax		I	525
guttatus		I	512
leucophrys		I	512
murinus		I	522
solstitialis		I	521
tecellata		I	522
tessellatus		I	522, 524
Trogon antisianus		III	177
antisiensis		III	177
atricollis		III	172
auratus		III	163
auriceps		III	175
caligatus		III	173
castaneus		III	163
chrysochlorus		III	172
collaris		III	163
curucui		III	163, 168, 172
heliothrix		III	166, 167
lepturus		III	172
leverianus		III	170
melanopterus		III	170
melanurus		III	168
meridionalis		III	171
nigricaudatus		III	169
pavoninus		III	176
personatus heliothrix		III	167
personatus propinquus		III	166
propinquus		III	166
pulchellus		III	177
purpuratus		III	165
ramonianus		III	171
rosalba		III	163
rufus		III	172
strigillatus		III	168, 170
tenellus		III	172
variegatus		III	165
violaceus		III	170
viridis		III	170, 172
Trupialis *bellicosa*		II	429
loyca		II	429
militaris		II	428
Turdus *Aliciæ*		I	486
atricapillus		I	502
aquaticus		III	369

Turdus atrosericeus	Tomes I	Pages 496
brasiliensis	I	502
brunneus	I	496
chiguanco	I	494
crotopezus	I	492
dryas	I	484
fumigatus	I	493
fuscater	I	494
gigantodes	I	495
Hauxwelli	I	493
(Hylocichla) Swainsoni, β Aliciæ	I	486
ignobilis	I	491
leucomelas	I	491
leucops	I	496
marañonicus	I	488
nigriceps	I	489
phæopygioïdes	I	490
phæopygus	I	490
pratensis	I	502
Reevii	I	490
rufifrons	II	57
rufus	II	57
serranus	I	496
Swainsoni	I	487
Swainsoni, var. Aliciæ	I	486
thilius	II	424
Tyranniscus *chrysops*	II	259
cinereiceps	II	258
gracilipes	II	260
nigricapillus	II	257
viridiflavus	II	261
viridissimus	II	260
Tyrannula ardesiaca	II	317
caniceps	II	269
cineracea	II	204
ferruginea	II	305
fumigata	II	188
megacephala	II	283
minima	II	315
phœnicura	II	302
superciliosa	II	276
Tschudii	II	326
Tyrannulus albocristatus	II	241
chrysops	II	259
cinereiceps	II	258
elatus	II	256
Tyrannulus nigricapillus	II	257
rufipectus	II	195

Tyrannus albicollis ..... Tomes II Pages 273
atrifrons ..... II 291
audax ..... II 288, 289
aurantio-atro-cristatus ..... II 331
auriflamma ..... II 331
Boissonneauti ..... II 188
borealis ..... II 316
calcaratus ..... II 370
carnivorus ..... II 294
cayennensis ..... II 275
cinchoneti ..... II 285
circumcinctus ..... II 273
crudelis ..... II 327
furcatus ..... II 327
inca ..... II 331
intrepidus ..... II 329
leucotis ..... II 326
melancholicus ..... II 327
niveigularis ..... II 329
nunciolus ..... II 332
pipiri ..... II 329
pitangua ..... II 294
rufescens ..... II 372
rufiventris ..... II 187
savanna ..... II 332
solitarius ..... II 288
sulphuratus ..... II 286
tyrannus ..... II 332
varius ..... II 326
violentus ..... II 332
ynca ..... II 331

U

Uncirostrum cyaneum ..... I 421
Upucerthia atacamensis ..... II 111
Jelskii ..... II 106
montana ..... II 108
nigrofumosa ..... II 110
pallida ..... II 107
serrana ..... II 107
Urallia cissiura ..... I 329
Uranomitra *cyanicollis* ..... I 397
Urax erythrorhynchus ..... III 267
mitu ..... III 267
Urax (Nothocrax) urumutum ..... III 265

Urochroma *Hueti* ..... Tomes III Pages 217
Urogalba Amazonum ..... III 119
paradisea Amazonum ..... III 119
Urospatha *Martii* ..... III 111
Urosticte *intermedia* ..... I 351
Urubitinga anthracina ..... I 104
brasiliensis ..... I 104
Kaupi ..... I 117
longipes ..... I 104
meridionalis ..... I 110
schistacea ..... I 109
unicincta ..... I 106
zonura ..... I 104
Urubitornis solitaria ..... I 129
Urucurea ..... I 174

V

Vanellus cayennensis ..... III 336
chilensis ..... III 336
griseus ..... III 338
helveticus ..... III 338
melanogaster ..... III 339
occidentalis ..... III 335
resplendens ..... III 336
squatarola ..... III 338
varius ..... III 338
Vermivora elegans ..... II 241
Vireo flavoviridis ..... I 445
Josephæ ..... I 444
olivacea ..... I 443
versicolor ..... II 366
Vireolanius *chlorogaster* ..... I 447
Vireosylvia agilis ..... I 443
flavoviridis ..... I 445
Josephæ ..... I 444
olivacea ..... I 443
Volatinia ..... III 25
jacarina ..... III 25
Vultur atratus ..... I 84
aura ..... I 84, II 551
cheriway ..... I 92
condor ..... I 75
coronatus ..... I 131
gryphus ..... I 75
harpyia ..... I 131

Vultur iota..... Tomes I Pages 84
jota..... II 551
magellanicus..... I 75
papa..... I 81
plancus..... I 92
urubu..... I 84

X

Xanthornus chrysocarpus..... II 424
chrysocephalus..... II 416
decumanus..... II 404
leucorhamphus..... II 413
maximus..... II 404
mesomelas..... II 417
purpurascens..... II 422
Xanthosomus *icterocephalus*..... II 425
Xanthoura peruviana..... II 396
Xanthura joliæa..... II 401
peruviana..... II 396
viridicyanea..... II 400
yncas..... II 396
Xema atricilla..... III 450
cirrhocephalum..... III 452, 454
collaris..... III 456
furcatum..... III 457
furcatus..... III 457
Sabinei..... III 456
Sabini..... III 456
Sabinii..... III 456
Xenicopsis rufosuperciliata..... II 157
Xenodacnis *parina*..... I 434
Xenops approximans..... II 162
genibarbis..... II 162
heterurus..... II 160
littoralis..... II 162
rufosuperciliatus..... II 157
rutilans..... II 160
rutilus..... II 160
Xenospingus *concolor*..... III 26
Xiphocolaptes *compressirostris*..... II 172
promeropirhynchus..... II 172
Xiphorhynchus *thoracicus*..... II 181
Xylocota Jamesoni..... III 376

Z

Zenaïda auriculata	Tomes III	Pages 237
aurita	III	237
inornata	III	239
maculata	III	237
Zonophasia platyrhyncha	II	167
Zonotrichia matutina	III	45
pileata	III	45

Typ. Oberthür, à Rennes.

Z

Zenaida **auriculata**	Tomes III	Pages 237
aurita	III	237
inornata	III	239
maculata	III	237
Zonophasia platyrhyncha	II	167
Zonotrichia matutina	III	45
pileata	III	45

Typ. Oberthür, à Rennes.